



# الاحياء

الصف الحادى عشر

الفصل الدراسى الأول - القسم الأول



كتاب الطالب

المرحلة الثانوية

# الأحياء

وزارة التربية  
Ministry of Education  
State of Kuwait | دولة الكويت



الصف الحادي عشر

كتاب الطالب

الفصل الدراسي الأول – القسم الأول

المرحلة الثانوية

اللجنة الإشرافية لدراسة ومواءمة سلسلة كتب العلوم

أ. براك مهدي براك (رئيساً)

أ. مصطفى محمد مصطفى على

أ. فتوح عبد الله طاهر الشمالي

أ. تهاني ذعار المطيري

أ. سعاد عبد العزيز الرشود

الطبعة الثانية

١٤٤٧ هـ

٢٠٢٦-٢٠٢٥ م

حقوق التأليف والطبع والنشر محفوظة لوزارة التربية - قطاع البحوث التربوية والمناهج

ادارة تطوير المناهج

الطبعة الأولى ٢٠١٤ - ٢٠١٣ م  
الطبعة الثانية ٢٠١٦ - ٢٠١٥ م  
م ٢٠١٩ - ٢٠١٨  
م ٢٠٢٠ - ٢٠١٩  
م ٢٠٢١ - ٢٠٢٠  
م ٢٠٢٣ - ٢٠٢٢  
م ٢٠٢٤ - ٢٠٢٣  
م ٢٠٢٥ - ٢٠٢٤  
م ٢٠٢٦ - ٢٠٢٥

## فريق عمل دراسة ومواهمة كتب الأحياء للصف الحادي عشر الثانوي

أ. ليلي علي حسين الوهيب

أ. دلال سعد مسعود المسعود  
أ. محمد علي أكبر عباس  
أ. منى حسين نوري عطية  
أ. خلود فهد عبد الحسن الدليمي

دار التَّّرَبَّوِيَّونَ House of Education ش.م.م. وبيرسون إديوكيشن ٢٠١٣



24797888

أودع بمكتبة الوزارة تحت رقم (٢٢) بتاريخ ٢١/٣/٢٠١٥ م



حَضْرَةُ صَاحْبِ الْبَلْكَهْمُو الشَّيْخُ مشَالُ الْأَحْمَدُ الْجَبَرُ الصَّابِحُ  
أَمِيرُ دُوَّلَةِ الْكُوَيْتِ

**H.H. Sheikh Meshal AL-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah**  
**Amir Of The State Of Kuwait**





سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح  
والي عهد دولة الكويت

**H. H. Sheikh Sabah Khaled Al-Sabah  
Crown Prince Of The State Of Kuwait**



## مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين، محمد بن عبد الله وصحبه أجمعين.

عندما شرعت وزارة التربية في عملية تطوير المناهج، استندت في ذلك إلى جملة من الأسس والمتطلبات العلمية والفنية والمهنية، حيث راعت متطلبات الدولة وارتباط ذلك بسوق العمل، وحاجات المتعلمين والتطور المعرفي والعلمي، بالإضافة إلى جملة من التحديات التي تمثلت بالتحدي القيمي والاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي وغيرها، وإن كنا ندرك أن هذه الجوانب لها صلة وثيقة بالنظام التعليمي بشكل عام وليس المناهج بشكل خاص.

وما يجب التأكيد عليه، أن المنهج عبارة عن كم الخبرات التربوية والتعليمية التي تُقدم للمتعلم، وهذا يرتبط أيضًا بعمليات التخطيط والتنفيذ، والتي في مجملها النهائية تأتي لتحقيق الأهداف التربوية، وعليه أصبحت عملية بناء المناهج الدراسية من أهم مكونات النظام التعليمي، لأنها تأتي في جانبين مهمين لقياس كفاءة النظام التعليمي، فهي من جهة تمثل أحد المدخلات الأساسية ومقاييسًا أو معيارًا من معايير كفاءته من جهة أخرى، عدا أن المنهج تدخل في عملية إيماء شخصية المتعلم في جميع جوانبها الجسمية والعقلية والوجدانية والروحية والاجتماعية.

من جانب آخر، فنحن في قطاع البحوث التربوية والمناهج، عندما نبدأ في عملية تطوير المناهج الدراسية، ننطلق من كل الأسس والمتطلبات التي سبق ذكرها، بل إننا نراها محفزات واقعية تدفعنا لبذل قصارى جهدنا والمضي قدماً في البحث في المستجدات التربوية سواء في شكل المناهج أم في مضامينها، وهذا ما قام به القطاع خلال السنوات الماضية، حيث البحث عن أفضل ما توصلت إليه عملية صناعة المناهج الدراسية، ومن ثم إعدادها وتأليفها وفق معايير عالمية استعداداً لتطبيقها في البيئة التعليمية.

ولقد كانت مناهج العلوم والرياضيات من أول المناهج التي بدأنا بها عملية التطوير، إيماناً بأهميتها وانطلاقاً من أنها ذات صفة عالمية، مع الأخذ بالحسبان خصوصية المجتمع الكويتي وببيئته المحلية. وعندما أدركنا أنها تتضمن جوانب عملية التعلم ونعني بذلك المعرفة والقيم والمهارات، قمنا بدراستها وجعلها تتوافق مع نظام التعليم في دولة الكويت، مركزين ليس فقط على الكتاب المقرر ولكن شمل ذلك طرائق وأساليب التدريس والبيئة التعليمية دور المتعلم، مؤكدين على أهمية التكامل بين الجوانب العلمية والتطبيقية حتى تكون ذات طبيعة وظيفية مرتبطة بحياة المتعلم.

وفي ضوء ما سبق من معطيات وغيرها من الجوانب ذات الصفة التعليمية والتربوية تم اختيار سلسلة مناهج العلوم والرياضيات التي أكملناها بشكل ووكل ووكل مناسبين، ولنتحقق نقلة نوعية في مناهج تلك المواد، وهذا كلها تزامن مع عملية التقويم والقياس للأثر الذي تركته تلك المناهج، ومن ثم عمليات التعديل التي طرأت أثناء وبعد تنفيذها، مع التأكيد على الاستمرار في القياس المستمر والمتابعة الدائمة حتى تكون مناهجنا أكثر تفاعلية.

**د. سعود هلال الحريبي**

الوكيل المساعد لقطاع البحوث التربوية والمناهج

# المحتويات

## الجزء الأول

الوحدة الأولى: علم النبات

الوحدة الثانية: علم الوراثة

## الجزء الثاني

الوحدة الثالثة: أجهزة جسم الإنسان



# محتويات

## الفصل الدراسي الأول - القسم الأول

12	الوحدة الأولى: علم النباتات
13	الفصل الأول: التغذية والنقل والنمو في النباتات
14	الدرس 1 – 1: تركيب النباتات
28	الدرس 1 – 2: التغذية في النباتات
41	الدرس 1 – 3: النقل في النباتات
51	الدرس 1 – 4: نمو النباتات
60	الفصل الثاني: التكاثر والاستجابة في النباتات
61	الدرس 2 – 1: التكاثر الجنسي في النباتات (1)
68	الدرس 2 – 2: التكاثر الجنسي في النباتات (2)
75	الدرس 2 – 3: التكاثر اللاجنسي في النباتات
83	مراجعة الوحدة الأولى

### فصول الوحدة

#### الفصل الأول

- \* التغذية والنقل والنمو في النباتات

#### الفصل الثاني

- \* التكاثر والاستجابة في النباتات

### أهداف الوحدة

- \* يفسّر سبب حاجة الأشجار الكبيرة إلى أنظمة نقل متخصصة لنقل الغاز والماء والطعام.
- \* يميّز بين النباتات المختلفة انطلاقاً من خصائصها.
- \* يربط بين تركيب الأنسجة المختلفة وموقعها وبين وظيفتها.
- \* يصف عمل أنظمة النقل المختلفة الموجودة في النباتات.
- \* يشرح مراحل عملية البناء الضوئي.
- \* يربط موقع الأنسجة الإنشائية في النباتات ووظيفتها بنوع النمو.

### معالم الوحدة

- \* علم الأحياء في حياتنا اليومية
- \* العلم والتكنولوجيا والمجتمع
- \* علم الأحياء والبيئة



اعتماد العلماء والسائحون أن يُعنوا النظر في أكبر نبات معمر في العالم وهو الشجر الأحمر الساحلي المُسمى *Sequoia Sempervirens*، وهذه الأشجار الحمراء الضخمة دائمة الخضرة من أقدم أشجار العالم. ونتيجة دراسة مستفيضة عن هذه الأشجار وفحص قطاعات في جذع إحداها لدراسة حلقات النمو، وهي السجل الحي لتاريخ الشجرة، لاحظ العلماء أنه ينبع عن نمو هذه الأشجار في فصل الربيع حلقة من الخشب فاتحة اللون. ومع إستمرار النمو في فصل الصيف يظهر شريطاً ضيقاً من الخشب داكن اللون. لذلك، يمتدّنا عدد الحلقات فاتحة اللون بسجل دقيق عن حياة تلك الأشجار، التي قد تمتدّ إلى أكثر من 3500 عام. وقد قدر العلماء، نتيجة دراسة إحدى الأشجار، أنها بدأت نموها في حوالي العام 730 بعد الميلاد، وقبل أن تسقط على الأرض في العام 1933، كان قد وصل ارتفاعها إلى 95 متراً وبلغ وزنها نصف مليون كيلوجرام تقريباً.

### اكتشف بنفسك

#### ملاحظة نبات زهرى

المواد والأدوات المطلوبة: نبات كامل مزهر ، عدسة يدوية ، ورقة سوداء 1. لا حظ النبات عن قرب وارسمه. ثم اكتب ما تعرفه من أسماء أجزاء النبات على الرسم.

2. إستخدام العدسة اليدوية للاحظ أجزاء النبات الأكثر قرباً. سجل ملاحظاتك عن مظهر تلك الأجزاء وتركيبيها.

3. إنزع إحدى أزهار النبات وانفضها برفق فوق الورقة السوداء. ما الذي يحدث؟ لاحظ المادة باستخدام العدسة اليدوية.

المادة التي تخرج من الزهرة هي حبوب اللقاح، وهي حبيبات صغيرة تحتوي على الأمشاج الذكرية للتكاثر. جميع النباتات البذرية، بما فيها الشجر الأحمر العملاق الموضح في الصورة أعلاه، تُنتج حبوب اللقاح للتكاثر جنسياً.

### دروس الفصل

#### الدرس الأول

- \* تركيب النباتات

#### الدرس الثاني

- \* التغذية في النباتات

#### الدرس الثالث

- \* النقل في النباتات

#### الدرس الرابع

- \* نمو النباتات

ألم يخطر ببالك يوماً أن تتساءل ، إذ ترى أشعة الشمس الساقطة على الأوراق الخضراء للنباتات ، ما الذي يحدث من عمليات مذهلة أسفل سطح تلك الأوراق الخضراء عندما تمتض طاقة ضوء الشمس؟ وفي خلال عملية البناء الضوئي ، كيف يتم اتحاد الجزيئات البسيطة من غاز ثاني أكسيد الكربون والماء لتكوين السكر؟ ما السبب في كون العديد من أوراق النباتات الخضراء عريضة ومفلطحة ، ولماذا هي خضراء؟ كيف ت تكون البروتينات والليبيدات والفيتامينات من السكريات الناتجة في أجسام النباتات؟

إذا كانت النباتات تستطيع ، من خلال عملية البناء الضوئي استخدام طاقة ضوء الشمس بصورة مباشرة ، فإن الكثير من الكائنات الأخرى كالحذرون مثلاً ، لا يمكنها استخدام تلك الطاقة بصورة مباشرة . فهي تحصل على الطاقة اللازمة لها كي تنمو وتنتكاثر وتحافظ على حياتها بالتجذية على تلك النباتات التي صنعت غذاءها بنفسها . هناك أيضاً كائنات أخرى لا تستطيع التجذية على النباتات ، لكنها تتغذى على كائنات أخرى تغذت على النباتات . بعض الكائنات لا يمكنها الحصول على الطاقة لكي تعيش إلا بتحليل أجسام الكائنات الأخرى الميتة . فجميع الكائنات ، بما فيها النباتات ، يجب أن تحرر الطاقة من السكريات والمركبات الأخرى التي تم بناؤها عن طريق عملية البناء الضوئي .



## تركيب النباتات

### Structure of Plants

#### الأهداف العامة

- \* يُحدِّد التراكيب الأساسية في أوراق النباتات وسوقها وجذورها .
- \* يُقارِن بين الوظائف الأساسية للأوراق ، والسوق ، والجذور والأزهار .
- \* يُقارِن بين تراكيب النباتات الزهرية ذات الفلقة الواحدة وذات الفلقتين .



(شكل 1)

تُغطّي النباتات معظم قارات العالم في تنوعٍ ضخمٍ لا يتخيله عقل . وللنباتات العديد من التكيفات الفريدة التي تزيد من فرص بقائها حيّة . فعلى سبيل المثال ، زهرة نبتة الأوركيد الموضحة في الشكل (1) لها لون ملكرة النحل وشكلها ورائحتها ، وتعمل هذه التكيفات على جذب ذكور النحل التي تُلْقّح الزهرة . وعلى الرغم من التكيفات الفريدة لبعض النباتات ، إلّا أنَّ تراكيب النباتات ووظائفها متشابهة بشكل عام .

#### Introduction to Plants


#### 1. مقدمة في النباتات

تخيلِ أنتَ في نرّة في مكانك المفضل . ما الكائنات الحيّة التي قد تراها؟ الكائنات التي سترها بكثرة في معظم الأماكن هي النباتات ، فهي تنمو في أيّ مكان على وجه الأرض ، في الشوارع ، وعلى الجدران ، وفي الساحات وفي الغابات . ما الأماكن الأخرى التي يُمُكِّن أن ترى فيها النباتات؟ للنباتات أنواع كثيرة ، فالبعض منها قد يصل إلى ارتفاعات شاهقة مثل أشجار الخشب الأحمر ، والبعض الآخر كالسرخس الطافي قد يكون صغيراً جدّاً ، لا يتتجاوز ارتفاعه بعض السنتمترات .

بعض النباتات ذات أزهار ملؤنة وبعضاها الآخر لا يُزهّر . وتتنوع أعمار النباتات أيضاً ، فبعضها كنبات القطيفة (شكل 2) لا يعيش سوى لموسم واحد ، وبعضاها الآخر كالصنوبر ذي المخاريط الشوكية يعيش لآلاف السنين .



(شكل 2)  
نبات القطيفة



(شكل 3)  
من المحتمل أنك تعرف أسماء الأجزاء فوق الأرضية للنباتات. ما وظائف تلك الأجزاء؟

(شكل 4)  
الصفات المميزة للأوراق النباتية

وعلى الرغم من هذا التنوع الهائل للنباتات ، إلا أن هناك الكثير من التشابهات بينها. فلجميع النباتات تقريباً أجزاء خضراء ، والكثير منها خشبي ، ومعظمها له أزهار. وعلى عكس الحيوانات ، تعيش جميع النباتات تقريباً مزروعة في مكان واحد في التربة.

وتعزى الاختلافات بين معظم النباتات إلى التنوع في بعض التراكيب الأساسية: الأوراق ، والسوق ، والجذور ، والأزهار والبذور (شكل 3). تُمكّن هذه التراكيب النباتات من أن تعيش وتتكاثر في البيئات المختلفة.

## Leaves

### 2. الأوراق النباتية

الأوراق هي أكثر التراكيب وضوحاً في النباتات ، وهي الأعضاء التي تتم فيها أكثر العمليات ضرورة لحياة النباتات والمعروفة ببناء الضوئي ، والتي تستخدم فيها النباتات ضوء الشمس والماء وثاني أكسيد الكربون لتكوين السكريات. (تقوم الأجزاء الخضراء الأخرى من النباتات أيضاً بعملية البناء الضوئي ، ولكن الأوراق هي المواقع الأساسية لهذه العملية).


### 1.2 أنواع الأوراق النباتية وأشكالها

#### Kinds and Shapes of Leaves

تشترك جميع أوراق النباتات ، كالأجزاء الأخرى ، في بعض الصفات العامة. فالجزء الأكبر من الأوراق النباتية مفلطح وعربيض ويُسمى النصل ، Blade وهو يحتوي على الخلايا التي تقوم بعملية البناء الضوئي . وقد يكون النصل كبيراً ومفلطحاً كأوراق نبات الجميز ، أو إبرياً كأوراق نبات الصنوبر . قارن بين أنسال الأوراق الموضحة في الشكل (4).

#### أوراق إبرية



لأوراق نباتات الصنوبر والنباتات المخروطية الأخرى شكل إبرية يُساعدُها على التخلص من الثلوج. تحفظ النباتات إبرية الورق بأوراقها طوال العام.



أوراق مركبة ريشية  
تشبه وريقات الأوراق الريشية ريش الطير ، فسفرع من عرق وسطي.

أوراق مركبة راحية  
تشعّب وريقات الأوراق الراحية من نقطة مركزية.

ورقة ثنائية الفلقة  
عروق الورقة النباتية ثنائية الفلقة عادة ما تكون متفرعة.



ورقة أحادية الفلقة  
تكون عروق الورقة النباتية أحادية الفلقة متوازية عادة.



## فقرة اثرائية

### علم الأحياء في حياتنا اليومية

#### تساقط الأوراق في الخريف

يختر الناس من المشاتل الزراعية نباتات يضعونها في منازلهم أو يزرونها في حدائقهم. ما الصفات الوراثية المهمة في تحديد أنواع النباتات التي تريد شراءها؟

تحتوي أنسال الأوراق النباتية على ثقوب صغيرة تسمى الثغور **Stomata**، تسمح بخروج بخار الماء إلى الهواء، وتبادل غاز ثاني أكسيد الكربون والأكسجين مع الهواء.

تحتوي الأنسال أيضاً على تراكيب أنبوبية الشكل تسمى العروق **Veins**، ينتقل خلالها الماء والعناصر المعدنية والسكريات إلى جميع أنحاء النصل. كما ترى في الشكل (4)، يمكن أن تترتب العروق في أنماط متنوعة. كيف تصف هذه الأنماط؟ يمكنك استخدام أنماط العروق لتحديد ما إذا كانت النباتات الزهرية من ذوات الفلقة الواحدة أم من ذوات الفلقتين.

تدخل العروق إلى معظم الأوراق من خلال عنق الورقة **Petiole**، وهو التركيب الصغير الذي يصل بين نصل الورقة وساق النبتة. بالإضافة إلى ما يقوم به العنق من تدعيم للنصل، إنه ينقل أيضاً السوائل بين الأوراق والسوق. تُصنف الأوراق النباتية إلى بسيطة ومركبة. فالأوراق البسيطة تتكون من نصل واحد، أمّا المركبة فلها نصلان أو أكثر من الأنسال صغيرة الحجم التي تسمى وريقات، وترتبط جميعها بعنق واحد.

وتصنف الأوراق المركبة إما إلى ريشية أو راحية. فالأوراق الريشية تُشبه ريش الطيور، ولها عروق متفرّعة من العرق المركزي الرئيسي الذي يُسمى العرق الأوسط. ومن الأمثلة على النباتات ذات الأوراق المركبة الريشية نباتات نخيل جوز الهند، وأشجار الدردار والجوز، وشجيرة الورد. وتشبه الأوراق المركبة الراحية راحة اليد وأصابعها، وهي ذات وريقات عديدة تشع جميعها من نقطة مركبة، ومن أمثلتها أوراق نباتات الفراولة والترمس وأشجار الكستناء.

يظهر الشكل (5) أنواع مختلفة من أوراق الأشجار.

(شكل 5)

أنواع مختلفة من أوراق الأشجار.

(ب) نبتة الجرزة

أوراق هذه النبتة مت拗ورة لجذب الحشرات وهضمها فهي مصدر للنفروجين.



(د) نبتة الصبار

تتكيف أوراق هذه النبتة للعيش في الظروف الحارة والجافة، فأوراقها السميكة تسمح لها بحفظ الماء داخلها.



(أ) شجرة الصنوبر

تحتوي الأوراق الضيقة لهذه الشجرة على بشرة شمعية وكما تحتوي أيضاً على ثغور غارقة تحت سطح الأوراق. يخوض هذا التركيب خسارة الماء من الأوراق.




(ج) نبتة الصبار

أوراق هذه النبتة غير قادرة على إتمام عملية البناء الضوئي. وتحتمي من أكلات الأعشاب بواسطة أنواعها.

## The Leaf Structure

## 2.2 تركيب الورقة النباتية

تعتبر أوراق النباتات من أهم مصانع الغذاء في العالم لأن السكر والزيوت والبروتينات التي تُصنَع في داخلها هي مصدر الغذاء لجميع الكائنات الحية على وجه الأرض. إذًا يجب أن يكون للنباتات تراكيب مميزة تُمكّنها من الحصول على العناصر الضرورية لعملية البناء الضوئي، وُمكّنها من توزيع نواتج البناء الضوئي خلال أقسام النبتة كافة. يمكن اعتبار الورقة نظامًا متخصصًا لعملية البناء الضوئي، وتتضمن أنظمة فرعية تحتوي على أنسجة مسؤولة عن تبادل الغازات، وأخرى عن نقل الماء والأملاح المعدنية إلى الخلايا حيث تحدث عملية البناء الضوئي. تركيب الورقة هو الأمثل لامتصاص الضوء وتنفيذ عملية البناء الضوئي. مثل الجذور والسوق، يُغلف الورقة النباتية غلاف خارجي يتَألف من خلايا البشرة، وخلايا داخلية تتَكون من أنسجة أساسية وأنسجة وعائية. يُوضَح الشكل (6) كيف يكون سطح الورقة العلوي مغلفًا بطبقة من الأنسجة الجلدية العلوية (نسيج البشرة العليا) Upper Epidermis وسطح الورقة السفلي مغلفًا بطبقة من الأنسجة الجلدية السفلى (نسيج البشرة السفلى) Lower Epidermis. في معظم النباتات، تُغلف السطح العلوي طبقة من الشمع تُسمَى كيوتيكل Cuticle تؤدي مع طبقة البشرة دورًا في منع تسرب الماء إلى خارج الورقة.




(شكل 6)



قطع ثلاثي الأبعاد من ورقة شجرة تُظهر الأنسجة التي تُكوِّنها. قارن وباين بين تراكيب الخلايا المختلفة في الورقة.

تّصل الأنسجة الوعائية للورقة مباشرة بالأنسجة الوعائية للساقي جاعلة الأوراق جزءاً لا يتجزأ من نظام النقل في النباتات . في ورقة الشجرة ، يجتمع كلّ من الخشب واللحاء في حزم وعائية تبدأ في الساق وتدخل الورقة عبر عنقها . حين تصل الحزم الوعائية إلى نصل الورقة ، يحيط بها عدد من الخلايا البرنشيمية والسكلرنشيمية .

يتّألف الجزء الأكبر من الورقة النباتية من أنسجة أساسية (برنشيمية) متخصصة تُعرف بالسيج الوسطي **Mesophyll** . في معظم النباتات ، تحدث عملية البناء الضوئي في هذا النسيج . توجد أسفل النسيج العلوي الجلدي طبقة من الخلايا مستطيلة الشكل المتراسّة بعضها على بعض ، وُتُسمى السيج الوسطي العمادي **Palisade Mesophyll** . هذه الخلايا المتراسّة والغنية بالبلاستيدات الخضراء تمتضض الضوء الذي يقع على الورقة . توجد تحت هذا النسيج طبقة من الخلايا غير منتّظمة الشكل والمتباعدة بعضها عن بعض ، وُتُسمى السيج الوسطي الإسفنجي **Spongy Mesophyll** . تمتلئ الفراغات بين خلايا هذه الطبقة بالهواء **Air Spaces** (شكل 7) . ويَتّصل الهواء في هذه الفراغات بالهواء الخارجي عبر ثغور **Stomata** موجودة في البشرة ، حيث يحدث تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون بين الورقة والهواء المحيط بها ، وتفقد الماء خارج الورقة من خلالها .

(شكل 7)  
مقطع طولي لورقة نباتية






(شکار 8)

عندما يدخل الماء العالقين العحارستان  
الموجودتين بورقة النبات ، فإنَّهما تتفسخان  
وتفتحان الشغور . وعندما تفقد الخلية  
الحارستان الماء ، فإنَّهما تُصْحَان رخوتين  
وتعيقان الشغور . ما الدور الذي يقوم به الشغور ؟

## آلية فتح وغلق الشفر Mechanism of Stomatal Opening and Closing

يتألف كل ثغر من خلتين حارستين Guard Cells توسيطهما فتحة Stomatal Opening، كما يوضح (شكل 8). الخلية الحارسة في البشرة (النسيج الجلدي) هي خلية متخصصة تحتوي على البلاستيدات الخضراء، وتحتوي دوراً في ضبط فتح التغور وإغلاقها، كاستجابة لتغير ضغط الماء داخلها تأثراً بالعوامل البيئية الخارجية. عندما تمتلئ الخلايا الحارسة بالماء، يزداد ضغط الماء داخلها مودياً إلى ازدياد ضغط الامتداد الناتج عن الضغط الأسموزي لغشاء الخلية على جدار الخلية، وهذا الازدياد في الضغط يؤدي إلى انتفاخ الخلايا الحارسة.



### (شکل 9)

## مقطع طولی ییّن ترکیب الشّغ و الخلیتان الحارستان

كيف يُساعد شكل الخلايا الحارسة على فتح التغور؟ أنظر إلى زوج الخلايا الحارسة المحيطة بفتحة التغور في (شكل 9)، ولاحظ سماكة جدار الخلية الداخلية القريب من هذه الفتحة الذي يكون أكثر سمكاً، بالمقارنة مع سماكة الجدار الخارجي في الجانب المقابل الذي يكون أقل سمكاً. عندما يدخل الماء إلى الخليتين الحارستين، فإنّهما تنتفخان ويزداد ضغط الإمتلاء، فيتم دفع جدرهما الرقيقة الخارجية بعيدة عن الفتحة لتسخذ شكلاً مقوسًا. ويعُّسبُّ هذا الفعل شدّ الجدر السميكة الداخلية للخليتين الحارستين بعيداً الواحدة عن الأخرى، فينفتح التغور ويُصبح أكثر اتساعاً. عندما يكون الماء نادراً في النبات، يخرج من الخليتين الحارستين مسبباً انخفاضاً في ضغط الامتلاء على جدار الخلية. فتتكشم الخليتان وينخفض شدّ الجدر السميكة لهما، فتقترن بان الواحدة من الأخرى، وتُصبح فتحة التغور أضيق أو تغلق قليلاً (لا تغلق التغور كلّياً). ما هي العوامل التي تتحكم بفتح التغور وانغلاقها؟

يتأثر فتح التغور وانغلاقها بالعوامل البيئية الخارجية، كوجود الضوء وحرارة الطقس وقمة الرياح ونسبة الرطوبة. كيف يؤثر كل من هذه العوامل البيئية في التغور؟

للمحافظة على الاتزان الداخلي للنبة وحمايتها من الجفاف، ثبقي النباتات التغور مفتوحة بشكل كافٍ لتأمين حاجاتها للبناء الضوئي، ولكن ليس كثيراً حتى لا تخسر الكثير من الماء وتصاب بالجفاف. فهي تُقفل التغور في حالة ارتفاع درجة حرارة الطقس كثيراً أو شدة الضوء أو ازدياد سرعة الرياح أو خلال الطقس الجاف، عندما ترداد نسبة تبخر الماء من النبتة وذلك للحفاظ على حياتها. تفتح التغور بوجود الضوء وتُقفل بغيابه، أي في الليل. كيف تصف حالة التغور في يوم ماضٍ حار وجاف؟

### 3. السوق النباتية

لا تعمل الأوراق بمفردها في النباتات لكنها مثبتة بتراتيب تُسمى السوق Stems وللسوق وظيفتان رئيسيتان هما: حمل الأوراق والأزهار، ونقل الماء والمواد الغذائية إلى جميع أجزاء النبتة. وتم عملية النقل في السوق عن طريق بعض الخلايا الأنبوية التي تشكل نسيج الخشب الذي ينقل الماء والأملاح المعدنية إلى أعلى، من الجذر إلى عروق الأوراق والأزهار، وخلايا أنبوية أخرى تشكل نسيج اللحاء الذي ينقل السكريات من الأوراق إلى جميع أجزاء النبتة. وتؤدي السوق في بعض النباتات وظيفة إضافية أخرى، فتعمل كاماكن لتخزين الغذاء الزائد عن حاجة النباتات. فعلى سبيل المثال، لنبات البطاطا ساق تحت أرضية تخزن كميات كبيرة من النشا.

#### 1.3 أنواع السوق وأشكالها

##### Kinds of Stems and their Forms

وبينما يُحدّد ترتيب الأوراق على السوق الشكل العام للنباتات، يعتمد حجم النباتات على حجم السوق. وبناء على شكل الساق وحجمها ونوعها، تُصنّف النباتات إلى أربع فئات: نباتات عشبية Herbaceous Plants وشجيرات Shrubs ونباتات متسلقة (أو معترضة) Vines وأشجار Trees.

يُوضح الشكل (10) أمثلة على كلّ نوع من هذه النباتات. تتنوع السوق النباتية في قوتها أو مثانتها، فالسوق العشبية غير خشبية و تتكون من أنسجة لينة نسبياً مغطاة بطبقة واقية رقيقة. تشتمل السوق الخشبية والقوية للأشجار والشجيرات على جذع وفروع وغصينات.

ويُمكّنك أن تعرّف أشجاراً وشجيرات عديدة من خلال سوقها، حتى أثناء مواسم تساقط الأوراق. أمّا النباتات المتسلقة أو المعترضة فلها سوق أسطوانية خشبية، وعادة ما تدعّمها الأشجار أو دعامات أخرى.

تُصل الأوراق بالسوق في مواضع تُسمى العقد Nodes، وتُعرف قطع الساق الواقعه بين كل عقدتين متجاورتين بالعقلات Internodes (شكل 11).



(شكل 10 - أ)  
نبة عشبية



(شكل 10 - ب)  
نبة متسلقة أو معترضة



(شكل 10 - ج)  
أشجار  
(شكل 10)  
نوع السوق النباتية

يبدأ النمو في معظم السوق في تراكيب تُسمى البراعم Buds ، وهي قد تنمو إلى أوراق أو فروع أو أزهار . وظهور البراعم عادة في أنماط منتظمة بين الورقة والعقدة . فعلى سبيل المثال ، تظهر البراعم على الجانبين المتقابلين في ساق النعناع ، أمّا في ساق نبات دوار الشمس فتنمو في نمط تبادلي على طول الساق . ويعتبر نمط نمو البراعم تكيفاً يُتيح لأوراق النبات أكبر قدر من التعرض للضوء (شكل 11) . يظهر الشكل (12) أنواعاً مختلفة من السوق التي تكيفت لتخزين الطعام والسبات .



(شكل 11)

تتصل الأوراق بالساق على مستوى العقد . يُنبع الساق الأوراق والأغصان التي تكبر في البراعم . يحمل هذا الساق الأوراق عاليًا بنمط تبادلي لاستعراض أشعة الشمس التي تحتاجها لعملية البناء الضوئي .



(شكل 12)

للكثير من النباتات سوق محورة تخزن الطعام . الدرنات ، الرايزيومات ، البصلات والكورمات قد تبقى كامنة خلال الأوقات الباردة أو الجافة إلى حين عودة الظروف الملائمة للنمو .

## The Stem Structure


### 2.3 تركيب السوق

يتتألف ساق النبتة ، مثل باقي أقسامها ، من ثلاثة أنواع من الأنسجة : البشرة ، الأنسجة الأساسية والأنسجة الوعائية . تُغلف الساق طبقة من أنسجة البشرة ذات جدر خلايا سميك ، ويعْنِّفها من الخارج غلاف شمعي للحماية .

تحتوي سوق النباتات الزهرية أو مغطاة الجذور على نسيج وعائي يتضمن أوعية خشبية وقصيبات ، أمّا النباتات المخروطية فتحتوي على قصيبات فحسب . لماذا يفوق عدد النباتات الزهرية عدد تلك المخروطية ، ما يجعلها تسود في الكثير من المناطق ؟

على الرغم من وجود الأنسجة الوعائية في جميع أقسام النبتة ، إلا أن ترتيبها يختلف من قسم إلى آخر . ففي الجذور ، يُكُون النسيج الوعائي أسطوانة مركبة ، بحيث يكون اللحاء مستقلاً عن الخشب لكنهما يتوزّعان بنمط تبادلي . أمّا في السوق ، فيترتّب الخشب واللحاء في حزم وعائية Vascular Bundles حيث يكون اللحاء لجهة الخارج والخشب لجهة مركز الساق .

توجد بين هذين النسيجين طبقة من الأنسجة الإنسانية تسمى الكمبيوه الإنسائي . يختلف ترتيب الحزم الوعائية في النباتات الزهرية أحادية الفلقة عنه في النباتات الزهرية ثنائية الفلقة كما في الشكل (13) .



(شكل 13)

يختلف توزيع الحزم الوعائية في سوق النباتات أحادية الفلقة والنباتات ثنائية الفلقة . هل توجد حزم وعائية مبعثرة في الساق؟

في النباتات أحادية الفلقة ، تتوارد الحزم الوعائية بشكل مبعثر بين خلايا الأنسجة الأساسية . وتضم الأنسجة الأساسية خلايا ذات شكل واحد معظمها من الخلايا البرنشمية . أمّا في النباتات ثنائية الفلقة ، فتتوزع الحزم الوعائية بشكل دائري منظم لتشكل حلقة حول مجموعة من الخلايا البرنشمية الموجودة في مركز الساق ، والتي تسمى النخاع Pith . تحيط بحلقة الحزم الوعائية طبقات من الخلايا البرنشمية تمتد إلى البشرة وسمى القشرة cortex .

#### 4. الجذور

الجذر هو ذلك الجزء من النبتة الذي ينمو تحت سطح التربة ، ويؤدي وظيفتين أساسيتين هما: امتصاص الماء والعناصر المعدنية من التربة ، وثبت النبات بقوّة في التربة (شكل 14) . كما أنّ بعض أنواع الجذور تُخزن الغذاء الفائض عن حاجة النباتات .

#### 1.4 أنواع الجذور وأشكالها

##### Kinds of Roots and their Forms



(شكل 14)

على الرغم من أثر الرياح السائدة التي جعلت فروع هذه الشجرة تنمو منحرفة إلى الجوانب ، فالجذور العميقه لهذه الشجرة تُثبّتها بإحكام في مكانها .

يوجد نوعان شائعان من الجذور كما ترى في الشكل (15) . أحدهما هو الجذر الوتدي Taproot الموجود في النباتات ثنائية الفلقة ، وهو جذر مركزي كبير الحجم يحمل الكثير من الجذور الجانبيه التي تفرع منه . ويُمكّن أن تنمو الجذور الوتدية عميقاً تحت الأرض لتمتص المياه الجوفية . فإذا حاولت أن تنزع أحد النباتات مثل القول أو الملوخية من التربة ، ستعرف أنّ الجذر الوتدي يُثبّت النبات بقوّة في التربة .



(شكل 15 - أ)  
جذر ليفي



(شكل 15 - ب)  
جذر وتدى

(شكل 15)

قارن بين هذين النوعين من الجذور وصف شكليهما. أي نوع منهما ينمو إلى عمق أكبر في التربة؟


ويمكنك أن ترى مثلاً لقوّة الجذر الوتدى في الشكل (14). تقوم بعض النباتات مثل الجزر والبنجر بتخزين كميات كبيرة من الغذاء في جذورها الوتدية لكي تستخدمها لإنتاج الأزهار والثمار. إلا أنه عادة ما يحصد المزارعون هذه الجذور قبل أن يحدث الإزهار.

النوع الآخر من الجذور هو **الجذر الليفى Fibrous Root** الذي يبدو في شكل كتلة من التراكيب الخيطية الرفيعة والقصيرة. وغالباً ما تنمو الجذور الليفية في السنتيمترات القليلة العلوية من التربة فقط حيث تمتّص الماء والعناصر المعدنية من الطبقة السطحية للتربة. ولكن على مساحة كبيرة، ولكون العديد من هذه الجذور يلتف حول حبيبات التربة ويحيط بها بإحكام، تُصبح هذه الجذور ذات فائدة كبيرة في منع تآكل الطبقات السطحية للتربة. وتعتبر الحشائش مثلاً نموذجياً للنباتات ذات الجذور الليفية.

## Root Structure

### 2.4 تركيب الجذور

تحتوي الجذور على ثلاثة أنواع من الأنسجة: البشرة (النسيج الجلدي)، الأنسجة الأساسية والأنسجة الوعائية. تحيط بالجذر طبقة خارجية من نسيج البشرة وأسطوانة مركبة من الأنسجة الوعائية Vascular Cylinder. تمتد بين البشرة وأسطوانة المركبة الوعائية مساحة واسعة تتضمّن خلايا أساسية.



(شكل 16) يتَّأَلَّفُ الجذر من أسطوانة وعائية يحيط بها النسيج الأساسي والبشرة. هذا المقطع الطولي لجذر نبتة ثنائية الفلقة يُظَهِرُ خلايا الخشب المركبي الذي يتَوَرَّعُ في نمط شعاعي.

## فقرة اثرائية

### علم الأحياء في حياتنا اليومية

#### ما العشب الضار؟


يعتقد أناس كثيرون أنهم يعرفون العشب الضار. هل تعرف ما هي النباتات التي تعتقد أنها أعشاب ضارة؟ الحقيقة أن العشب الضار هو أي نبات ينمو على الإطلاق حيث لا يُرغَب في وجوده.

يؤدي الجذر دوراً أساسياً في امتصاص الماء والأملاح المعدنية ونقلها. يُظهر الشكل (16) مجموعة من الخلايا الوعائية مرتبة في نمط شعاعي. ينمو الجذر في الطول ويُنتج النسيج الإنسائي القمي Apical Meristem خلايا جديدة بالقرب من قمة الجذر. تُغطي هذه الخلايا الجديدة الهشة قلنسوة الجذر Root Cap التي تحمي الجذر.

تؤدي بشرة الجذر دوراً مزدوجاً من ناحية حماية الأنسجة الداخلية ومن ناحية امتصاص الماء. تحدث معظم عملية الامتصاص عند أطراف الجذر في منطقة التمايز Zone of Differentiation حيث تميزت خلايا البشرة إلى شعيرات جذرية ماصة Absorbing Root Hairs.

هذه الشعيرات عبارة عن تراكيب أنبوية دقيقة الحجم تنمو من الأغشية الخلوية لبعض خلايا البشرة في الجذر. وتحتوي هذه الشعيرات دوراً في زيادة مساحة السطح الماصل للماء بدرجة كبيرة. تمتد مباشرة إلى الداخل من البشرة، طبقة إسفنجية من النسيج الأساسي تُسمى القشرة Cortex لتصل إلى حلقة من الخلايا تُسمى طبقة البشرة الداخلية (الأندوديرميس) Endodermis. تحيط هذه البشرة الداخلية بالأسطوانة المركزية الوعائية. ويتوزع كل من اللحاء والخشب في هذه الأسطوانة بشكل تبادلي.

يختلف ترتيب كل من نسيجي الخشب واللحاء في النباتات أحادية الفلقة وفي النباتات ثنائية الفلقة. ففي الأولى، يكون النسيج الوعائي حلقة تحيط بمساحة مركزية من الأنسجة الأساسية البرنشمية التي تُسمى النخاع. أما في الثانية، فيكون النسيج الوعائي قليلاً مصمتاً في مركز الجذر له أذرع هي عبارة عن الخشب، ويتوزع اللحاء بين هذه الأذرع (الشكل 17).



شكل (17)  
اختلاف جذر النباتات

## 5. الأزهار والبذور والثمار Flowers, Seeds and Fruits

على الرغم من أن الكثير من النباتات لا تُرثِّر ، إلا أن الناس عادة ما يصفون النباتات النموذجية بوجود الأزهار . والزهرة Flower هي عضو التكاثر الجنسي في النبات الزهري ، ووظيفتها الأساسية هي إنتاج الأمشاج الذكرية (الخلايا الذكرية في حبوب اللقاح) والأمشاج المؤنثة (البيض) ، وتشكل أيضًا التركيب الذي تتم فيه عملية الإخصاب .

وعلى عكس معظم الحيوانات ، تعيش النباتات عادة حياتها بالكامل في مكان واحد من دون أن تتنقل ، ما يُسَبِّب صعوبة في تكاثرها جنسياً . لذلك بعض تكوينات الأزهار قابلة للتكتيف ، ما يُمكِّنها من أن تتكاثر جنسياً على الرغم من بقائها في مكان واحد .

ويعتبر إنتاج النباتات لحبوب اللقاح مثالاً لأحد تلك التكتيفات .

فيبدأ التكاثر الجنسي في النباتات الزهرية عندما تتنقل حبوب اللقاح ، وهي التراكيب الحاملة للأمشاج (جاميات) الذكرية ، إلى الأجزاء التي تحتوي على البيض في الزهرة . وُسَمِّيَ عملية انتقال حبوب اللقاح من الأجزاء المذكورة إلى الأجزاء المؤنثة في الزهرة بالتلقيح Pollination . ويمكن أن تتنقل حبوب اللقاح بواسطة الرياح أو الماء أو الحشرات أو بعض الكائنات الأخرى . وتنتج النباتات كميات كبيرة من حبوب اللقاح لضمان حدوث عملية التلقيح (شكل 18) .


(شكل 18)  
الأزهار والثمار

### التلقيح والإخصاب

تحتوي الأزهار على عدّة بذلات ملؤنة وتراكيب أخرى متحوّرة لإتمام عملية التلقيح والإخصاب ، وهم خطوتنا التكاثر الجنسي في النباتات الزهرية .



الحماية والانتشار  
تحمي الشمار بذرة واحدة أو أكثر ،  
وتحمي البذرة على أجنة النباتات .  
وئدي الشمار في الغالب دوراً في  
انتشار البذور إلى موضع جديدة .



أما عملية الإخصاب **Fertilization**، فهي اتحاد الخلايا المذكورة مع الخلية البيضية، وهي تحدث بعد حدوث عملية التلقيح. ونتيجة هذه العملية هي تكون الريجوت (أو اللاقحة) التي تنمو إلى جنين البتة الذي تنمو حوله الأنسجة لتنمي، وينمو الاثنان معاً ليكونا البذرة. لذلك فإنّ البذرة **Seed** عبارة عن تركيب تكاثري يتكون من جنين البتة وغذائها المدّحر. وبحدوث عملية الإنبات تتكون النباتات الجديدة.

للنباتات العديد من الطرق لنشر بذورها، وسبب هذه الطرق انتشار النباتات الجديدة، الناتجة عن التكاثر الجنسي، إلى مناطق أكثر اتساعاً من جيل إلى الجيل الذي يليه. ويزداد انتشار النباتات إلى مناطق أكثر اتساعاً، تزداد فرص حفظ الأنواع النباتية وبقائها على قيد الحياة وبالتالي عدم انقراضها. في النباتات الزهرية، تتكون البذور داخل تركيب يسمى الثمرة **Fruit**، حيث تحيط الثمار بالبذور وتحميها، وتساعد في انتشارها لمواطن جديدة. وتوجد تنوعات كثيرة من هذه الثمار، منها الخوخ والطماطم والجوز والعنب وغيرها. ويمكنك أن تعرف التراكيب المختلفة التي تدخل في تكوين ثمرة البرتقال في الشكل (18). ما الثمار والبذور الأخرى التي تتناولها كجزء من طعامك؟

## فقرة اثرائية

### العلم والمجتمع والتنولوجيا

#### مزارعون لبعض الوقت

هل توقع أن العمل في مزرعة في يوم إجازتك الأسبوعية يمكن أن يكون مبهجاً ومرحياً في الوقت نفسه؟ ففي العام 1992، قام أحد معلمي العلوم في إحدى المدارس الثانوية بدعوة طلابه، بعد التنسيق مع معلم التربية الزراعية، إلى ربح دخل إضافي عن طريق زراعة بعض النباتات مثل الجزر والفول السوداني وغيرها، وبيع منتجاتها في المدرسة. وفي نهاية العام الأول، حقّق الطلاب المشاركون في المشروع دخلاً مربحاً. وبعد تقسيم الربح بين أفراد المجموعة الخمسة، تسألو: كيف يزيدون أرباحهم؟ فقرر الطلاب توسيع خط الإنتاج بتصنيع منتجاتهم. وبعد عرض الأمر على إدارة المدرسة، خصّصت لهم قطعة أرض غير مستغلة من حديقة المدرسة، وأمدّتهم بالدعم المالي اللازم. وحمل المنتج الأول للطلاب اسم «من الحقل إليك!»، وهو عبارة عن مخ FOX الفول السوداني الذي لاقى رواجاً كبيراً عند عرضه للبيع في المدرسة. واتفق إدارة المدرسة مع إحدى هيئات التجارة المحلية أن تتوّلى تسويق هذا المنتج مع هامش من الربح. وبحلول العام 1995، استطاع الطلاب التبرع بمبالغ مالية لصندوق المنح التعليمية لمساعدة زملائهم.

وتعود تجربة هؤلاء الطلاب جزءاً من الاتجاه العالمي نحو زراعة المحاصيل في مساحات صغيرة بعيداً عن المجتمعات الزراعية. وقام أناس كثيرون بزراعة المحاصيل على جوانب الطريق وفي الشرفات وفي التجمعات المدنية وفي أي مكان تصلح فيه زراعة النباتات. هذا وقد تضمن أحد التقارير الحديثة للأمم المتحدة أن واحداً من كل ثلاثة أشخاص مقيمين في المدن على مستوى العالم يزرع بعض أنواع المواد الغذائية.

وبتنوع الدافع لزراعة المحاصيل، يزرع بعض الناس لغذية عائلاتهم، والبعض يبيعون محاصيلهم للربح، والبعض الآخر يشتراك بجزء أو بكل ما يتوجه مع بنوك الغذاء والمحتجزين. هل لديك حديقة؟ ماذا تفعل بمحاصيلك؟

## مراجعة الدرس 1-1

1. صِفُ التراكيب الأساسية للأوراق النباتية والسوق والجذور .
2. قارِن بين الوظائف الأساسية للأوراق النباتية والسوق والجذور والأزهار .
3. أعد جدولًا لمقارنة تراكيب النباتات الزَّهرية أحادية الفلقة وثنائية الفلقة .
4. سؤال للتفكير الناقد: افترض أن نباتًا غابت عنه السوق . ما نوع الصعوبات التي يُواجهها لمنافسة النباتات الأخرى؟
5. أضف إلى معلوماتك: في أيِّ من تراكيب الورقة النباتية تحدث عملية البناء الضوئي؟ صِفُ باختصار هذه التراكيب .

# التغذية في النباتات

## Nutrition in Plants

### الأهداف العامة

- \* يُحدّد المواد والتراتيب المستخدمة في عملية البناء الضوئي .
- \* يُقارن بين خطوات عملية البناء الضوئي التي تستلزم وجود الضوء والخطوات التي لا تستلزم ضوءاً .
- \* يصف تركيب الورقة النباتية ، ويُحدّد أين تحدث عملية البناء الضوئي .
- \* يُفسّر دور كلّ من ضوء الشمس والماء وثاني أكسيد الكربون والكلوروفيل في عملية البناء الضوئي .



(شكل 19)

تُبيّن الأحداث التاريخية أنّ المجاعات تمثّل خطرًا داهمًا على حياة الإنسان والحيوان معاً ، لأنّ تلك الكائنات تُصبح غير قادرة على توفير متطلباتها من الطاقة لكي تبقى على قيد الحياة ، على عكس بعض الكائنات الأخرى التي تستطيع توفير متطلباتها كالكائنات ذاتية التغذية (شكل 19) . فمنذ حوالي 3 مليارات سنة ، تطوّرت لدى بعض الكائنات القدرة على استخدام مصدر الطاقة الامتناهي وهو الشمس . كيف تستخدم هذه الكائنات ضوء الشمس لتصنع منه الغذاء لنفسها ولغيرها من الكائنات؟


### 1. الطاقة المستمدة من ضوء الشمس

#### Energy from Sunlight

لا توجّد حياة على الأرض من دون الطاقة المستمدة من ضوء الشمس . فالكائنات الحية بحاجة للطاقة لكي تنمو وتكاثر وتستمرّ في حياتها . وهي تحصل على الطاقة الالزامية لها من الطاقة الكيميائية المخزنة في الغذاء والتي مصدرها عملية البناء الضوئي التي تقوم بها الكائنات ذاتية التغذية .

فالبناء الضوئي Photosynthesis هو العملية التي تستخدم فيها الكائنات ذاتية التغذية (التي تحتوي على الكلوروفيل) طاقة ضوء الشمس لبناء الكربوهيدرات (السكريات) من المواد غير العضوية البسيطة، مثل ثاني أكسيد الكربون والماء. غاز الأكسجين في الهواء ما هو إلا نتاج عملية البناء الضوئي الذي تراكم على مر العصور الماضية. فعملية البناء الضوئي تعتبر القاعدة الأساسية للحياة حيث يتم بواسطتها إنتاج الغذاء وتحرير الأكسجين اللازم لتنفس جميع الكائنات الحية (شكل 20). فلولاها لما استمرت الحياة على سطح كوكب الأرض.

تحدث عملية البناء الضوئي في النباتات الخضراء والطحالب وحيدة الخلية وبعض أنواع من الطلائعيات كالبكتيريا الزرقاء Cyanobacteria، والتي تعتبر جميعها كائنات ذاتية التغذية. تحدث عملية البناء الضوئي في النباتات الخضراء في البلاستيدات الخضراء فهي عضيات خلوية توجد بكميات كبيرة في خلايا الأوراق النباتية (شكل 20).



(شكل 20)


البناء الضوئي عبارة عن سلسلة من التفاعلات التي تستخدم الطاقة من الشمس لتحويل الماء وثاني أكسيد الكربون إلى السكريات والأكسجين. تحدث عملية البناء الضوئي داخل العضيات المعروفة بالبلاستيدات الخضراء.

## فقرة إثرائية


### علم الأحياء والبيئة

#### بكتيريا ذاتية التغذية عن طريق البناء الكيميائي

بعض أنواع البكتيريا تحصل على غذائها عن طريق استخدام الطاقة الكيميائية الناتجة عن أكسدة مركبات غير عضوية مثل كبريتيد الهيدروجين (H<sub>2</sub>S) وتحليلها، وذلك لاختزال ثاني أكسيد الكربون وتشتيته في مركبات كربوهيدراتية. لكن هنا تقوم البكتيريا بإنتاج نواتج غير الأكسجين. فمثلاً، خلال عملية البناء الكيميائي لكبريتيد الهيدروجين، يُنتج الكبريت (S) بدلاً من الأكسجين (O<sub>2</sub>). البناء الضوئي



#### البناء الكيميائي




تم اكتشاف هذا النوع من البكتيريا في العام 1977 في قاع المحيطات، بالقرب من فوّهات البراكين التي تخرج منها كميات كبيرة من غاز الكبريتيد الهيدروجين (H<sub>2</sub>S). هناك تعيش أنواع من بكتيريا الكبريت، وتقوم بتحويل هذا الغاز إلى طاقة لصنع منتجات عضوية تتغذى عليها ديدان كبيرة الحجم وغريبة الشكل، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الحيوانات.

## Chloroplasts

## 2. البلاستيدات الخضراء

تُوجَد في الخلايا النباتية عضيات تُنخَصَّص في القيام بعملية البناء الضوئي وتُعرَف بالبلاستيدات الخضراء. يُوضَح الشكل (21) كيف تُرَكَب البلاستيدات الخضراء من غشاء مزدوج يحيط بمادة جيلاتينية عديمة اللون تُعرَف بالستروما (الحشوة) Stroma. تحتوي الستروما على تراكيب تُعرَف بالجرانا Grana، وهي عبارة عن تراكيب قرصية الشكل متراصَّة بعضها فوق بعض (كل مجموعة هي جرانا Granum).

ويعُرَف القرص الواحد منها باسم الشيلاكويد Thylakoid التي يصل عددها إلى 15 قرصاً أو أكثر في الجرانا الواحدة. والقرص المعروض بالشيلاكويد مجوف من الداخل، ويحتوي تجويفه على صبغة الكلوروفيل وجميع الأصباغ الأخرى اللازمة لعملية البناء الضوئي. وتمتد حافات الشيلاكويد خارج حدود الجرانا لتشكَّل الصفائح الوسطية Middle Lamellae، تلتقي بحافات شيلاكويد آخر في جرانا مجاورة (شكل 21). بذلك، تزداد مساحة سطح الأقراص المُعرَّضة للضوء.




(شكل 21)  
تراكيب البناء الضوئي

تحتوي البلاستيدية الخضراء على عدّة أصباغ أساسية في عملية البناء الضوئي . أهمّها صبغ الكلوروفيل . يُعتبر الكلوروفيل Chlorophyll الصبغة الأساسية لعملية البناء الضوئي في جميع النباتات . هناك نوعان من صبغ الكلوروفيل: كلوروفيل «أ» Chlorophyll a وكلوروفيل «ب» Chlorophyll b اللذان يمتضمان الأطوال الموجية البنفسجية والزرقاء والحمراة من الطيف المرئي لضوء الشمس (شكل 22) التي تمد عملية البناء الضوئي بالطاقة الالزامية لها . ولا تمتصّ أصباغ الكلوروفيل الضوء الأخضر بل تعكسه ، لذلك تبدو معظم النباتات خضراء اللون .

(شكل 22)


يُوضّح هذا الشكل الأطوال الموجية للضوء التي تمتصّ بواسطة الكلوروفيل ونوعين من الأصباغ المساعدة . ما اللون الذي لم يتمتصّ؟



### 3. آلية البناء الضوئي

#### Mechanism of Photosynthesis


تستخدم النباتات ذاتية التغذية الطاقة الضوئية للشمس أثناء عملية البناء الضوئي لصنع جزيئات من الماء الكربوهيدراتية من الماء وثاني أكسيد الكربون ، وينتج غاز الأكسجين كمنتج ثانوي لهذه العملية . وُيمكّن تلخيص عملية البناء الضوئي في المعادلة الكيميائية التالية:



في هذه المعادلة ، يُنتَج سُكّر الجلو كوز سداسي الكربون  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$  . وُيمكّن للطاقة المختزنة في الروابط التساهمية للجلوكوز والكربوهيدرات الأخرى أن تُستخدَم لاحقاً لإنتاج جزيئات من مركب الأدينوزين ثلاثي الفوسفات (ATP) الذي يُعتبر عملة الطاقة للخلية الحية .

لا تتم عملية البناء الضوئي كلّها دفعه واحدة، بل تحدث على مراحلتين كما هو موضح في الشكل (23). وتعُرف المرحلة الأولى بالتفاعلات غير المعتمدة على الضوء (التفاعلات الضوئية) والثانية بالتفاعلات غير المعتمدة على الضوء (التفاعلات اللاضوئية) أو دورة كالفن. وتحدّث كلّ مرحلة منها في موقع مختلف داخل البلاستيدة الخضراء. تبدأ التفاعلات الضوئية بامتصاص الكلوروفيل للضوء في الجرانا، وخلالها تنشطر جزيئات الماء إلى أيونات هيدروجين ( $H^+$ )، وإلكترونات وغاز الأكسجين ( $O_2$ ). ويتكوّن خلال هذه المرحلة مركّبان كيميائيان هما: NADPH و ATP.

تلي المرحلة الأولى التفاعلات غير المعتمدة على الضوء (دورة كالفن) التي يستخدم فيها مركّب ATP و NADPH الناتجان عن التفاعلات المعتمدة على الضوء. وخلال تفاعلات هذه المرحلة، يتمّ اختزال غاز  $CO_2$  بواسطة الهيدروجين ليتكوّن السكر.



(شكل 23) تتم عملية البناء الضوئي في مراحلتين: التفاعلات المعتمدة على الضوء ودورة كالفن. في أي مرحلة يطلق غاز الأكسجين؟ وفي أي مرحلة تُنتَج السكريات؟

### 1.3 التفاعلات المعتمدة على الضوء (التفاعلات الضوئية)

#### Light-Dependent Reactions

التفاعلات المعتمدة على الضوء Light-Dependent Reactions هي المرحلة الأولى من عملية البناء الضوئي ، وكما يدلّ اسمها ، هي تعتمد في حدوثها على ضوء الشمس . وتحدث هذه التفاعلات في مناطق متّوّعة من غشاء الشيلاكوايد تُعرَّف بالنظام الضوئي (1) Photosystem I والنظام الضوئي (2) Photosystem II ، وهما وحدات جامعة للضوء في البلاستيدات الخضراء .

تبدأ عملية البناء الضوئي عندما يُمتص الضوء بواسطة الكلوروفيل والأصباغ الأخرى في النظام الضوئي (2) الذي يستخدم بعضاً من طاقة هذا الضوء لشطر جزيئات الماء ، بواسطة بعض الإنزيمات ، إلى أيونات هييدروجين ( $H^+$ ) وغاز أكسجين ( $O_2$ ) وإلكترونات عالية الطاقة ( $e^-$ ) . ينتشر معظم غاز الأكسجين الناتج إلى خارج الأوراق النباتية ليُصبح جزءاً من الهواء الذي نتنفسه .


وبتتبع مسار الإلكترونات في الشكل (24) ، نجد أنَّ الإلكترونات الكلوروفيل في النظام الضوئي (2) تكتسب بعضاً من طاقة ضوء الشمس وتُصبح الإلكترونات عالية الطاقة تتحرّك من النظام الضوئي (2) إلى النظام الضوئي (1) ، عبر مجموعة من المركبات الوسطية الموجودة في غشاء الشيلاكوايد ، والتي تُعرَّف بسلسلة نقل الإلكترونات Electrons Transport Chain . تُزود هذه الإلكترونات سلسلة نقل للإلكترونيات بالطاقة اللازمة للنقل النشط لأيونات الهيدروجين من السترووما إلى داخل التجويف الشيلاكوايد . ما الدور الذي يؤدّيه تدريج تركيز أيونات الهيدروجين ( $H^+$ ) الناتج في عملية إنتاج مركب ATP ؟

#### (د) تحرك أيونات الهيدروجين

يمتلىء السطح الداخلي لغشاء النيلاكويد بأيونات الهيدروجين موجبة الشحنة. يجعل هذا الفعل السطح الخارجي لغشاء النيلاكويد مشحوناً بشحنة سالبة وسطحه الداخلي مشحوناً بشحنة موجبة.

#### (أ) النظام الضوئي (2)

يُمتصض الضوء بواسطة الكلوروفيل أو الأصباغ الأخرى في النظام الضوئي (2)، ثم تنتقل الطاقة إلى الإلكترونات التي تمر بسلسلة نقل الإلكترونات. تقوم إنزيمات هذا النظام الضوئي بطرد جزيئات الماء إلى الإلكترونات عالية الطاقة، وأيونات هيدروجين ( $H^+$ ) وغاز الأكسجين ( $O_2$ ).



#### (هـ) تكوين مركب ATP

عند مرور أيونات الهيدروجين خلال بروتين الغشاء المعروف بإنزيم تصنيع ATP، يربط جزيئات ATP بروتين الغشاء المعرف بإنزيم تصنيع مجموعات فوسفات (باستخدام الطاقة المنطلقة من تدفق أيونات الهيدروجين) فت تكون جزيئات ATP.

#### (جـ) النظام الضوئي (1)

كما في النظام الضوئي (2)، تنقل الأصباغ طاقة الضوء إلى الإلكترونات المحورة في النظام الضوئي (1). ثم تلقط هذه الإلكترونات عالية الطاقة بواسطة جزيئات NADP<sup>+</sup> ليتكون NADPH، وهو مركب يُستخدم خلال عملية صنع سكر الجلوكوز.

#### (بـ) سلسلة نقل الإلكترون

تنقل الإلكترونات عالية الطاقة من النظام الضوئي (2) خلال سلسلة نقل الإلكترونات إلى النظام الضوئي (1). تستخدم الجزيئات في سلسلة نقل الإلكترونات الطاقة من الإلكترونات لكي تنقل أيونات الهيدروجين ( $H^+$ ) من الستروما إلى داخل النيلاكويد.



شكل (24)

تستخدم التفاعلات الضوئية طاقة ضوء الشمس لشحning ATP وغاز الأكسجين. تحدث هذه التفاعلات في أغشية النيلاكويد في البلاستيد الخضراء.

## 2.3 التفاعلات غير المعتمدة على الضوء (دورة كالفن) (التفاعلات اللاضوئية)


### Light-Independent Reactions (Calvin Cycle)

التفاعلات غير المعتمدة على الضوء (دورة كالفن)

### Light-Independent Reactions (Calvin Cycle)

هي المرحلة الثانية من عملية البناء الضوئي وتحدث في ستروما (حشوة) البلاستيدات الخضراء خارج الجرانا. تعتمد هذه التفاعلات على نواتج مجموعة التفاعلات المعتمدة على الضوء (ATP و NADPH) وعلى توفر غاز ثاني أكسيد الكربون  $\text{CO}_2$  (شكل 25). وعلى عكس التفاعلات المعتمدة على الضوء، لا تعتمد هذه التفاعلات على وجود الضوء كي تحدث، وهذا هو سبب إعطائها هذا الاسم. وسميت دورة كالفن نسبة للعالم ميلفن كالفن الذي اكتشفها.

ويمكنك تتبع هذه السلسلة من التفاعلات غير المعتمدة على الضوء أو دورة كالفن في الشكل (25)، حيث يستخدم مركب NADPH كمصدر للهيدروجين اللازم لثبيت غاز  $\text{CO}_2$  في صورة مادة كربوهيدراتية. ويتم ذلك باستخدام الطاقة المختزنة في جزيئات ATP، حيث يتكون جزيء واحد من سكر الجلوكوز مقابل 6 جزيئات من غاز  $\text{CO}_2$  التي تدخل إلى هذه التفاعلات.



(شكل 25)

تستخدم دورة كالفن كلاً من ATP و NADPH لإنتاج السكريات عالية الطاقة. وتحدث هذه الدورة في ستروما (حشوة) البلاستيدات الخضراء ولا يتطلب حدوثها وجود الضوء.

## فقرة اثرائية

### علم الأحياء في حياتنا اليومية

#### أصل الغذاء الصحي

تُعدّ الكربوهيدرات معقدة التركيب الموجودة في الحبوب مصدر طاقة مهمًا للإنسان. فالأرز والخبز والمعكرونة تُعتبر أمثلة على الأغذية الغنية بالكربوهيدرات معقدة التركيب.

## ٤. مصير السكريات الناتجة عن البناء الضوئي

### The Fate of Sugars Resulting from Photosynthesis

ما الذي يحدث لجميع جزيئات السكر المتكونة أثناء عملية البناء الضوئي؟ تحتاج الكائنات ذاتية التغذية، والكائنات غير ذاتية التغذية إلى الطاقة للقيام بوظائفها الحيوية مثل النمو والتكاثر. فالكائنات ذاتية التغذية وغير ذاتية التغذية تُحول طاقة الجلوکوز إلى طاقة تخزن في ATP، وتستخدم هذه الطاقة لأداء جميع الوظائف الحيوية.

وبإنتاج جزيئات السكر، تكون الكائنات ذاتية التغذية أول من يستهلكها. فالكبيرة منها مثل النباتات بحاجة إلى توفير الطاقة لجميع خلاياها، لذلك فإن للنباتات الكبيرة أجهزة لنقل السوائل التي تنقل السكريات على شكل سكرورز وجزيئات عالية الطاقة من الأوراق إلى الخلايا الأخرى في النباتات.

تستخدم النباتات بعضاً من الجلوکوز للنمو. فعلى سبيل المثال، تُكون النباتات جزيئات تركيبية مثل السيليلوز عن طريق ربط العديد من جزيئات الجلوکوز في سلاسل طويلة.

ويُعد السيليلوز أكثر المواد وفرة تُتجهها النباتات الحية، وهو يُكسب التراكيب النباتية القوّة والصلابة. والقليل من الكائنات الحية فقط يُمكّنها استخدام السيليلوز كمصدر للطاقة. والبكتيريا التي تعيش في القنوات الهضمية للأبقار تُعتبر مثالاً للكائنات التي تستطيع استخدام هذه المادة.

تخزن معظم النباتات الجلوکوز عالي الطاقة في صورة نشويات لا تُستخدم مباشرةً لإنتاج الطاقة أو التراكيب المختلفة. ومثل السيليلوز، تتكون النشويات من سلاسل من جزيئات الجلوکوز، ولكنها ترتبط بعضها ببعض بطريقة مختلفة عن ارتباطها في جزيئات السيليلوز. توجد النشويات في الأغذية النباتية مثل الذرة والبطاطا والقمح.

الكائنات غير ذاتية التغذية تستهلك النباتات والكائنات ذاتية التغذية الأخرى لكي تحصل على النشويات. ثم تهضم النشويات إلى جلوکوز، وتستخدم الطاقة المخزنة فيه من أجل احتياجاتها من الطاقة ولتكوين التراكيب المختلفة في أجسامها. وأي جزيئات جلوکوز عالية الطاقة لا تُستخدم يُمكّن أن تخزن مرتّة ثانية كجليلكوجين بواسطة الكائنات غير ذاتية التغذية.

## ٥. العوامل المؤثرة في عملية البناء الضوئي

### Factors Affecting Photosynthesis

تستلزم عملية البناء الضوئي عدّة عوامل أساسية: الطاقة من الشمس، الماء، ثاني أكسيد الكربون ووجود الكلوروفيل.

## 1.5 الضوء

### Light

تحدث عملية البناء الضوئي في مرحلتين. فتبدأ بمرحلة امتصاص الضوء التي تحدث فقط عندما تتعرض النبتة لضوء الشمس أو الضوء الصناعي. ويعمل الكلوروفيل والأصباغ الأخرى «كقرون استشعار ضوئية» تمتلك طاقة الضوء وتحولها إلى طاقة كيميائية، وينتج غاز  $O_2$  خلال هذه المرحلة. أما المرحلة الثانية التي تسمى دورة كالفن فلا تستلزم وجود الضوء لكي تتم. فهي تستخدم الطاقة المختزنة وبعض المواد المتكوّنة خلال التفاعلات المعتمدة على الضوء لتحويل  $CO_2$  إلى سكر بسيط مثل الجلوكوز. بالإضافة إلى القيام بعملية البناء الضوئي، فإن النباتات تنفس. والتنفس الخلوي عبارة عن تكسير الجزيئات مثل الجلوكوز إلى جزيئات أبسط مثل  $CO_2$  والماء، بالإضافة إلى انطلاق الطاقة التي تستخدمها النباتات لكي تنمو وتنتشر وتنتج المركبات الضرورية. وتعتبر نواتج التنفس الخلوي في النباتات هي نفسها النواتج عند الحيوانات، وهي ثاني أكسيد الكربون والماء.

تقوم النباتات بعملية البناء الضوئي والتنفس الخلوي في الوقت نفسه.

فهي تصنع الجلوكوز عن طريق عملية البناء الضوئي، وتستخدمه في الوقت نفسه، خلال التنفس الخلوي للحصول على الطاقة. تعتمد الكمية الصافية من السكر المتكوّنة بواسطة النباتات على عدة عوامل تتضمن معدل التنفس الخلوي في النباتات وكمية الضوء المتاحة.

نقطة التعويض Compensation Point عبارة عن كمية الطاقة الضوئية المقتصدة

أثناء عملية البناء الضوئي الالزامية لبقاء النباتات على قيد الحياة، أي أنها كمية الطاقة الضوئية التي تحتاج إليها النباتات لتوازن متطلباتها من الطاقة. فإذا كانت كمية السكر التي تنتجهما عملية البناء الضوئي متوازنة تماماً مع كمية السكر التي تستخدمها النباتات لكي تبقى حية، فلن تكون هناك طاقة مُكتسبة أو مفقودة. أما إذا كان السكر الذي تنتجه النباتات أكثر من الذي تستخدمه، فتكون قد اكتسبت طاقة. ويمكن للنباتات أن تخزن الطاقة الزائدة عن حاجتها أو تستخدمها للنمو. أما إذا استخدمت النباتات كمية من السكر أكثر من تلك التي تنتجه، فتكون قد فقدت طاقة. ماذا يمكن أن يحدث إذا استقبلت النباتات كمية من ضوء الشمس أقل من نقطة التعويض الخاصة بها لفترة زمنية طويلة؟

تحتفل كمية ضوء الشمس التي تحتاج إليها نباتات معينة لوصول إلى نقطة التعويض. بعضها مثل قصب السكر والحسائش المدارية الأخرى يحتاج كميات كبيرة من ضوء الشمس لينمو بصورة أفضل (شكل 26 - ب). أما نباتات أخرى مثل اللبلاب والعنب، فتحتاج إلى كمية معتدلة فقط من ضوء الشمس، كما يمكنها أن تنمو في الظل. وتُلقي بعض نباتات الحدائق بنباتات الظل.



(شكل 26 - أ)



(شكل 26 - ب)

(شكل 26)

قصب السكر عشب مداري يحتاج إلى الكثير من ضوء الشمس. ووجه الشبه بين الاحتياجات الضوئية للنباتات التي تنمو تحت الأشجار الشاهقة (أ) والاحتياجات الضوئية لقصب السكر (ب)؟

ينمو العديد من نباتات الظل في الغابات أسفل الأشجار الكبيرة، جنباً إلى جنب مع الأشجار الصغيرة (شكل 26 - أ). وتنمو نباتات الظل والأشجار الصغيرة ببطء نسبياً عندما يكون الضوء نادراً. من ناحية أخرى، عندما تسقط الأشجار المسنة أو يتم قطعها، يصل الضوء الوافر للأرضية الغابة، فتنمو نباتات الظل الصغيرة بسرعة أكبر لتصل إلى أقصى طولها وسمكها. وقد تبدأ الأشجار الصغيرة أيضاً بالنمو لتصل إلى حجمها الكامل المحمّل.


## 2.5 الماء

الماء هو المركب الأساسي لعملية البناء الضوئي. فتحتاجه النباتات لتكمل المرحلة الأولى من البناء الضوئي، وهي التفاعلات المعتمدة على الضوء. في العام 1630، أجرى العالم البلجيكي فان هلمونت تجربة ساعدت

العلماء على فهم دور الماء في عملية البناء الضوئي. ويوضح الشكل (27) كيف زرع فان هلمونت شجرة صفصاف وزنها 2 كيلوجرام في منتصف برميل يحتوي على 90 كيلوجراماً من التربة. قام فان هلمونت بريي الشجرة لمدة خمس سنوات بماء المطر، ثم وزن الشجرة وزن التربة بعد أن جفت. فوجد أن وزن الشجرة زاد 75 كيلوجراماً، في حين لم ينقص وزن التربة سوى 55 جراماً فقط (تذكّر أنَّ الألف جرام تُكون كيلوجراماً واحداً). لذلك يُعد النقص في وزن التربة ضئيلاً للغاية. يستنتج

فان هلمونت أنَّ نمو الشجرة يرجع غالباً إلى الماء الذي كان قد أضيف إلى التربة. ولكنَّه لم يكن على درجة كبيرة من الصواب، فقد أهمل الأخذ في اعتباره أنَّ مادة في الهواء هي ثاني أكسيد الكربون قد تكون أثَّرت أيضاً على وزن النبتة. ومن ناحية ثانية، لم يوضح هلمونت أنَّ التربة قد أسهمت بدرجة كبيرة بالمادة الجديدة المتكوِّنة في النبتة النامية. تُوضّح تجربة هلمونت الطريق للوصول أحياناً إلى المعرفة العلمية. فعندما يستكشف الباحثون حدثاً غير معروف، قد يكتشفون تفسيراً لإحدى الخطوات وليس جميعها. وفي هذه الأيام، يعرف العلماء أنَّ حوالي 90% من الماء الذي تمتصه النباتات يُفقد بالتبخر، ولا يُستخدم في عملية البناء الضوئي. وبالتالي، فمعظم الماء الذي امتصه النبات لا يُضاف إلى كتلة النبتة.

وعلى وجه العموم، يُؤثِّر مدى توافر الماء في عملية البناء الضوئي بطرقتين: الأولى تستلزم وجود الماء كمادة خام للتفاعلات الضوئية، والثانية لا بدَّ فيها من توافر الماء بدرجة كافية لحفظ الخليتين الحارستين مملوءتين لكي تبقى ثغور الورقة مفتوحة. فعندما تغلق الثغور، لا يمكن ثاني أكسيد الكربون دخول الأوراق، وسرعان ما تخلو النبتة من مركب أساسي آخر لعملية البناء الضوئي، وهو ثاني أكسيد الكربون.



(شكل 27)

تجربة فان هلمونت

(أ) السنة الأولى: زرع فان هلمونت شجرة صفصاف وزنها 2 كجم (كيلوجرام) في 90 كجم تقريباً من التربة.

(ب) السنة الخامسة: بعد مرور خمس سنوات، زاد وزن الشجرة 75 كجم ونقص وزن التربة 55 جم.

## مقدمة اثرائية

### العلم والمجتمع والبيئة والتكنولوجيا

#### تزايد غاز ثاني أكسيد الكربون



يستخدم الباحثون أنابيب لضخ المزيد من  $\text{CO}_2$  إلى منطقة ما في إحدى الغابات حيث يُمكّنهم دراسة تأثيرات  $\text{CO}_2$  على النظام البيئي. ويبلغ تركيز  $\text{CO}_2$  في هذه الرقعة من الأرض 550 جزءاً في المليون، وهو المستوى الذي سيتّم الوصول إليه في الغلاف الجوي للأرض في هذا القرن.

توجد حاليّاً كمّيات هائلة من غاز  $\text{CO}_2$  في الهواء لم تكن موجودة بهذه الكمية في أواخر القرن التاسع عشر. ففي العام 1870، كان تركيز  $\text{CO}_2$  في الهواء حوالي 270 جزءاً في المليون، أمّا الآن فقد بلغ تركيزه حوالي 360 جزءاً في المليون. وقد نتجت هذه الكمّيات الإضافية من  $\text{CO}_2$  عن حرق الأخشاب والوقود الأحفوري. فنحن نستخدم طاقة هذا الوقود في جميع الأنشطة تقريباً في أيّامنا الحاضرة.

يحبس غاز  $\text{CO}_2$  الحرارة في الغلاف الجوي بالطريقة نفسها التي تقوم بها الأسطح والجوانب الزجاجية للصوّبات الزجاجية تقريباً، لذلك يُسمّى فعل الاحتباس الحراري لغاز  $\text{CO}_2$  في الغلاف الجوي بظاهرة تأثير الصوّبات الزجاجية أو ظاهرة الاحتباس الحراري. ويعُدّ تأثير الصوّبات الزجاجية تأثيراً طبيعياً، فمن دونه سيبلغ متوسّط درجة حرارة سطح الأرض  $18^\circ\text{C}$ . ولكن إذا ازداد مستوى  $\text{CO}_2$  في الغلاف الجوي، سيشتدّ الاحتباس الحراري.

وقد تؤدي ظاهرة تأثير الصوّبات الزجاجية الشديدة إلى ظاهرة التدفئة العالمية. والتدفئة العالمية عبارة عن زيادة درجة حرارة الأرض نتيجة للتراكم المتزايد والسريع لغاز  $\text{CO}_2$  وغازات الاحتباس الحراري الأخرى. في اعتقادك، ماذا يُحتمل أن يتّجّ عن التدفئة العالمية؟ على الرغم من أنّ جميع العلماء لا يتفقون على أنّ المشكلة خطيرة، إلا أنّ الكثيّر منهم يعني بهذا الأمر. ويتساءل بعض الباحثين ما إذا كان يجب علينا أن نُحاوّل استعادة التوازن بين الأكسجين و  $\text{CO}_2$  في الغلاف الجوي. فكيف ذلك؟

للمزيد من الفهم الكامل لتأثير ظاهرة الاحتباس الحراري أو الصوّبات الزجاجية، يقوم بعض العلماء باستكشاف قدرة النباتات على امتصاص كمّيات  $\text{CO}_2$  أكبر من الكمّيات الموجودة في الهواء. فإذا استطاعت امتصاص كمّيات  $\text{CO}_2$  أكبر من الكمّيات الشائعة وبقيت سليمة، قد تكون قادرة على تقليل كمية  $\text{CO}_2$  في الغلاف الجوي.

واكتشف الباحثون أنّ بعض النباتات، ومنها محاصيل معينة، نمت بدرجة أكبر وأنتجت أوراقاً وثماراً أكثر عندما عُرّضت لمستويات من  $\text{CO}_2$  أعلى من المستويات الموجودة الآن في الهواء. ويعتقد بعض الباحثين أنّ التعرّض لمستويات عالية من  $\text{CO}_2$  سيسبّب في أن تُنتج المحاصيل الرئيسية مثل القمح والأرز حبّاً أكثر.


وقد اختبر العلماء أيضاً منطقة مليئة بالأشجار والشجيرات، وذلك بتعريف المنطقة لكمّيات إضافية من  $\text{CO}_2$ . وعلى الرغم من أنّهم توقّعوا أنّ الأشجار والشجيرات ستنمو بدرجة أكبر، إلا أنّهم لم يحدّدوا حتى الآن ما هي الآثار الجانبيّة التي ستطرأ على عناصر النظام البيئي. وعلى المدى البعيد، ليس من المؤكّد ما إذا كانت الأنظمة البيئية الطبيعية ستستفيد من المستويات العالية من  $\text{CO}_2$  في الهواء أم لا.

## Carbon Dioxide ( $\text{CO}_2$ )

## 3.5 ثاني أكسيد الكربون

إنّ العامل الثالث المؤثّر في عملية البناء الضوئي ، ويُستَخدَم لصنع السكريات البسيطة أثناء دورة كالفن .

وعلّى الرّغم من قيام العدّيد من العلماء بدراسة دور غاز  $\text{CO}_2$  في عملية البناء الضوئي ، إلّا أنّ العالّم الفرنسّي جان سنبيير أجرى تجربة قاطعة في العام 1782 . ويُوضّح الشّكل (28) كيف وُضعت أوراق نباتية في محلول بيكربونات (ماء يحتوي  $\text{CO}_2$ ) ، وعندما عُرّضت الأوراق لضوء الشّمس أنتجت ما أسماه سنبيير «الهواء النّقي» . ونّحن نعرف الأنّ أنّ سنبيير كان قد لاحظ الأكسجين  $\text{O}_2$  ، ومن جهة أخرى ، عندما وضع الأوراق في ماء خالٍ من  $\text{CO}_2$  وعرّض تلك الأوراق لضوء الشّمس ، لم تُنتَج الأكسجين . ومن هذه التجربة وتجارب أخرى أجرّها ، استنتج سنبيير أنّ الأوراق تستخدم  $\text{CO}_2$  في عملية البناء الضوئي التي تتطلّب أيضًا وجود الماء وضوء الشّمس لكي تُنتَج غاز  $\text{O}_2$  .



(أ) وجود  $\text{CO}_2$  في الماء أنتجت الأوراق الأكسجين ( $\text{O}_2$ ) عندما عُرّضت لضوء الشّمس .



(ب) غياب  $\text{CO}_2$  في الماء لم تُنتَج الأوراق الأكسجين ( $\text{O}_2$ ) عندما عُرّضت لضوء الشّمس .

(شكل 28)  
تجربة جان سنبيير ثبّتَ أهميّة غاز ( $\text{CO}_2$ ) في عملية البناء الضوئي .

## مراجعة الدرس 2-1


- لخُص الخطوات الرّئيسيّة لعملية البناء الضوئي .
- فسّر دور كُلّ من الضوء والماء و $\text{CO}_2$  في عملية البناء الضوئي .
- سؤال للتفكير الناقد: صمّم تجربة لقياس معدّل عملية البناء الضوئي مع الأخذ في الاعتبار المواد المتفاعلة ونواتج عملية البناء الضوئي .
- أضف إلى معلوماتك: يتّقل  $\text{CO}_2$  والماء أثناء عملية البناء الضوئي بالانتشار والأسموزيّة . في ظلّ أيّ ظروف تحدث كُلّ عملية منها؟

# النقل في النباتات

## Transport in Plants

### الأهداف العامة

- \* يشرح دور كلّ من الجذور والأوراق في نقل الماء في النباتات.
- \* يفسّر آلية نقل الماء والسكريات في النباتات.



(شكل 29)

حين تلمس نباتاً من نوع ما برفق، قد تتدلى أوراقه وتُصبح ضعيفة خلال ثوانٍ قليلة. فنبات الميموزا الحساس الموضح في الشكل (29)، يستجيب للمس بتقليل مظهر النبات الذابل. ربما يجعل هذه الاستجابة النباتات أقلّ عرضة لأن تكون وجبة لأحد الحيوانات أكلة الأعشاب.

### Transport in Roots

### 1. النقل في الجذور

هل تركت مرّة بعضاً من نبات الكرفس بعيداً عن الماء حتى ذبل؟ حين يحدث ذلك في المرّة القادمة، جرب وضع الكرفس في وعاء فيه ماء لساعات قليلة، ولا حظّ كيف يستعيد صلابته. فقد يكون ذبل لأنّه فقد الماء الذي تبخّر في الهواء، فيقال إنّ خلايا نبات الكرفس فقدت ضغط امتلاه. **ضغط الامتلاء** **Turgor Pressure** هو الذي يعطي دعامة للخلية الناتجة عن الضغط الأسموزي لغشاء الخلية على جدارها.

ويعتمد ضغط الامتلاء على الماء. فعندما تكون الفجوات العصارية المركزية في الخلايا النباتية ممتلئة بالماء، تضغط على الجدر الخلوي بالطريقة نفسها التي يحفظ بها الهواء باللون متفيحاً. وعندما تكون الفجوات المركزية غير ممتلئة، تنكمش الخلايا النباتية مثل بالون خالٍ من الهواء.

كيف يحصل النبات على الماء الضروري ليحتفظ بضغط الامتلاء؟ تقوم الجذور بثبيت النباتات في التربة وبامتصاص الماء والمعادن الذائبة بالماء. وتنطلب عملية الامتصاص هذه طاقة لكي تحدث، فلا يدخل الماء مباشرة من التربة إلى الجذور بل تتم بالأسموزية.

### فقرة إثرائية

#### علم الأحياء في حياتنا اليومية

##### النباتات الغارقة

يمكن أن يكون الري الزائد مؤذياً للنباتات تماماً مثل عدم ريها بماء كافٍ. فعندما تتشبّع التربة بالماء، قد لا يصل الأكسجين إلى الجذور. وإذا لم يكن متاحاً لخلايا الجذور المقدار الكافي من الأكسجين للتنفس الخلوي، لن تستطيع أن تُنتج الطاقة اللازمة لأداء الأنشطة الخلوية.



(شكل 30)

إذا لم تمتلك النبتة عناصر معادن كافية مثل النيتروجين الذي يحتوي على النيتروجين، سيتوقف نموها وتزول ألوان أوراقها.



(شكل 31)

تظل نبتة المنجروف الأحمر حية في مياه الشواطئ المالحة التي تقتل معظم النباتات الأخرى. فشبكة جذور نبتة المنجروف تدعم الأفرع المورقة للنبتة فوق الماء والطمي.

ويتطلب حدوث عملية الأسموزية، انتقال الماء من محاط ذي تركيز مائي عالي Hypotonic Medium أو ذي جهد مائي عالي High Water Potential إلى محاط ذي تركيز مائي منخفض Hypertonic Medium أو ذي جهد مائي منخفض Low Water Potential. تؤدي تركيبة التربة دوراً في عملية الامتصاص. التربة هي عبارة عن خليط من الرمل، الطين أو الطمي، الأملاح المعدنية (شوارد الأملاح)، الهواء وأنسجة الكائنات الحية المتحللة. تحتوي التربة في مستويات مختلفة على كميات مختلفة من هذه المكونات. تحتاج النباتات إلى الأملاح المعدنية لكي تنمو بشكل سليم (شكل 30).


في معظم الأحيان، يكون تركيز شوارد المعادن في التربة (جهد مائي منخفض) أكبر من تركيز شوارد المعادن داخل خلايا الجذور (جهد مائي عالي). تؤدي هذه الحالة إلى انتقال الماء من الجذور إلى التربة بحسب قانون الأسموزية، وهذا يُشكّل خطراً كبيراً على حياة النباتات. لذلك تكيفت الجذور مع هذا الواقع بعمليات تُوفّر الشروط الالزامية لانتقال الماء من التربة إلى داخل الجذور، وصولاً إلى الأنسجة الوعائية. لكن في حال وجود كميات كبيرة من المعادن في التربة (زيادة كمية السماد المضافة إلى التربة)، سيخرج الماء من الجذور إلى التربة، وهذا ما يُسمى بحرق الجذور Root Burn الذي يؤدي إلى موت النباتات. انظر الشكل (31) لتعرف كيف تبقى نباتات المنجروف الأحمر حية على الرغم من كون جذورها مغمورة في المياه المالحة.

## 1.1 النقل النشط للمعادن

### Active Transport of Minerals

يحتوي غشاء خلية الشعيرات الجذرية الماصة وخلايا البشرة الأخرى على بروتينات ناقلة نشطة Active Transport Proteins، تُضخ شوارد المعادن بواسطة النقل النشط من التربة إلى داخل الجذور. تستخدم هذه النوافل الطاقة الكيميائية المخزنة في جزيئات الـ ATP. يجعل هذا النقل البيئة داخل جذور النبتة ذات تركيز عالي بالشوارد المعدنية (جهد مائي منخفض) بالنسبة إلى التربة (جهد مائي عالي). عندئذ، ينتقل الماء من التربة إلى الجذور بالأسموزية (شكل 32).

تتطلب عملية النقل النشط للمعادن تأمين غاز الأكسجين إلى خلايا الجذور بكمية كافية، بالإضافة إلى السكريات، من أجل حدوث عملية التنفس الخلوي التي تؤمن الطاقة إلى هذه الخلايا. وتعتمد كمية الماء المُمتصّة من التربة بواسطة الأسموزية على كمية الماء في التربة. فعندما تحتوي التربة على كمية كبيرة من الماء، يكون معدل الامتصاص عالياً. أمّا أثناء الجفاف أو تدريجيًّا مستوى هطول الأمطار، فتكون نسبة الماء في التربة أقل، وينخفض معدل امتصاص الماء من التربة.



(شكل 32)


انقال الماء من التربة إلى الجذور لتنصل إلى الأنسجة الوعائية.

## 2.1 الانتقال إلى داخل الأسطوانة الوعائية

### Movement into the Vascular Bundle

يتقلل الماء والأملاح من نسيج البشرة إلى الأسطوانة الوعائية عبر ثلاثة ممرات موضحة في الشكل (53). الأول هو الممر خارج خلوي Apoplast ، وهو انتقال الماء عبر الجدر الخلوي، من القشرة وصولاً إلى البشرة الداخلية. وهذه الطريقة لا تعتمد على الأسموزية نظراً إلى أنَّ هذه الأخيرة تتطلب وجود الغشاء الاختياري التفاذية. وعلى هذا الأساس ، يتم انتقال الماء بهذه الطريقة بواسطة الانتشار الحرّ أو السلبي الذي لا يستوجب وجود طاقة أيضية ATP. الثاني هو الممر الخلوي الجماعي Symplast حيث ينتقل الماء والأملاح من خلية إلى خلية المجاورة عبر الروابط البلازمية Transmembrane. والثالث هو الممر عبر الغشائي Plasmodesmata حيث ينتقل الماء والأملاح الذائبة من خلية إلى أخرى عبر الجدر الخلوي والأغشية. يؤدّي النقل النشط والأسموزية دوراً في انتقال الماء والأملاح المعدنية من البشرة وصولاً إلى الحدود الداخلية للقشرة ، حيث توجد طبقة البشرة الداخلية المؤلّفة من خلايا ذات شكل قرميدي ، والتي تُغلف الأسطوانة الوعائية كما في الشكل (32) .

يُغْفَف جدر خلايا البشرة الداخلية الأربع الجانبية شريط غير منفذ للماء يُسمى شريط كاسبر Caspary Strip ، وهو شريط شمعي يمنع مرور الماء عبر الممر خارج خلوي ، وبالتالي يُجبر الماء على اتباع الممررين الآخرين باتجاه واحد نحو الأسطوانة الوعائية (شكل 33).



(33)

انتقال الماء والأملاح إلى الأسطوانة الوعائية  
عبر ثلاثة ممرات



(34)

حين يمتص الجذر الماء ، يدفع الضغط الجذري  
الماء صعوداً في الأنابيب الرجاجي الذي يؤدي  
دور ساق النبتة وأوراقها .

### 3.1 الضغط الجذري

لماذا تحتاج النبتة إلى آلية فاعلة تؤمن تحركاً باتجاه واحد؟ تُشَحَّ هذه الآلية للنبتة تأمين ضغط كافٍ لنقل الماء بعيداً عن التربة باتجاه الجذور ، ثمّ من البشرة باتجاه الأسطوانة الوعائية ، فصعوداً خالل الخشب في جذور النبتة وساقها . في البداية تُضخ شوارد المعدن من التربة إلى البشرة ، ثمّ إلى الخلايا الداخلية في القشرة بواسطة النقل النشط . وهذا يؤمّن الشروط اللازمة لانتقال الماء بالأسمازية باتجاه واحد من البشرة إلى القشرة ، فإلى البشرة الداخلية ، ثمّ إلى الأسطوانة الوعائية . يُنْتَج انتقال الماء هذا ضغطاً كبيراً يسمح بدفع الماء داخل الأسطوانة الوعائية باتجاه الخشب ، ثمّ صعوداً خالل الخشب نحو الساق . يُعَتَّبر الضغط الجذري Root Pressure نقطة الانطلاق لتحريك الماء داخل الجهاز الوعائي . لكن لا يكفي هذا الضغط لتحريك الماء صعوداً عشرات الأمتار كما في شجر غابات الشجر الأحمر التي يبلغ طولها 90 متراً . يُظَهِّر الشكل (34) عرضاً توضيحيًّا لمفهوم ضغط الجذور في جذر نبتة الجزر .

لكي تحصل النباتات على العناصر المعدنية من التربة ، تُساعدها كائنات أخرى . فالكائنات الممحَّلة مثل الفطريات مهمّة للغاية بالنسبة إلى النباتات ، لأنها تحرر المركبات العضوية والعناصر المعدنية من أجسام الكائنات الميتة ، ما يجعل هذه المواد متاحة لامتصاص بواسطة النباتات .

ففطر الميكوريزا أو الفطر الجذري عبارة عن فطريات خاصة تعيش في علاقة تكافلية مع جذور بعض النباتات . فتفرز الميكوريزا الأنزيمات الهاضمة التي تساعد في تكسير المواد العضوية في التربة ، وتحرر العناصر المعدنية التي تصبح النباتات قادرة على امتصاصها ، وفي المقابل تؤمن البذلة الغذاء كالسكريات للفطريات .

## 2. النقل إلى الأعلى في الخشب

### Upward Translocation in the Xylem

لقد وضّحنا أنّ الضغط الجذري غير كافٍ لنقل الماء والمعادن عالياً في الساق . تذكّر أنّ الخشب عبارة عن أنابيب خشبية متواصلة من الجذور مروراً بالساق ووصولاً إلى الأوراق . تشكّل هذه الأنابيب نظام نقل مؤلّف من أنسجة متخصّصة . بالإضافة إلى الضغط الجذري ، هناك قوى وآلية أخرى تعمل على سحب الماء صعوداً ، وهما الخاصية الشعرية Capillary Action والتنفس Transpiration .


### 1.2 الخاصية الشعرية (عمود متواصل من الماء)

#### Capillary Action(Continuous Column of Water)

يمكّن تفسير الخاصية الشعرية بالاعتماد على نظرية الشدّ والتماسك Cohesion-Tension Theory المتواصل . تنطلق هذه النظرية من الخواص المميّزة للماء ، وأهمّها التماسك Cohesion بين جزيئات الماء والتلاصق Adhesion بين جزيئات الماء وجدار الأنبوة (الخشب) أو الإناء الذي يوضع فيه الماء . وبالتالي ، إذا وضع الماء في أنبوب شعري وأغلق طفافه ، لا ينقطع عمود الماء داخل الأنبوب ، كما هو موضّح في الشكل (35) .

إذا ملأنا أنبوباً زجاجياً طويلاً مفتوح الطرفين بالماء ، ثم ثبّتنا على طرفه العلوي إسفنجاً مبللة بالماء ، وغمّسنا طرفه السفلي في كأس فيه ماء ، نلاحظ وجود اتصال مستمرّ بين كلّ من الإسفنج والأنبوب الزجاجي والكأس ، من دون أيّ انقطاع لاتصال الماء في هذا النظام . كيف يكون ممكناً دفع الماء في الأنبوب الزجاجي من دون أن يحدث انقطاع لعمود الماء؟ كيف يندفع عمود الماء إلى أعلى على جدار الأنبوب الزجاجي بالرغم من أنّ عمود الماء هذا يخضع لتأثير شدّ الجاذبية والاحتكاك بجدر الأنبوب؟

يمكّن أن تفسّر صفات الماء التماسكية والتلاصقية استمرارية وجود عمود الماء داخل الأنبوب من دون انقطاع . لكن علاماً يعتمد تحرك الماء هذا؟ إنّ أيّ فقدان للماء عن طريق تبخّر ماء الإسفنج يسحب مكانه ماء من الأنبوب الزجاجي الذي يسحب بدوره ماء من الكأس . وبالتالي ، إنّ معدل صعود الماء في الأنبوب الزجاجي يتتناسب طردياً مع معدل تبخّر الماء من الإسفنج .



شكل (35)

الخاصية الشعرية ، وهي نتيجة قدرة جزيئات الماء على الالتصاق بعضها بعض وبحدر أنبوب ما ، تجعل الماء يعلو في أنبوب رفيع أكثر منه في أنبوب عريض . ما الذي يجعل الماء يتحرك صعوداً في الأنبوب بعكس الجاذبية؟

يمكنا المضاهاة بين هذه الشعيرات الزجاجية، وعلى رأسها الإسفنجية، وبين النبات الذي ينمو في التربة الطبيعية. فيمكن أن تُشبّه ماء الكأس بماء التربة، والأنبوبة الشعرية بالخشب الناقل للماء، والإسفنجية بالسطح المبخر أي النتح في أوراق الأشجار.


ولكن هل تكفي الخاصية الشعرية لتفسير كيفية انتقال الماء من التربة إلى الأجزاء العالية في النبات، بعكس الجاذبية الأرضية وقوى الاحتكاك في جدر الأوعية الخشبية؟ نحن نعلم أن الماء لا يصعد إلى أعلى إلا إذا كان يخضع لقوى شد وجذب من أعلى، وقوى دفع من أسفل. لكن في المضاهاة السابقة، لا توجد قوى دفع من أسفل، وهذا يُبرر أن صعود الماء يعتمد أساساً على قوى الجذب والشد من أعلى. ما الذي يُشكّل قوى الجذب والشد من أعلى في النباتات؟

(شكل 36)

يسبب انحدار الجهد المائي من التربة إلى الساق (خلال النبات) فإلى الهواء قوة الشد النتحي. ينتقل الماء من منطقة جهد مائي عالي إلى منطقة جهد مائي منخفض.

## 2.2 الشد النتحي

إن قوة جهد الماء الناتجة عن عملية التبخر والتحتح من خلال ثغور الورقة تشد وتجذب الماء صعوداً، وهذا ممكّن بوجود عمود الماء في وعاء الخشب (شكل 36).



إن تحرّك الماء الناتج عن خاصيّة الماء التماسكية والتلاصقية يُمكّن أن يفسّر بجهد الماء. هناك انحدار في جهد الماء من الأكبر جهداً في التربة إلى الأصغر جهداً في الهواء. هذا الانحدار في المبدأ يدفع الماء صعوداً في خشب النبتة نحو الغلاف الجوي.

ومثل القاطرة التي تسحب وراءها مئات العربات، إن تحرّك الماء خارج الأوراق من خلال التغور خلال عملية التبخر والتنح يشدّ الماء صعوداً خلال الخشب من الجذور وحتى من التربة. تُسمى هذه العملية قوة الشد التurgi **Transpiration Pull**. يؤدّي ازدياد معدل التنح في الطقس الجاف إلى تدني الضغط الأسموزي في خلايا النباتات، فتتكمش النباتات وتذبل. وعندما تذبل، تُغلق التغور. لماذا؟


### Controlling Transpiration

### 3.2 ضبط النتح

هل يُمكّن تفسير إغلاق التغور وضبطها باستخدام مفهوم جهد الماء؟ تحدث عملية التنح على مستوى التغور، وتحفز عملية إقفال التغور وفتحها بوجود الانحدار في جهد الماء بين الخلايا الحارسة والخلايا المحيطة. في المقابل، يفتح هذا الانحدار عن آلية نقل أملاح البوتاسيوم ( $K^+$ ). يحفّز وجود الضوء النشط لاملاح البوتاسيوم عبر قنوات خاصة في غشاء الخلايا الحارسة الذي يتطلّب وجود طاقة ATP. تراكم أملاح البوتاسيوم في فجوات الخلايا الحارسة (شكل 37)، ما يؤدّي إلى انخفاض جهد الماء فيها نسباً إلى جهد الماء في الخلايا المحيطة. وبناءً على ذلك، يتحرّك الماء بحسب انحدار جهد الماء من الخلايا المحيطة في البشرة (جهد مائي عالي) إلى داخل الخلايا الحارسة (جهد مائي منخفض) بالأسموزية، ما يؤدّي إلى انتفاخ الخلايا الحارسة وفتح التغور. خلال الليل وأنباء غياب الضوء، يحدث العكس وتُغلق التغور.

شكل (37)

انتقال أملاح البوتاسيوم إلى داخل الخلايا الحارسة أو خارجها يؤثّر على عملية فتح التغور.



تضمن عملية النتح جذب الماء إلى أعلى قمة في الشجرة مع الحفاظ على ضبط هذه العملية ، في إطار الحفاظ على اتزان الماء داخل النبتة ، وذلك بضبط عملية فتح الثغور وإغلاقها . و كما رأينا ، إن التحكم في عملية فتح الثغور وإغلاقها يتأثر بجهد الماء في الغلاف الجوي والتربة ، أي يعتمد على الظروف البيئية المحيطة بالشجرة . عندما تكون الظروف البيئية صعبة (حرارة وجافة وتكون سرعة الرياح قوية) ، يزداد معدل النتح وتزداد خسارة النبتة للماء . في هذه الحالة ، تُغلق النبتة ثغورها لكي لا تذبل وتموت . في حال وجود كمية كبيرة من الماء في التربة ، بالإضافة إلى أمطار وفيرة وهواء رطب ، تفتح النبتة ثغورها ويرتفع معدل النتح بشكل لا يؤثر على فقدان النبتة لكميات كبيرة من الماء .

### 3. انتقال العصارة الناضجة في اللحاء

#### Transportation of the Elaborated Sap in Phloem

يتم تحويل السكر المنتج خلال عملية البناء الضوئي إلى سكر ثنائي "السكروز" ، قبل أن يتم تحميشه في اللحاء ونقله إلى أجزاء النبتة . السكرورز هو الشكل السائد للسكر الذي ينقله اللحاء . ويعتبر نقل هذا المذاب في اللحاء سريعاً (2.5 سم في الدقيقة الواحدة) ، لكن ليس بسرعة انتقال العصارة النباتية الصاعدة في الخشب . تتحرك العصارة الناضجة داخل أنسجة اللحاء صعوداً أو هبوطاً على حد سواء . من الممكن نقل السكرورز من مكان صنعه (الورقة) إلى مكان للتخزين (الجذر ، الفواكه أو البذور) أو إلى المناطق النشطة بالنمو ، مثل الأنسجة الإنسانية القمية في قمة الجذر والساقي (شكل 38) .


(شكل 38)

جهاز النقل في النبات


الأوراق: تنقل خلايا المتبعة في الأوراق السكريات إلى اللحاء لينقلها إلى باقي أجزاء النبات ، في حين تستقبل الماء والمعادن من الخشب . يتبع الماء من خلال الثغور في الورقة .

السوق: ينتقل الماء والمواد الغذائية والسكريات خلال النسيج الوعائي في السوق إلى جميع أجزاء النبتة .

الجذور: يمتص الخشب في جذور النبتة الماء . تستهلك الجذور السكريات التي وصلت إليها بواسطة اللحاء وتحزنها .



وقد فُسّر انتقال السكريات على أحسن وجه بواسطة فرضية التدفق بالضغط The Pressure-Flow Hypothesis. فالسكريات تُنقل من منطقة في النبتة تُسمى المنبع Source إلى منطقة تُسمى المصرف Sink. ويمكنك تتبع الخطوات التي تصفها هذه الفرضية في الشكل (39). والمنبع عبارة عن أي جزء في النبتة حيث تُنتَج السكريات عن طريق عملية البناء الضوئي أو عملية تكسير لجزيئات النشا. أمّا المصرف، فهو الجزء حيث تُستهلك السكريات أو يتم تخزينها.



(شكل 39)

1. تُنقل السكريات من خلايا المنبع إلى خلايا الأنابيب الغربالية خلال عملية النقل النشط، فيُصبح تركيز السكر في اللحاء عاليًا.
2. بسبب التركيز العالي للسكر في اللحاء، ينتشر الماء إلى داخل خلايا الأنابيب الغربالية رافعًا ضغط الماء.
3. يُسبّب الضغط تدفق العصارة (المحلول السكري) خلال اللحاء.
4. تُنقل السكريات من اللحاء إلى خلايا المصرف. ينتشر الماء إلى الخشب خافضًا ضغط الماء في اللحاء.

وتعُد أوراق النبتة منابع نموذجية، أمّا الجذور فتعُد مصارف نموذجية. ومن ناحية ثانية، إنّ الجذور التي اخترنَت فيها السكريات يُمكِّن أن تعمل كمنبع أيضًا. أين المصارف في نبتة البطاطا؟

في بداية العملية، تُضخ السكريات بالنقل النشط من المنبع إلى الأنابيب الغربالية، ثم يدخل الماء إلى خلايا الأنابيب الغربالية بحسب انحدار الجهد المائي في الخشب بالأسماوِزية رافعًا ضغط الماء. يتحرّك كلّ من الماء والسكريات إلى أسفل بحسب منحدر (أو تدرج) التركيز.

وفي النهاية، تُنقل السكريات من الأنابيب الغربالية إلى خلايا المصرف بالنقل النشط، ويترك الماء الأنابيب الغربالية إلى الخشب بالأسماوِزية. يجب أن تتوفر الطاقة لكي تتم عملية ضخ السكريات إلى داخل الأنابيب الغربالية، وإلى خارجها في بعض الأحيان. ومن اللازم أن تكون خلايا الأنابيب الغربالية في اللحاء حية لكي تؤدي وظيفتها، لأنّ الخلايا الحية فقط يُمكِّنها أن تُوفّر الطاقة اللازمَة لعملية النقل النشط.

تحريك السكريات خلال النباتات بشكل أبطأ من سرعة تحريك الماء .  
ويبلغ أسرع معدل للنقل باللحاء حوالي 2 متر في الساعة . عند هذه السرعة ، كم من الوقت تستغرق السكريات لكي تنتقل إلى أسفل خلال جذع شجرة طوله 30 متراً؟

### مراجعة الدرس 3-1

1. لماذا تكون الخاصية الشعرية غير كافية لانتقال الماء صعوداً داخل النبتة؟
2. صفات الآليات التي تستخدمها النباتات للحصول على الماء والمغذيات ولنقل السكريات .
3. سؤال للتفكير الناقد: لماذا يكون نقل الماء في النباتات أسرع في الظهيرة وأبطأ في الليل؟ ما العوامل البيئية التي قد تؤثر في ذلك؟
4. أضف إلى معلوماتك: كيف يؤثر منحدر (أو تدرج) الترکيز على الأسموزية؟

## الأهداف العامة

- \* يُحدّد موقع منشأ الخلايا في النباتات .
- \* يُقارِن بين الأنسجة الإنسائية والأنسجة الأخرى في النباتات .
- \* يُقارِن بين نمطين من نمو النباتات .
- \* يشرح كيف يحدث النمو الأولي والنمو الثانوي في النباتات .



(شكل 40)

في فن تنسيق النباتات في اليابان ، يبتكر الناس أشجاراً مصغّرة مزروعة في أصص ويوّجهون نموها إلى أشكال جميلة عن طريق ربط أطرافها بسلك وتقليمها كما هو موضح في الشكل (40) . وأشجار هذا الفن الياباني ليست من النوع الصغير ، لكن عمال البساتين يستطيعون التحكّم بالحجم عبر زراعة الأشجار في أصص صغيرة قليلة العمق ، وعن طريق تهذيب الجذور والفروع المورقة الجديدة أو تقليمها بانتظام .

## 1. الأنسجة الإنسائية (المرستيمية): موقع النمو

### Meristems: Sites for Growth

هل تعرف كيف ينمو الإنسان في الطول؟ كلّما زاد طول عظام معينة مثل عظام الفخذ والعمود الفقري ، يزداد طولنا. تنمو النباتات لتصبح أكثر طولاً عن طريق زيادة طول قمم الجذور والسوق أو أطرافها . وإذا نما الناس في الطول بالطريقة نفسها التي تنمو فيها النباتات ، سينموون عند أطراف أصابعهم وعند قمم رؤوسهم .

تُسمى الأنسجة النامية للنباتات بالأنسجة الإنسائية (أو المرستيمية) . Meristems


وتحتوي النباتات العشبية والخشبية أنسجة إنسانية عند أطراف السوق والفروع أو قممها، وعند أطراف الجذور أو قممها، وفي البراعم عند موضع اتصال الأوراق بالسوق.

بالإضافة إلى ذلك، توجد أنسجة إنسانية في النباتات الخشبية، بين نسيج الخشب ونسيج اللحاء في الجهاز الوعائي، وبالقرب من أسطح السوق. ووظيفة الأنسجة الإنسانية هي إنتاج خلايا جديدة بواسطة الانقسام الميتوzioni. وكما هو شائع في الانقسام الميتوzioni، فإن الخلايا الجديدة التي تم إنتاجها تكون متشابهة في بادئ الأمر. ومن جهة أخرى، تخصص الخلايا في نهاية الأمر أو تتميز لتكوين واحداً من ثلاثة أنواع من الأنسجة التي تكون النباتات، وهي النسيج الوعائي أو البشرة (النسيج الجلدي) أو النسيج الأساسي.

تُسمى الأنسجة النامية عند قمم الجذور والسوق أو أطرافها الأنسجة الإنسانية القمية (أو الأنسجة المرستيمية القمية)، Apical Meristems، وهي تُسبب نمواً أطراف السوق والجذور أو قممها في الطول. وبسبب نشاط الأنسجة الإنسانية القمية، تصبح النباتات أكثر طولاً، وتصبح جذورها أكثر عمقاً إلى داخل التربة.

ت تكون الأنسجة الإنسانية البرعمية الإبطية Axillary Meristems في البراعم التي تظهر في مواضع اتصال الأوراق في السوق، والتي تُسمى آباط الأوراق. وتُسبب هذه الأنسجة نمواً الفروع الجانبي على السوق في الشكل (41).

(شكل 41)  
الأنسجة الإنسانية هي مناطق النمو السريع، مثل تلك الموجودة في قمم الجذور والسوق أو أطرافها.



تُسمى الأنسجة الإنسانية التي تقع في سوق النباتات الخشبية وجذورها بشكل موازٍ لمحيط العضو بالأنسجة المرستيمية الجانبية، Lateral Meristems، وهي المسؤولة عن نمو النباتات في العرض (ازدياد قطر الساق والجذور).

## 2. النموّ الأولي أو الابتدائي Primary Growth

يوجَد نمطان من النمو في النباتات البذرية. ففي أحد نوعي النمو، تنمو جميع النباتات لتصبح أكثر طولاً وأكثر عمقاً داخل التربة. وفي النوع الآخر، تنمو النباتات الخشبية لتصبح أكثر عرضاً. وتُسمى العملية الأولى أي استطالة السوق والجذور بالنموّ الأولي أو الابتدائي Primary Growth، حيث تنمو سوق النباتات لتصبح أكثر طولاً، وتنمو جذورها لتصبح أكثر عمقاً. ويحدث هذا النموّ في جميع النباتات.


تُعرف الساق الأولى التي تبزغ من أيّ بذرة بالساق الابتدائية أو الأولى، وهي تُكون السوق والأوراق. وللساق الابتدائية نوعان من الأنسجة الإنسانية: الأنسجة الإنسانية القيمية والأنسجة البرعمية الإبطية الموضّحة في الشكل (42). فالأنسجة الإنسانية التي توجَد في قمم جميع السوق تُكون الساق والأوراق، أمّا البرعم الإبطية الموجودة عند قاعدة كلّ ورقة، فيُمكِّن أن تُكون فرعاً أو زهرة. ولأنّ البرعم الإبطية يُمكِّن أن تُكون فروعًا جانبية من الساق، فإنّها تُسمى أيضاً البرعم الجانبية Lateral Buds.

في معظم النباتات، تبقى البرعم الإبطية غير نشطة بفعل هرمونات الأكسين التي تُفرَز في الأنسجة الإنسانية عند قمة الساق. وإذا أتِفت هذه القمة أو أُزيلت، سيتوقّف إنتاج هذا الهرمون، وستبدأ البرعم الإبطية بالنموّ. وقد تكون قد رأيت كيف يستغلّ عمال البستين فائدة هذه الطريقة، فلكي يجعلوا النباتات تنمو بصورة كثيفة، يقومون بتقليل (قصّ) قمم الفروع. وُتُستخدم هذه التقنية أيضًا لعمل الأسوار، فقطع قمم السوق يُزيل التثبيط الهرموني، لكي تبدأ البرعم الإبطية في النمو إلى الأفرع الجانبية.

يستلزم النموّ الأولي أو الابتدائي للجذور والسوق حدوث ثلات خطوات: الانقسام الخلوي، ثمّ الاستطالة، فالتمايز. في الخطوة الأولى، يُكُون الانقسام الخلوي في النسيج الإنسائي القيمي خلايا جديدة. في الخطوة الثانية، تنمو الخلايا في الطول في منطقة من الجذر تُسمى منطقة الاستطالة، وتدفع استطالة الخلايا الجذر خلال التربة. في الخطوة الثالثة، تُصبح الخلايا متخصّصة في منطقة التمايز، وتحدث في هذه المنطقة تغييرات للخلايا لتصبح جزءاً من النسيج الوعائي (الخشب أو اللحاء)، أو النسيج الجلدي (الشعيرات الجذرية)، أو النسيج الأساسي (خلايا بارنشيمية أو دعامية).

أين تتمرّك الخلايا في كلّ خطوة من الخطوات الثلاث في الجذر في الشكل (42)؟

تُغطّي قمة الجذر مجموعة من الخلايا البارنشيمية التي تُحيط به إحاطة كاملة لحماية القمة النامية. تُشكّل هذه الخلايا القلنسوة Rootcap ، وهي تناكل ثم تنشأ باستمرار خلال استطالة الجذر عميقاً في التربة .



(شكل 42)

يظهر النموّ الأولي في جميع النباتات ، وفيه تنمو السوق أكثر طولاً وتنمو الجذور أكثر عمقاً .

### Secondary Growth

### 3. النموّ الثانوي

إذا راقبْتَ نموّ إحدى الأشجار على مدار فترة زمنية طويلة ، قد تلاحظ أنّ الشجرة تنمو في العرض كما تنمو في الطول . فاثناء النموّ الثانوي Secondary Growth ، تنمو جذور نباتات بذرية معينة وسوقها وفروعها أكثر في العرض . ويعتبر ازدياد عرض جذع شجرة مثالاً للنموّ الثانوي .

لا يحدث النموّ الثانوي في جميع النباتات . فمعظم النباتات العشبية يحدث فيها نموّ أولي فقط . وعادة ما يلاحظ النموّ الثانوي فقط في الكرمات والشجيرات والأشجار . وعلى سبيل المثال ، يحدث النموّ الثانوي في النباتات عارية البذور . وتنتج عن النموّ الثانوي طبقات من نسيج خلوي ميت يُسمى الخشب Wood .

ويعتبر النموّ الثانوي تكيّفاً يمكّن بعض النباتات الخشبية من البقاء على قيد الحياة في بيئات معينة . وكلّما ازداد عرض ساق النبتة ، أصبحت أكثر قوّة . وتسمح الساق القوية للنبتة بأن تنمو أكثر طولاً ، وتصبح لديها فرص متزايدة للحصول على الضوء ، وبسبب تناقص النباتات على الضوء ، فإنّ احتمال حصول النباتات المترفعة على ضوء الشمس الحيوي أكبر ، لذلك هي تتكاثر بنجاح . فالنموّ الثانوي عبارة عن التكيّف الذي يُسهم في سيادة النباتات الخشبية في أنظمة بيئية عديدة .


## 1.3 الأنسجة الإنشائية الجانبية

### Lateral Meristems

يُسَبِّب حدوث المُوَمَّثُ الثانوي انقساماً خلويّاً في تراكيب تُسمّى الأنسجة الإنشائية الجانبية. وبخلاف الأنسجة الإنشائية القمّية التي تتمركز عند قمم الجذور والسوق، تتمركز الأنسجة الإنشائية الجانبية ضمن جوانب الجذور والسوق وبموازاتها. وبشكل عام، تتحذ الأنسجة الإنشائية الجانبية شكلاً مشابهاً لأسطوانة جوفاء داخل الجذر أو الساق وتُسمى نسيج الكمبيوُم.

### 2.3 الكمبيوُم

هو النسيج الإنشائي الذي يُنْتَج خلاياً جديدة للنموّ الجانبي في النباتات الخشبية. يوجد نوعان شائعان من الكمبيوُم: الكمبيوُم الوعائي والكمبيوم الفلّيني. يُوضّح الشكل (43) قطاعاً مستعرضاً لجذع شجرة، يظهر فيه نوع من الكمبيوُم. أيّ نوع منها يُعدّ جزءاً من قلف الشجرة؟ تُظهر النباتات ثنائية الفلقة نمواً ثانويّاً في نطاق الأنسجة الإنشائية التي تُسمى الكمبيوُم الوعائي. وت تكون هذه الأنسجة بين الخشب الأولي واللحاء الأولي ضمن الحزم الوعائية المنفردة، كما يُظهر بعد العام الأول.



(شكل 43) المُوَمَّثُ الثانوي في النباتات ثنائية الفلقة

ثم تُنقسم خلايا الكمبيوُم الوعائي لتشكل طبقة جديدة من الخشب الثانوي لنهاية مركز الساق، وخلايا اللحاء الثانوي للنهاية الخارجية، كما يُظهر بعد العام الثاني. تُشكّل هذه الأنسجة المختلفة كلاً من القلف والخشب ضمن الساق الناضجة.

### تقليم الأشجار

يُسبِّب نمو النباتات مشكلات أحياناً، مثلًّا عندما تنمو شجرة على خطوط القوى الكهربائية أو على أملاك الجيران. عادةً، يعتني بالأشجار في شوارع المدينة عمَّال البلدية أو مجلس الحي. اتصل بمجلس الحي الذي تعيش فيه وتعرَّف ماذا تفعل إذا لاحظت شجرة نامية على ملكية عامة بشكل يُستَرعي الانتباه. من ناحية أخرى، تُعتبر الأشجار المزروعة في الملكية الخاصة مسؤولية مالكيها الذين يستأجرون مؤسسة خدمية أو هيئة خاصة لمساعدتهم في رعايتها. ربَّما لإجراء حديث مع شخص ما في إحدى الهيئات الخاصة لتقليم الأشجار في الحي الذي تعيش فيه. كيف يتم تهذيب الأشجار أو إزالتها؟ ما التجهيزات الالزامية لذلك؟ اسأل عن بعض المواقف التي استلزمت إزالة الأشجار.

## Vascular Cambium

### (أ) الكمبيوُم الوعائي

يقع أحد نوعي الكمبيوُم، وهو الكمبيوُم الوعائي **Vascular Cambium**، بين الخشب واللحاء. يُنتَج الانقسام الخلوي في الكمبيوُم الوعائي خشبًا جديداً إلى الجهة الداخلية من الكمبيوُم، ولحاءً جديداً إلى الجهة الخارجية. ويحدث نموُّ الخشب الجديد واللحاء الجديد في صورة دورية. ففي كلّ عام، يُنتَج الكمبيوُم الوعائي خشبًا ولحاءً جديدين أثناء موسم نمو النباتات. في بداية العام الثاني لنمو النباتات الخشبية، يُسمَّى الخشب الجديد الذي يُنتَجه الكمبيوُم الوعائي بالخشب الثانوي **Secondary Xylem**، وهو يُعرف عموماً باسم الخشب. ويسُمَّى اللحاء الجديد المتكون بواسطة الكمبيوُم الوعائي كلّ عام باللحاء الثانوي **Secondary Phloem**، لكنه لا يحمل اسمًا شائعاً. وكلَّما نمت السوق والجذور في العرض عاماً بعد عام، ينقل الخشب الثانوي الماء، في حين ينقل اللحاء الثانوي السكريات داخل النباتات.

## Cork Cambium

### (ب) الكمبيوُم الفليلي

يُعرف النوع الآخر من الكمبيوُم بالكمبيوم الفليلي **Cork Cambium**، وهو النسيج الإنشائي الموجود بين اللحاء والبشرة. ويُستبدل الانقسام الخلوي في الكمبيوُم الفليلي طبقة القشرة وطبقة البشرة أو النسيج الجلدي في النباتات بالفللين الذي يحمي الشجرة. ويَتَّحد اللحاء الثانوي والكمبيوم الفليلي والفللين لتشكُّون القلف الذي يحيط بجذع الشجرة. ربَّما تعرف الفللين الطبيعي، وهو المادة المستخدمة في صناعة بعض أنواع لوحات الإعلانات.


وللعديد من الأشجار طبقات عديدة من الفللين الذي يُعتبر نسيجاً ميتاً ولا يُمْكِنه التمدد. ونتيجة لذلك، يشقّ النموُّ الأفقي المستمر لجذوع الأشجار أو يفلق الطبقات الخارجية، مما يُسبِّب انشقاق طبقات الفللين وبالتالي انشقاق القلف. وللأشجار مثل البلوط قلف متشقّق بسبب نموُّ الكمبيوُم الفليلي.

وثيرَّي أشجار معينة ويُحافظ عليها من أجل استخلاص الفللين منها. فأشجار البلوط الفليلي في البرتغال تُنتج حوالي 60% من الإنتاج العالمي للفلين الطبيعي.

ويمكِّن استخلاص الفللين من أشجار البلوط الفليلية كلّ 7 إلى 10 سنوات، عندما تبلغ الأشجار 25 عاماً من العمر، ويمكِّن للأشجار التي يصل عمرها إلى 200 عام أن تظل تُنتج الفللين الصالح للاستعمال. ولا بدَّ أن يُراعي جامعو الفللين عدم إتلاف طبقة الكمبيوُم الوعائي عند استخلاص الفللين من الأشجار، فإذا أُزيلت هذه الطبقة تموت الشجرة.

### 3.3 تكوُّن الخشب

#### Formation of Wood



(شكل 44)

قارن بين خشب الربيع و خشب الصيف في هذا القطاع المصبوغ. لماذا يكون خشب الربيع أكثر اتساعاً؟

يتراكم النسيج الخشبي سنوياً ليُنتج ما تُسمّيه بالخشب Wood. تستمر الطبقات الخارجية الجديدة فقط من الخشب الشانوي في نقل الماء وتكون فاتحة اللون، و تُسمّى بالخشب العصاري Sap Wood . كلّما ازداد عرض الساق الخشبية ، أصبحت أنسجة الخشب القديمة والموجودة ناحية مركز الشجرة مصمّمة وغير قادرة على نقل الماء. بالإضافة إلى ذلك ، يُصبح لونها داكنًا مع مرور السنين لاحتواها على نسب متزايدة من الشوائب التي لا يمكن التخلص منها.

تُسمّى هذه الطبقات القديمة من الخشب بخشب القلب Heart Wood . يحتوي خشب القلب على مواد مثل الزيوت والأصباغ والمواد الراتينجية والتاتينات غير الموجودة في الخشب العصاري. يُظهر الشكل (44) تراكيب الخشب. لاحظ سلسلة الحلقات متداخِلة المركز التي تُسمّى حلقات الشجرة Tree Rings أو حلقات النمو Growth Rings . كيف تتكوّن هذه الحلقات؟


في معظم الأقاليم المناخية المعتدلة، يكون نمو الشجرة موسمياً. عندما يبدأ النمو في فصل الربيع يبدأ الكمبيوم الوعائي بالنمو بسرعة متنجاً خلايا واسعة من خلايا الخشب فاتحة اللون ذات جدر رقيقة. النتيجة هي تكون طبقة فاتحة اللون وواسعة من الخشب تُسمّى الخشب المبكر Early Wood أو خشب الربيع Spring Wood ، ويكون هذا النوع من الخشب قادرًا على نقل كميات كبيرة من الماء. مع استمرار موسم النمو في الصيف ، وعندما يكون الطقس أكثر جفافاً وحرارة ، يُنتج الكمبيوم الوعائي خلايا أصغر لكنّها تميّز بوجود جدر خلايا أسمك ، تشكّل طبقة من خلايا الخشب داكنة اللون وتستطيع نقل كميات من الماء أقل من تلك التي ينقلها الخشب المبكر. تُسمّى هذه الطبقات الخشب المتأخر Late Wood أو خشب الصيف Summer Wood . يحدث نمو هذه الطبقات بمعدل أقل لأنّها تحدث في موسم الجفاف.

هذا التبادل أو التعاقب في الخشب الداكن والخشب الفاتح يُنتج ما تُسمّيه عادة حلقات النمو. تتألّف كل حلقة من نطاق من الخشب الداكن ونطاق من الخشب الفاتح ، وتناظر كل حلقة سنة من النمو ، فإذا قمتَ بعدّ الحلقات في مقطع عرضي من ساق الشجرة الخشبي ، يمكنك تقدير عمر الشجرة . يُعطي أيضًا مقدار اتساع الحلقة معلومات عن الظروف البيئية (الطقس رطب أم جاف) التي كانت سائدة في سنة معينة من النمو. فتشير الحلقات الواسعة إلى أنّ الطقس السائد كان ممطرًا والحرارة كانت مناسبة ، في حين تشير الحلقات الضيّقة إلى حالة من الجفاف في الطقس. وتتكوّن حلقات النمو أيضًا في الجذور. لماذا يُمكّنك أن تُحدّد عمر الشجرة عن طريق عدد حلقات النمو فيها؟

## 4.3 تكوُّن القلف

### Formation of Bark

تُتَّبِعُ معظم الأشجار القلف الذي يتضمن جميع الأنسجة خارج الكمبيوم الوعائي كما يُؤَثِّرُ الشكل (45). ممَّ يتَّأْلَفُ القلف؟ كيف يتَّكَوُّنُ القلف؟ تخيِّلِ الشجرة عند إنتاج نسيج جديد من الخشب.



(45) شكل

يُوضَّحُ الشكلُ الطبقاتُ المختلَفةُ التيُّ أَنْتَجَهَا نسيجُ الكمبيومِ خَلَالَ مَرْحَلَةِ النَّمَوِ الثَّانِيِّ فِي شَجَرَةِ نَاضِجَةِ خَلَالِ سَنَوَاتِ عَدِيدَةِ. أَيْ طَبَقَةٍ تَحْتَوِيُ عَلَى خَلَيَا إِنْشَائِيَّة؟

سوف يزداد حجم الساق عرضاً. تذَكَّرُ أنَّ الكمبيوم الوعائي ينقسم باتجاهين منتجًا الخشب الثانوي نحو الداخل واللحاء الثانوي نحو الخارج. بتراتِكِ الأنسجة الخشبية، يتحرَّكُ الكمبيوم الوعائي باتجاه الخارج مؤدياً إلى ازدياد عرض الساق، ومحدِّثاً ضغطاً على الأنسجة الوعائية الأولى نحو الداخل والخارج بوجود هذا الضغط، وتناثر الأنسجة الموجدة نحو الخارج مثل اللحاء الأولى الذي يتشقّق ويتفتت، بالإضافة إلى الأنسجة الأخرى كالقشرة والنسيج الجلدي. وممكِّن أنْ يُؤَدِّي ذلك إلى فقدان الشجرة لكميَّات من الماء والغذاء. ولكن لا يحدث هذا في وجود الكمبيوم الفليني، كيف؟ يُغَلِّفُ الكمبيوم الفليني القشرة ويُنْتَجُ طبقة سميكة من الفلين. يتَّأْلَفُ الفلين من خلايا ذات جدر سميكَة تَحْتَويُ على الدهون والريبوت والشمع. هذه المَوَادُ غير النافذة للماء تُسَاعِدُ على منع فقدان الماء من الساق. في معظم الأحيان، تكون خلايا الفلين الخارجيه ميتة، ومع ازدياد حجم الساق في العرض، يتمزَّق الفلين القديم ويُنَزَّعُ على شكل شرائط أو رقَّع.

## مراجعة الدرس 4-1

1. أين تنشأ الخلايا والأنسجة الجديدة في النباتات؟

2. صِفْ نمطين شائعين من نمو النباتات . ما نوع النباتات التي يظهر فيها كلّ نمط من أنماط النمو؟

3. قارن بين الأنسجة الانشائية والأنسجة الأخرى من النباتات .

4. سؤال للتفكير الناقد: هل تتوقع أنّ معظم النباتات أحادية الفلقة تُنتج الفلّين؟ فسّر إجابتكم .

5. أضف إلى معلوماتك: كيف يُمكّن الانقسام الميتوzioni النباتات النامية من الحفاظ على الرسالة الوراثية المدّونة في معظم خلاياها؟

### فقرة اثرائية

#### علم الأحياء في حياتنا اليومية

ثابت مثل الأرجوحة الشبكية

قد لا تحتاج أبداً إلى تحريك

أرجوحتك الشبكية إلى أسفل

كلّما نمت الأشجار المعلقة فيها.

فالأشجار تنمو في الطول عند

أطراف فروعها أو قممها ، لذلك

فالأرجوحة المثبتة بشجرتين تبقى

عند الارتفاع نفسه تقريباً طيلة فترة

حياة الشجرتين .

# التكاثر والاستجابة في النباتات

## Response and Reproduction in Plants

### دروس الفصل

#### الدرس الأول

- \* التكاثر الجنسي في النباتات (1)

#### الدرس الثاني

- \* التكاثر الجنسي في النباتات (2)

#### الدرس الثالث

- \* التكاثر اللاجنسي في النباتات

تُزَهَّر نباتات أجراس الثلج في هواء جبال الألب الشاهقة الارتفاع أسفل القمم المكسوّة بالثلج، وشمالاً في وسط آلاسكا. في بداية فصل الصيف، تنبت أعشاب من خلال ثلج الصيف المبكر تُشَبِّه الصوف الثلجي في أرض دائمة التجمّد. كيف تبقى هذه النباتات حيّة في المناطق القطبيّة التي غالباً ما تكون مظلّمة، وبوجود الرياح والبرد الشديدان؟

كيف تتكاثر بوجود هواء قليل الأكسجين وتحت درجات الحرارة المنخفضة في قمم الجبال؟ غالباً ما تكون الإجابات عن هذه الأسئلة مذهلة. فبعض النباتات تفرز الكحول الذي يعمل كمادة مانعة للتجمّد، ولأزهار نباتات أخرى بتلات لها قدرة عالية على عكس الضوء، فهي تَتَّخِذ شكل الكُؤُوس لاقتناص أشعة الشمس، لذلك قد ترتفع درجة حرارتها  $10^{\circ}\text{C}$  عن الهواء المحيط بها. الطقس البارد الذي تعيش فيه هذه النباتات البذرية يُعطِي معدّلات تكاثرها، فتستغرق عامين أو ثلاثة لتنجِّز ما تُنْجِزه النباتات التي تعيش في الطقس الدافئ في موسم نموّ واحد. فبراعمها التي تتكون في فصل الصيف تبقى راقدة طوال موسم الشتاء الطويل، وتُزَهَّر مع الأيام الدافئة الأولى لفصل النموّ التالي. وتتكاثر نباتات قطبيّة عديدة في التربة عن طريق إنتاج الريزومات أو السوق الجارية لتنمو نباتات جديدة.

خلال البرد، تحفظ بعض النباتات بالحرارة والطاقة لكي تمنع سوائلها الداخلية من التجمّد. أمّا في البرد القارس فتدخل هذه النباتات في فترة الكمون. ما الطرق الأخرى التي تستجيب بها النباتات لما يحيط بها عندما تنمو وتتكاثر؟



### الأهداف العامة

- \* يشرح ظاهرة تعاقب الأجيال في النباتات.
- \* يصف عملية تكاثر النباتات اللافدرية والنباتات البدوية.



(شكل 46)

إذا تجولت يوماً في الغابة في أواخر فصل الصيف ، قد تسمع أصوات فرقعة خفيفة. إنها بذور شجرة البندق الساحرة الموضحة في الشكل (46) تُقذف بقوّة نتيجة تقلص القرون التي تحويها. قد تصل تلك البذور إلى مسافة تتجاوز 14 متراً، فهي عبارة عن منتجات التكاثر الجنسي في النباتات البدوية.

### Sexual Reproduction

### 1. التكاثر الجنسي

تمرّ معظم النباتات بطور من التكاثر الجنسي في مرحلة من مراحل دورة حياتها. لذلك ، فإنّ إمكانية إنتاج نباتات متنوعة وراثيًّا ، لا بدّ أن تكون ذات فائدة كبيرة للأنواع المختلفة منها.

فالتنوع الوراثي في الكائنات الحية يعزّز مقدرتها على مقاومة الأمراض ، والاقتراس ، والتأقلم مع التغييرات التي تحدث في البيئة التي تعيش فيها. يسمح ذلك للنباتات بالاستمرار في الحياة والانتشار على شكل نباتات جديدة وهجينة ذات صفات وراثية مختلفة إلى حدّ ما عن النباتات الأم. ويُوضّح الشكل (47) وردة هجينة.

وعلى الرغم من أنّ الأزهار تُعتبر أكثر التراكيب التكاثرية شيوعاً ، إلاّ أنّ هناك نباتات لا تُنتج أزهاراً. فالحجازيات والسرخسيات والنباتات المخروطية مثلاً تتكاثر من دون أن تُكّون أزهاراً ، فلهذه النباتات تراكيب متخصّصة لإيواء البويضات والأمساج الذكورية.



(شكل 47)

أنتجت هذه الوردة الهجينة بانفصال حبة لقاح من نوع من الورد إلى نوع آخر. ويستخدم مربوّن النباتات هذا النوع من التكاثر الجنسي لإنتاج زهور ذات رواج وألوان وأشكال جديدة.


وتعبر عملية التكاثر الجنسي في النباتات أكثر تعقيداً منها في معظم الحيوانات ، لأنّ دورة حياتها تستلزم حدوث طورين مختلفين . وبسبب اختلاف هذين الطورين ، فإنّ دورة حياة النباتات تتميّز بظاهره تعاقب الأجيال .

## Alternation of Generations

## 2. تعاقب الأجيال

تمرّ جميع النباتات أثناء دورة حياتها بظاهرة تسمى تعاقب الأجيال Alternation of Generations ، والتي تتحول خلالها النباتات من أجيال ثنائية المجموعة الكروموسومية (2n) إلى أجيال أحادية المجموعة الكروموسومية (1n) . وتتضمن هذه الظاهرة طورين مهمين هما: الطور المشيحي والطور الجرثومي أو البوغي . وقد أُعطي هذان الطوران هذين الإسمين نسبة إلى ما يُنتجه كلّ منهما: الأمشاج ، والجراثيم أو الأبواغ على التوالي . خلال الطور المشيحي Gametophyte ، تكون النباتات مكونة من خلايا أحادية المجموعة الكروموسومية (n) ، وتنتج الأمشاج التي تتحدّث أثناء عملية الإخصاب لتكوين الزيجوت (اللاقحة) . أمّا خلال الطور الجرثومي (البوغي) Sporophyte ف تكون النباتات مكونة من خلايا ثنائية المجموعة الكروموسومية (2n) . ويتم خلاله انقسام خلايا معينة ميوزيًّا لإنتاج الجراثيم (الأبواغ) ، وهي تراكيب تكاثرية أحادية المجموعة الكروموسومية (n) . وتستمرّ دورة حياة النباتات بانقسام الجراثيم أو الأبواغ ميتوzioniًّا لإنتاج النباتات المشيحية . لاحظ موضع النباتات المشيحية في دورة حياة النباتات الموضحة في الشكل (48) . قد تُصبح النباتات المشيحية نباتات مستقلّة كما يحدث في الحزازيات والسرخسيات ، أو مجموعة من الخلايا تعتمد كليًّا على خلايا النباتات الجرثومية كما يحدث في النباتات المخروطية والزهرية .

(شكل 48)  
يُمثّل هذا الشكل ظاهرة تعاقب الأجيال في النباتات . كيف تُتشّع الأمشاج ؟



وتختلف دورة حياة النباتات عن دورة حياة الحيوانات في أمرين: الأول هو أنّ الخلايا الجسمية للحيوانات هي ثنائية المجموعة الكروموسومية (2n)، أمّا خلال دورة حياة الأنواع المختلفة من النباتات، قد يكون الطور الجرثومي أو الطور المشيحي هو السائد. وفي معظم الأنواع الباتية، يكون الطور الجرثومي هو السائد، أمّا في الحزازيات فالطور المشيحي هو السائد. والثاني هو أنّ الانقسام الميوزي لدى الحيوانات يؤدّي إلى تكوين الأمشاج مباشرة. أمّا في النباتات، فيؤدّي إلى تكوين الجراثيم. ويُمكّن للجراثيم أن تُصبح نباتات مستقلّة منتجة للأمشاج كما يحدث في السراخس والحزازيات.

وفي نباتات أخرى مثل النباتات المخروطية والزهرية، تنمو الجراثيم إلى تراكيب منتجة للأمشاج، ولا تستقلّ بل تبقى معتمدة على الطور الجرثومي. وكما في الحيوانات، يحدث الإخصاب باتحاد السباحات الذكرية والبويضة، فينتج زيجوت جديد ثنائي المجموعة الكروموسومية (2n). لكن في بعض النباتات مثل الحزازيات والسرخسيات، يحدث الإخصاب في الماء. أمّا في النباتات المخروطية والزهرية، فيتم الإخصاب من دون الحاجة إلى توفر الماء.


### 3. دورة حياة النباتات اللابذرية

#### Life Cycle of Seedless Plants


خلال دورة حياة الفيوناريا، وهي من الحزازيات، يكون الطور السائد هو الطور المشيحي (الشكل 50). تنمو النباتات المشيحية (n) من جراثيم (n) في محيط بيئي مناسب وتعيش مستقلّة معتمدة على نفسها في الغذاء لاحتواء خلاياها على البلاستيدات الخضراء ويتصل الماء والمعادن بواسطة الجذور. أثناء هذا الطور، يؤدّي الانقسام الميوزي في الأنثريدة (التركيب الذكري) إلى إنتاج السباحات الذكرية ذات الأسواط، كما يؤدّي إلى إنتاج البويضات في الأرشيجونة (التركيب الأنثوي) (الشكل 49).

(شكل 49)

نبة الفيوناريا والتراكيب التكاثرية:  
الأرشيجونة (التركيب الأنثوي)  
والأنثريدة (التركيب الذكري)



الأنثريدة



الأرشيجونة



الفيوناريا

3. في الظروف البيئية المناسبة ، تبت الجراثيم (أبواغ) وتنمو إلى نبتة مشيجية. تنمو التراكيب التكاثرية إلى نبتة مشيجية.

جراثيم (أبواغ)  
(n)  
انقسامات ميوزية

ثُبُج الانقسامات الميوزية داخل المحافظة البوغية أبواغاً أحادية المجموعة الكروموسومية

محفظة جرثومية (بوغية)

نبتة مشيجية  
(2n)  
نبتة جرثومية  
(2n)

طور ثنائي المجموعة الكروموسومية  
طور أحادي المجموعة الكروموسومية

(شكل 50)  
دورة حياة الحزازيات

نبتة مشيجية ذكرية  
الأنثريدة

الأنثريدة

الأرشيجونة

أمشاج ذكرية

البوسطة

الإخضاب

بوسطة مخصبة


1. خلال الإخصاب تتحدد الأمشاج الذكرية مع البوسطة داخل الأرشيجونة وتنتج زيجوتاً ثنائية المجموعة الكروموسومية (2n). وينمو الريجوت إلى نبتة جرثومية .

4. تُنتج الانثريدة أمشاجاً ذكرية وتنتج الأرشيجونة البوسط بالانقسام الميوزي. تنسج الأمشاج الذكرية في مياه الأمطار لتصل إلى البوسطة داخل الأرشيجونة .

في فترة الخصوبة ، تنفصل الأمشاج الذكرية عن الأنثريدة وتنسج باتجاه الأرشيجونة لتنحصّب البوسطة عند قاعدتها ، فتنتج بوسطة مخصبة (زيجوت) ثنائية المجموعة الكروموسومية (2n). بعد ذلك يقوم الريجوت بعدة انقسامات ميوزية ينتج عنها جنين ثنائي المجموعة الكروموسومية (2n) داخل الأرشيجونة. ينمو الجنين على النبتة المشيجية ويعتمد عليها في الغذاء ليصبح نبتة جرثومية (2n).

تشابه دورة حياة الخنشار ، وهو من السرخسيات ، مع دورة حياة الحزازيات ، مع اختلاف بأنّ الأنثريدة والأرشيجونة تتكونان عند السطح السفلي للنباتات المشيجية. وعند توفر الماء ، تنسج الأمشاج الذكرية التي تُطلقها الأنثريدة باتجاه الأرشيجونة ، فتشهد إحداها مع بوسطة داخلها ، ما يُؤدي إلى إنتاج بوسطة مخصبة ثنائية المجموعة الكروموسومية. وتعتبر البوسطة المخصبة الخلية الأولى لنباتات جرثومية (بوغية) (الشكل 51).

خلال الطور الجرثومي (بوغي) ، تتكون المحافظة البوغية على شكل برات في الجهة السفلية لأوراق نباتات الخنشار. تقوم الخلايا في المحافظة الجرثومية (بوغية) بالانقسام الميوزي ، فتنتج أبواغاً جديدة أحادية المجموعة الكروموسومية. وعندما تنفجر المحافظة الجرثومية (بوغية) ، ينقل الهواء الجراثيم (أبواغ) الناضجة ، وينشرها في مساحات واسعة من الأرض حيث تنمو لتكون نباتات مشيجية جديدة أحادية المجموعة الكروموسومية .



- طور ثانوي المجموعة الكروموسومية
- طور أحادي المجموعة الكروموسومية

(شكل 51)  
دورة حياة السرخسيات

## Reproduction by Seeds

## 4. التكاثر بالبذور

أنواع كثيرة من النباتات تُنتَج البذور أثناء التكاثر الجنسي . والبذرة عبارة عن تركيب يحتوي على جنين نباتي ثانوي المجموعة الكروموسومية ، ويُخزن الغذاء في شكل نشا بصورة أساسية . ولمعظم البذور غلاف واقٍ قويٍ . ويمكن أن تنتقل البذور بعيداً عن النباتات الأم بواسطة الرياح أو الماء أو الحيوانات ، تماماً كما تنتقل الجراثيم (الأبواغ) . ويسمح ذلك للنباتات البدوية بالانتشار إلى مساحات واسعة من الأرض .

توجد مجموعتان من النباتات التي يمكنها إنتاج البذور . المجموعة الأولى هي النباتات عاريات البذور ، وسمّاها العلماء كذلك لأنّ بذورها غير مغلّفة بشمرة ، مثل النباتات المخروطية التي تتوارد بذورها داخل المخاريط . والمجموعة الثانية هي النباتات مغطّاة البذور والتي تكون بذورها مغلّفة بالثمار ، مثل بذور النباتات الزهرية . وتتضمن هذه المجموعة نباتات أحادية الفلقة Monocots أو ثنائية الفلقة Dicots ، وفقاً لعدد الفلقات الموجودة داخل البذرة .


يظهر الشكل (54) دورة حياة الصنوبر ، وهو نوع من أنواع النباتات المخروطية . تحمل شجرة الصنوبر نوعين من المخاريط ، الذكرية والأنثوية ، منفصلة بعضها عن بعض (شكل 52) . خلال فصل الربيع ، تقوم خلايا معينة ثنائية المجموعة الكروموسومية من المخاريط الذكرية بإنتاج جراثيم ذكرية دقيقة Microspores أحادية المجموعة الكروموسومية بواسطة الانقسام الميوزي . وفي الوقت نفسه ، تقوم المخاريط الأنثوية بإنتاج جراثيم أنثوية ضخمة Macrospores .



## مخاريط ذكرية



## مخر و ط انشو ی




## موقع المخاريط الذكرية والأنوثية على الشجرة

(52) شکل

المخاريط الأنثوية والذكرية وموقع كلّ منها  
على الشجرة.

(53) شکا


مقطوعان طوليان لمخروطين أحدهما مذكّر  
والآخر مؤنث.



(أ) مقطع طولي لمخروط مؤنث يوضح موقع البويضات


٤. تُتَجَّعَ الْانْقَسَامَاتِ الْمِيَوِيَّةِ خَلَيْأً أَحَادِيَّةً  
الْمَجْمُوعَةِ الْكَرْمُوْسِمَيَّةِ دَاخِلِ الْمَخَارِبِ  
الْذَّكَرِيَّةِ. تَنْمُو هَذِهِ الْخَلَيَا لِتُصْبِحَ نَبَاتَاتَ  
مَشْيَجَيَّةً ذَكَرِيَّةً تُتَجَّعَ جِبَوبُ الْلَّاقَحِ.

3. تُنتَج الانقسامات  
الميوزية خلايا أحادية  
المجموعة الكروموسومية  
داخل المخاريط الأثرية.  
تنمو هذه الخلايا لتصبح  
نباتات مشيجية أثرية تُنتَج  
البيض.



(54) شکا

دورة حياة الصنف



(شكل 55)

مقطع طولي لبذرة الصنوبر توضح تركيب البذرة

على عكس الحزازيات والسرخسيات، لا تكون الجراثيم نباتات مشيجية، بل تنتج مباشرة حبوب اللقاح Pollen أو بويضات Eggs (شكل 53). يتم التلقيح في الصنوبر حين تطلق المخاريط الذكرية أعداداً كبيرة من حبوب اللقاح التي تنتقل في الهواء. ولا يمكن إلا عدد قليل منها من الاقتراف على المخاريط الأنثوية، ليصل بعدها إلى البيض فيخصبه. فتنتج عن ذلك بيضة مخصبة ثنائية المجموعة الكروموسومية. تبدأ اللاقحة (البيضة المخصبة) سلسلة انقسامات ميتوزية حتى يتكون جنين صغير عبارة عن سويقة تحت فلقية، في أحد طرفيها جذير وفي الآخر ريشة محاطة بعدد كبير من الأغلفة (شكل 55).

ويظلّ الجزء المتبقّي من النباتات المشيجية الأنثوية محاطاً بالجنين ليكون الأندوسبريم. وفي الوقت نفسه، يتصلب الغلاف البيضي مكوناً غلاف البذرة الذي يتصلق به جناح رقيق يُساعد على انتشارها بواسطة الرياح. يمرّ وقت طويل بين التلقيح وتكون البذرة في المخروطيات، يتجاوز السنة أحياناً. وتنساقط خلال هذا الوقت المخاريط الذكرية في حين تبقى المخاريط الأنثوية معلقة على الأشجار. عند إنبات البذرة، يخرج منها جذير يخترق التربة، وتنستطيع السويقة وتبدأ بالظهور فوق سطح التربة. ثم تتحول البادرة تدريجياً إلى شجرة غير محدودة النمو.

وتحمّل دوره حياة المخروطيات، على عكس الحزازيات والسرخسيات، بأنّ الإخصاب لا يحتاج إلى الماء، لذلك لا تحتاج المخروطيات لبيئة رطبة أو مائية لتكاثر. كذلك يتواجد الجنين داخل البذرة التي تحميها الحراشف السميكة للمخاريط.

## مراجعة الدرس 2-1


1. صِف ظاهرة تعاقب الأجيال في النباتات .
2. ما الطور السائد في كلّ من الحزازيات ، السرخسيات والمخروطيات؟
3. ما هي التراكيب التكاثرية في المخروطيات؟
4. سؤال للتفكير الناقد: خلال أيّ مرحلة من دورة حياة النباتات تحدث الارتباطات الجنينية؟ وأيّ من النبتتين هو أول من يرث مثل تلك التغييرات: النبتة المشيجية أو النبتة الجرثومية (البوغية)؟
5. أضف إلى معلوماتك: قارِن عملية الانقسام الميوزي بالنسبة إلى إنتاج الأمشاج النباتية والحيوانية .

## التكاثر الجنسي في النباتات (2)

### Sexual Reproduction in Plants (2)

#### الأهداف العامة

- \* يحدد التراكيب الذكرية والأنثوية والعقيمة للزهرة.
- \* يشرح عملية الإخصاب في النباتات الزهرية.
- \* يفسّر عملية إنبات البذور.



(شكل 56)

يحدث التلقيح في نباتات كرفنس الماء الموضح في الشكل (56)، عندما تصادف الزهرة الذكورية الطافية على سطح الماء منخفضاً مائياً تصنعه الزهرة الأنثوية التي تثبت نفسها بساقي مغمورة داخل الماء، فتنزلق الزهرة الذكورية في هذا المنخفض لتصطدم بالزهرة الأنثوية. في هذه العملية، تُغَيِّر الزهرة الأنثوية بحثوب اللقاح التي تقوم بتلقيح البيوض. وعلى الرغم من أنّ الأزهار تُلْقَح بطرق متنوعة، إلا أنها تحتوي كلّها على التراكيب نفسها التي تسمح بحدوث عملية التكاثر.

#### 1. خصائص الأزهار Characteristics of Flowers

كم قد يedo العالم من حولنا مظلماً من دون الأزهار والورود والتوليب والأوركيد! لكنّ أهمية الأزهار لا تقتصر على الصورة الجميلة التي يراها بها الإنسان أو على رائحتها الزكية التي يشمّها، بل في الوظيفة التي تؤديها. فالزهرة هي العضو التكاثري في النباتات الزهرية أو النباتات مغطّاة البذور. الأزهار Flowers عبارة عن سوق متحوّرة لها أوراق وتراتيب أخرى متخصّصة من أجل عملية التكاثر. ولمعظم الأزهار ثلاثة أنواع من التراكيب: ذكورية، أنثوية وعقيمة.

وُطلقَتْ تسمية الزهرة الكاملة Complete Flower على تلك التي تحتوي على التراكيب الأنثوية والذكورية معاً، مثل أزهار المتنور والممشمش والفول.

وتُوصف بالزهرة الماقضة Incomplete Flower تلك التي تحتوي على إحدى التراكيب الأنثوية أو الذكورية فقط، مثل زهرة التين والتوت والنخيل. أما التراكيب العقيمة فوظيفتها حماية الأزهار والأجنة النامية، وجذب الحشرات من أجل إتمام عملية التلقيح.

## 1.1 التراكيب العقيمة للزهرة


### Sterile Parts of the Flower

الكأس، وهي تشكّل المحيط الخارجي للزهرة الذي يحضن التراكيب الأخرى ويحميها من العوامل الخارجية. وعادة ما تكون أوراق الكأس أو السبلات Sepals خضراء اللون، لكنّ عددها قد يختلف من زهرة إلى أخرى. التوبيخ، وهو يتكون من أوراق (البлатات) قد يختلف لونها من زهرة إلى أخرى، ولها رائحة مختلفة تُساهم في جذب الحشرات التي تؤدي دوراً مهماً في عملية التلقيح. ومثل السبلات، قد يختلف عدد الأوراق الملونة أو البلات Petals من زهرة إلى أخرى، لكنّه ثابت في أزهار النوع الواحد.

## 2.1 التراكيب التكاثرية للزهرة

### Male and Female Parts of the Flower

الأسدية Stamens، وتُعرَف أيضًا بالطلع، هي التراكيب الذكورية في الزهرة، وقد يختلف عددها من نوع إلى آخر في النباتات. تتكون كل سدادة من جزءين: المتك Anther والخيط Filament، كما يُوضّح الشكل (57). والخيط يحمل المتك الذي يقوم بإنتاج حبوب اللقاح Pollen التي تحتوي على الأمشاج الذكورية.




يتكون المتاع Pistil الذي غالباً ما يشغل مركز الزهرة، عادة من ثلاثة أجزاء: الميسم Style، والقلم Stigma، والمبيض Ovary، كما يوضح الشكل (57).

لكل جزء من المتاع وظيفة خاصة، فالميسم هو التركيب الذي تحظى عليه حبوب اللقاح وتثبت، لذلك غالباً ما يكون لرجاً ودبقاً لثبتت عليه حبوب اللقاح. ويصل القلم بين المبيض والميسم، أما المبيض فيحتوي على بويضة واحدة أو أكثر وفقاً لنوع النباتات.

## Production of Gamete

## 2. تكوُّن الأمشاج

كما في معظم النباتات، تتعاقب الأجيال في النباتات الزهرية، لكنَّ الطور المشيجي يقتصر على تكوين الأمشاج ولا يُنتج نباتات مستقلة كما يحدث في الحزازيات والسرخسيات. يبدأ النشاط الجنسي للنباتات الزهرية في المتك حيث أنَّ ثمة خلايا معينة، ثنائية المجموعة الكروموسومية، تبدأ بالانقسام الميوزي، لتنتج كلَّ منها أربع خلايا أحادية المجموعة الكروموسومية تُسمى الجراثيم (الأيواغ) دقية القيمة Microspores، والتي ما تلبث أن تنتج بواسطة الانقسام الميوزي حبوب اللقاح التي يُشكّل مجموعها نباتات مشيجية ذكرية. وتحتوي كلَّ واحدة من حبوب اللقاح على نواتين: نواة أنبوية Tube Nucleus ونواة تواليدية Nucleus of the tube. يوضح الشكل (58) تكوُّن حبوب اللقاح في المتك.




شكل (58)

تُنتج حبوب اللقاح بواسطة الانقسام الميوزي داخل أكياس حبوب اللقاح في المتك.

في الوقت نفسه، تبدأ بعض خلايا البويضة Ovule ثنائية المجموعة الكروموسومية بالانقسام الميوزي، لتنتج كلَّ منها أربع خلايا أحادية المجموعة الكروموسومية، تزول منها ثلاثة لتبقى واحدة فقط تُسمى الجرثومة (البوغ) الأشورية الضخمة Megasporangium. ثم تُعرض نواة هذا البوغ إلى ثلاثة انقسامات ميوزية متتالية، لتنتج 8 أنوية أحادية المجموعة الكروموسومية مرتَّبة في مجموعات.

تتمركز ثلاثة أنوية في أسفل البوبيضة (الخلية البيضية Egg Cell ونويتان آخرتان مساعدتان تتفتّتان بعد الإخصاب) وثلاث أنوية في أعلىها وتُسمى الأنوية المقابلة للأقطاب التي تتفتّت أيضًا بعد الإخصاب ، ونواتان في منتصفها تُسمى نواتانقطبيتين ، كما يوضّح الشكل (59). تُشكّل الأنوية الثمانية مع السيتوبلازم المحيط بها الطور المشيجي في الباتات. ثالث فقط من هذه الأنوية تؤدي دورًا مهمًا في عملية التكاثر الجنسي: نواتانقطبيتان والخلية البيضية التي تأخذ مكانها بالقرب من فتحة النمير Micropyle. أمّا الأنوية الخمس المتبقية فتحتّفي مع حدوث الإخصاب.



(شكل 59)

بعد انقسام ميوزي واحد وعدة انقسامات ميتوزيّة ، تتكوّن بيضة ونواتانقطبيتان داخل البوبيضة. أمّا الخلاياً أحدادية المجموعة الكروموسومية الأخرى الناتجة عن تلك العملية ، فنمورت.



(شكل 60)

بعض الخنافس تُساعد في تلقيح الأزهار كلّما تقلّلت من زهرة إلى أخرى باختصار عن حبوب اللقاح لستغذى.

### 3. التلقيح والإخصاب

عندما ينضج المتك ينفجر غلافه ، فتتساشر حبوب اللقاح وتنتقل إلى ميسّم الزهرة أثناء عملية التلقيح Pollination. ويكون التلقيح ذاتيًّا Self Pollination عندما


تنتقل حبوب اللقاح من متك زهرة إلى ميسّمها. أمّا التلقيح الخلطي Cross Pollination ، وهو الأكثر انتشارًا ، فتنتقل خلاله حبوب اللقاح من المتك إلى ميسّم زهرة أخرى من النوع نفسه. وتساعد عوامل عديدة ، مثل الهواء والحشرات (شكل 60) والماء ، على انتقال حبوب اللقاح وانتشارها.

بعد أن تلتصق حبوب اللقاح على ميسّم الزهرة اللزج والدبيق ، تنبت مكّونة أنبوبة تُسمى أنبوبة اللقاح. خلال نموّها ، تمتدّ هذه الأنبوبة عبر القلم إلى الميسيض حاملة معها النواتين: الأنبوية والتولدية. تُساعد النواة الأنبوية في نموّ أنبوبة اللقاح ، ثمّ تزول مع نهاية نموّه. أمّا النواة التولدية أحدادية المجموعة الكروموسومية (n) ، فتنقسم انقسامًا ميتوزيًّا في الأنبوية لتعطّي نواتين أحداديّي المجموعة الكروموسومية (n) ، تُصيّحان لاحقًا النواتين الذكريتين بعد أن يستطيل شكلاهما.

ويحدث الإخصاب Fertilization عندما تنتقل إحدى النواتين الذكريتين من أنبوبة اللقاح إلى البويضة عبر فتحة التقير، فتشهد مع الخلية البيضية لformation of the zygote أو البيضة المخصبة. في هذه الأثناء، تُخَصِّبُ النواة الذكرية الثانية Zygote النواتين القطبتيين، ونتيجة ذلك الإخصاب الثاني، يتكون نسيج تكون خلاياه ثلاثة المجموعة الكروموسومية (3n)، ويُعرف بنسيج سوياداء البذرة أو الأندوسبرم Endosperm.

يُخَرِّنُ هذا النسيج المواد الغذائية في البذرة، بينما يتحول جدار البويضة إلى غلاف البذرة. ولا تحدث عملية الإخصاب المزدوجة هذه إلا في النباتات مغطاة البذور (شكل 61).

يبدأ الطور الجرثومي (البويغي) للنباتات مع اكتمال عملية الإخصاب وتكوين الزيجوت الذي يتعرض لسلسلة من الانقسامات الميتوزية، فيتكون الجنين Embryo، وتصبح البويضة بذرة. في الوقت نفسه، تتحول الأجزاء الأخرى من المبيض والأنسجة المحيطة به إلى ثمرة Fruit تُغلف البذرة أو البذور المتكّنة.



(شكل 61)

عندما تحيط حبوب اللقاح على الميسن، تنمو أنبوبة لقاح وتمتد داخل القلم (إلى اليسار). عندما تصل الأنبوبة إلى البويضة، تُخَصِّبُ نواة ذكرية واحدة البيضة مكونة زيجوتاً، بينما تُتَحَدَّدُ نواة الذكرية الأخرى مع النواتين القطبتيين مكونة نواة الأندوسبرم.

#### 4. الإنبات

يساهم انتشار البذور لمسافات بعيدة عن النبتة الأم في انتشار النباتات على مساحات واسعة وفي بيئات مختلفة. بعض البذور خفيفة الوزن تُحمل بواسطة الرياح، وبعضها الآخر له خطافات تُثبتها بسهولة بأجسام الحيوانات التي تنقلها إلى أماكن بعيدة. كما يمكن للحيوانات أن تنقل البذور بطريقة أخرى، فعندما تأكل الشمار، تنتشر البذور غير القابلة للهضم بواسطة فضلاتها. وعندما تكون الظروف البيئية مناسبة لنمو البذور، تظهر منها أولى الأوراق وتنمو في عملية تُسمى الإنبات. يُوضّح الشكل (62) مراحل عملية الإنبات لبذرة ثنائية الفلقة.

خلال تلك العملية ، يستمدّ الجنين الطاقة من الغذاء المخزن في البذرة ، فينمو ممّقاً غلاف البذرة ويُكُون جذيرًا Radicle وسويقة جنينية أو تحت فلقية Hypocotyl ينموان مع نموّ البادرة النباتية .

يمتدّ الجذير في التربة وينمو إلى أسفل ، وتنمو السويقة إلى أعلى حاملة معها الفلقتين والريشة Plumule . وتكون تلك السويقة أول الأمر منحنية إلى أسفل ثمّ تستقيم وتنفرج الفلقتان ، فتتعرّض الريشة للضوء والهواء . تضمحلّ الفلقتان شيئاً فشيئاً ، ثمّ لا تلبثان أن تسقطا بعد أن يُستنفذ كلّ ما فيهما من غذاء مخزن . بعد ذلك تخضر الريشة وتكبر ، وتميّز فيها الساق والأوراق الخضراء ، فتحوّل تدريجيّاً إلى مجموع خضري ، كما يتفرّع الجذير ويستمرّ في النموّ تحت الأرض حتى يتحوّل إلى مجموع جذري . ويُسمّى هذا الإنبات بالإنبات الهوائي لأنّ الفلقتين تظهرا في الهواء فوق سطح التربة .

ويؤثّر في عملية الإنبات عدّة عوامل بيئية ، هي :

\* **مدى توفر الماء:** فخلال المرحلة الأولى من الإنبات ، يُنشّط الماء العديد من الإنزيمات بما فيها تلك التي تحول النشا إلى السكر الذي يعتبر المصدر الأساسي للطاقة لنموّ الجنين .

\* **درجة الحرارة:** تحتاج البذور إلى درجات حرارة معتدلة أو دافئة لكي تنبت . ولهذا السبب ، توجد وفرة كبيرة من النموّ النباتي أثناء فصل الربيع الذي يتميّز بالدفء ، ما يدفع العديد من البذور الكامنة لأن تنبت .



(شكل 62)  
الإنبات

\* مدى توفر الأكسجين: لا يحدث الإنبات في غياب هذا العنصر. ففي البذور النابضة، تحدث عملية التنفس بمعدل سريع وبخاصة في المراحل الأولى من الإنبات. ويتوقف معدل استهلاك الأكسجين على نوع الغذاء المخزن والذى ستتم أكسدته.

\* الضوء: يؤثر على إنبات بعض البذور ولا يؤثر على إنبات البعض الآخر. فبذور التبغ والخس والجزر مثلاً تحتاج إلى الضوء لكي تنبت. وعادة ما تكون هذه الأنواع من البذور صغيرة الحجم، تحتوي على القليل من المواد الغذائية المخزنة التي تكفي لإنبات البذرة لفترة زمنية قصيرة فقط لذا تنشر هذه البذور على وجه التراب.

لا يحتاج إنبات أنواع أخرى من البذور للضوء لأنّه يعيق إنباتها. فبذور الحمص والفاصوليا يجب إخفاؤها في التربة لكي لا تتعرض للإضاءة. وتكون هذه البذور عادة ذات أحجام كبيرة نسبياً، وتحتوي على كمية كبيرة من المواد المخزنة تكفي لإنبات البذور حتى لو زرعت في عمق التربة.

## مراجعة الدرس 2-2

1. حدد التراكيب الذكرية والأثنوية والعقيمة في الزهرة.
2. إشرح باختصار عملية الإخصاب في النباتات، موضحا دور كل من التراكيب الذكرية والأثنوية للزهرة في هذه العملية.
3. فسر عملية الإنبات.
4. سؤال للتفكير الناقد: هل تتوقع أن تكون حبوب لقاح الأزهار هوائية التلقيح لزجة؟ لم نعم ولم لا؟
5. أصف إلى معلوماتك: كيف تتواءم تكيفات النباتات بتكيفات الكائنات التي تساعد في إتمام عملية تلقيح الأزهار؟

## التكاثر اللاجنسي في النباتات Asexual Reproduction in Plants

### الأهداف العامة

- يصف طرق التكاثر الخضري الطبيعي.
- يشرح طرق التكاثر الخضري الاصطناعي.
- يُعدّ فوائد التكاثر الخضري الاصطناعي.
- يتعرّف الزراعة في الماء.
- يصف التكاثر الخضري (البكري) عند النباتات الزهرية.
- يُحدّد مفهوم زراعة الأنسجة عند النباتات.



(شكل 63)

عندما تقطع القمم النامية (أنسجة مرستيمية أو إنشائية) من نبات وتوضع في محلول مغذٍ وشروط بيئية مناسبة ، تنقسم الخلايا في النسيج الإنسائي وتشبّب نمو النسيج (شكل 63) . يلي ذلك أخذ قطع صغيرة من النسيج النامي وإعادة زراعتها في محاليل مغذية من جديد ، لتنمو كل قطعة منها وتصبح نبتة كاملة . بهذه الطريقة ، يكون العلماء قد استنسخوا نباتات عديدة من النبتة الأم بطريقة من طرق التكاثر اللاجنسي .



(شكل 64)

استنساخات نباتية طبيعية ، نباتات كل منها متطابقة وراثيًّا ، ونشأت من نبات أصلي (أبوي) واحد.

### Vegetative Reproduction

### 1. التكاثر الخضري

يتم التكاثر الجنسي في النباتات كما في معظم الكائنات الحية باتحاد نواة الأم شاج من فردين ، فتنتج عن هذا النوع من التكاثر تنوعات وراثية كثيرة . وعلى عكس ذلك ، لا تحدث في التكاثر اللاجنسي عملية إخصاب ، لذلك تنتج عنه أفراد جديدة مطابقة وراثيًّا للنبتة الأم . يُوضّح الشكل (64) نوعين من النباتات التي تتكاثر لا جنسياً .

وعلى الرغم من أنَّ الكثير من النباتات يتکاثر لاجنسياً في أوقات معينة خلال دورة حياتها، فإنَّ نباتات أخرى تستخدم هذه الطريقة من التکاثر في معظم دورة حياتها. وتشكل قدرة النباتات على التکاثر بالطريقتين الجنسية واللاجنسية فائدة كبيرة لها، ففي البيئة المستقرة والغنية بالموارد، يكون التکاثر اللاجنسى أسرع من التکاثر الجنسي، وينتج نباتات متكيِّفة للعيش في هذه البيئة.

وحين تغير الظروف البيئية، تستطيع هذه النباتات أن تتكاثر جنسياً فتنتج عنها نباتات تحمل صفات وراثية جديدة قد تزيد من فرصها للبقاء حية في تلك البيئة المتغيرة.

ويسمى التکاثر اللاجنسى الذي يحدث طبيعياً في النباتات بالتكاثر الخضري Vegetative Reproduction، ويمكن لتلك النباتات أن تُضاعف من أعدادها بسرعة كبيرة جدًا، حتى أنها قد تُزاحم النباتات الأخرى.


## 2. طرق التکاثر الخضري

### Ways of Vegetative Reproduction

يتم التکاثر الخضري عن طريق تركيب أو جزء من أجزاء النبات، كالساق أو الجذور أو الأوراق الخضراء. يمكنك أن تقارن بين العديد من تلك التراكيب الموضحة في الشكل (65).

(شكل 65)

الرئdas والدرنات والكورمات والوصلات عبارة عن تراكيب نباتية يمكنها إنتاج نباتات جديدة بالتكاثر اللاجنسى. كيف تختلف هذه التراكيب بعضها عن بعض؟



ومع تنوع التراكيب التي تسمح بالتكاثر الخضري في النباتات، تتنوع طرق هذا التکاثر الطبيعي. في ما يلي أنواع طرق التکاثر الخضري.

## 1.2 التکاثر بالرئد أو الترقيد Reproduction by Stolon

هو عملية طمر ساق النبتة في التربة عند ملامسته لها. تحمل الساق الجاربة براعم كثيرة ينمو كل منها إلى نبتة جديدة. ويمكن للنبتة الجديدة أن تُصبح مستقلة أو أن تبقى متصلة بالنبتة الأم.

وهذا ما يحدث في نبتة الفراولة ونباتات ياسنت الماء، وهي نباتات مائية تتکاثر خضریاً بالرئد، و تستطيع أن تسدّ مجرى الأنهار والقنوات . فعشر نباتات منها تستطيع أن تتکاثر و تُنتج أكثر من 600000 نبتة في العام الواحد.

## 2.2 التکاثر بالریزومات **Reproduction by Rhizomes**

تمتدّ من النبتة ساق تكون في معظم الأحيان أفقية تحت سطح التربة ، تمتدّ من براعمها جذور في الأرض ، فتنمو نباتات جديدة (شكل 66 – أ) ، مثل ما يحدث في نباتات الخيزران والزنجبيل .

## 3.2 التکاثر بالإبصال والكورمات **Reproduction by Corms and Bulbs**


### بعض النباتات سوق تمتدّ تحت التربة ، فتنمو وتحوّر لتخزن المواد الغذائية على شكل كورمات Corms . ومن أمثلة النباتات التي تتکاثر بالكورمات ، القلقاس والزعفران والجلاديolas . أما الأبصال ، Bulbs ، فهي أيضًا سوق تحت أرضية تحمل أوراقًا شحمية متحوّرة لتخزين المواد الغذائية (شكل 66 – ب) . ومن أمثلة النباتات التي تتکاثر بالإبصال ، البصل والسوسن والزنبق .

## 4.2 التکاثر بالدرنات **Reproduction by Tubers**

تکون بعض النباتات درنات Tubers ، وهي عبارة عن أجزاء أرضية متخفخة من النبتة وتحتوي على براعم. تتکاثر البطاطس مثلاً بواسطة درنات من ساقها ، وتنمو براعمها تحت التربة مستخدِمة النشا المخزن فيها (شكل 66 – ج) .



(شكل 66)  
طرق التکاثر الخضرى



(أ) التکاثر بالریزومات  
(ب) التکاثر بالإبصال  
(ج) التکاثر بالدرنات



### 3. التكاثر الخضري الاصطناعي

#### Artificial Propagation

إذا صادف أن أكلت يوماً العنب من دون بذور أو البرتقال أبو سرة ، فإنك بذلك تكون قد تذوقت منتجات للتكاثر الخضري الاصطناعي . ويحدث مثل هذا التكاثر عندما يستخدمه الناس لإنتاج نباتات جديدة . وتتضمن طرق التكاثر الاصطناعي التعقيل ، والتطعيم و زراعة الأنسجة .

#### Cutting

#### 1.3 التعقيل


تقتضي هذه الطريقة بأخذ قطعة من الساق أو الورقة ، أو برعم الورقة أو قطعة من الجذور ، ثم غرسها في تربة تُناسب نموها . الورود والعنب واللبلاب وتوت العليق والتفاح وقصب السكر نباتات يتم اكتثارها بهذه الطريقة .

#### Budding

#### 2.3 التطعيم

هي طريقة نقل قطعة من نبتة تحتوي على برعم واحد تُسمى الطعم ، ووضعها على ساق نبتة أخرى تُسمى الأصل . في الربيع أو الخريف ، يقوم المزارعون بتطعيم الكثير من أشجار الفاكهة والحمضيات مثل التفاح والليمون الهندي (الجريب فروت) .

ولنجاح عملية التطعيم ، لا بد من اختيار الطعم من شجرة خالية من الأمراض ، وأن يكون الطعم والأصل من فصيلة نباتية واحدة . ويجب تغطية مكان الطعم بقطن ليقى رطباً ولمنع دخول الجراثيم إلى الشجرة الأصل . ومن طرق التطعيم تلك الموضحة في الشكلين (67 - أ) و(67 - ب) ، وهي التطعيم بالبرعم والتطعيم بالقلم .



(شكل 67)  
أنواع من طرق التكاثر الاصطناعي

### 3.3 الرئد أو الترقيد

خلال هذه العملية، يعمد المزارعون إلى طمر أجزاء من سوق النباتات الممتدة فوق الأرض بينما لا تزال متصلة بالنبتة الأساسية، لتنمو نبتة جديدة. وهذا ما يحدث في نبتة الفراولة.

### 4.3 زراعة الأنسجة


تسمح هذه الطريقة بإنماء نبتة كاملة من خلايا مفردة أو قطع صغيرة من الأوراق أو الساق أو الجذور. وقد ابتكر هذه الطريقة عالم فسيولوجيا النبات الأميركي كي ستิوارد، عام 1958، حين تمكّن من إنباء نبتة جزر كاملة من قطع صغيرة من جذورها.

زراعة الأنسجة النباتية هي مجموعة من التقنيات المستخدمة للحفاظ على نمو خلايا النباتات وأنسجتها في وسط معقم ومغذٌ. وتعتمد زراعة الأنسجة النباتية على حقيقة أنَّ العديد من الخلايا النباتية لديها القدرة على تكوين نبتة كاملة Totipotency. تُؤدي هذه الزراعة دوراً أساسياً في إنتاج محاصيل على نطاق واسع أو تجاري. من أهم تطبيقات زراعة الأنسجة النباتية:

#### Meristem Culture

#### (أ) زراعة الميرستيم

تستخدم هذه الزراعة أصغر جزء من الساق الذي يحتوي على خلايا غير متمايزة. ويمكن لهذه الكتل الخلوية المعروفة بالكاللوس Callus أن تتطور إلى نبتة كاملة. تُستعمل هذه التقنية في تطوير الحمضيات والبطاطا الخالية من الفيروسات المسئولة للأمراض (الشكل 68).



(شكل 68)  
زراعة الأنسجة

### Protoplast Culture

### (ب) زراعة البروتوبلاست

هي خلايا نباتية أزيل جدارها الخلوي السيللوزي. يمكن أن تتطور هذه الخلايا إلى نباتات كاملة. وتقنية انصهار البروتوبلاست هي نوع من التعديل الوراثي حيث تضاف بعض المواد الهرمونية كالسيتو كينين إلى الوسط الغذائي لإنتاج نباتات هجينة.

## 4. فوائد التكاثر الخضري الاصطناعي

### Benefits of Artificial Propagation

إن الطرق المختلفة للتکاثر الالاجنسي ساعدت الإنسان في الحفاظ على أنواع كثيرة من النباتات، والتخلص من أنواع أخرى غير مرغوب فيها، واستبدالها بنباتات مرغوب فيها. وسمحت له أيضا بإكثار نباتات يصعب تكاثرها بالبذور، وإنتاج نباتات متشابهة في ما بينها ومشابهة للنبة الأم.

### Benefits of Cutting

### 1.4 فوائد التعقيل

(أ) يعتمد المزارعون التعقيل لسهولة الحصول على قطع من النباتات التي يريدون زراعتها.

(ب) يعطي التعقيل نتائج سريعة، إذ أن نمو النباتات في بعض أنواع نباتات الزينة، مثل الورود، يعطي نتيجة أسرع من النتيجة التي يعطيها زرع البذور.

### Benefits of Budding

### 2.4 فوائد التطعيم

(أ) يساعد التطعيم في إكثار أصناف نباتات معينة. بهذه الطريقة يمكن أن ينمو عدة أنواع من الفاكهة على جذع شجرة واحدة.

(ب) يساعد التطعيم أحياناً في التغلب على الأمراض التي تصيب النباتات.

### Benefits of Stolons

### 3.4 فوائد الرئد أو الترقييد

(أ) تتم عملية الترقييد بسهولة ولا تحتاج إلى عناية كبيرة كالتي يحتاجها التكاثر بالتعقيل.

(ب) يحتاج التكاثر بالترقييد إلى وقت قصير نسبياً إلى التكاثر بالتعقيل أو التطعيم.

(ج) عملية الترقييد مضمونة النجاح لأن الساق الجارية تبقى متصلة بالنبة الأم إلى أن يتم تكوين الجذور للنبة الجديدة.

### Benefits of Tissue Culture

### 4.4 فوائد زراعة الأنسجة

تُستخدم هذه التقنية اليوم لإكثار النباتات ذات الصفات الوراثية النادرة أو المرغوب فيها، مثل نباتات الأوركيد والبنفسج الإفريقي. كما يمكن استخدام هذه التقنية لإنتاج نباتات سليمة خالية من الأمراض الفيروسية.

## 5. التكاثر البكري في النباتات الزهرية

### Apomixis in Flowering Plants

في هذا النوع من التكاثر ، ينمو الجنين من بويضة **Ovule** غير مخصبة . هناك أنواع مختلفة من هذا التكاثر الذي يُسمى التكاثر البكري Apomixis عند النباتات الزهرية ، وأهمها:

**التكاثر البكري غير المترافق Non Recurrent Apomixis:** تخضع الخلية الأم أو الجرثومية الأنوثوية الضخمة **Megaspore** إلى انقسام ميوزي ، فيتكون كيس جنيني أحادي المجموعة الكروموسومية ، ويعطي بدوره نبتة كاملة لها نصف عدد الكروموسومات الموجودة عند النبتة الأم . ولا يمكن لهذه العملية أن تتكرر من جيل إلى آخر .

**التكاثر اللاجنسي الجرثومي Sporophytic Apomixis:** لا ت تكون الأجنحة من اتحاد الأمشاج بل من خلايا النوسيلة **Nucellus** أو بعض أغلفة البذرة **Integuments** . ويعتبر هذا النوع من التكاثر مهمًا في عدة أنواع من الحمضيات .

**التكاثر البكري المترافق Recurrent Apomixis:** هذا النوع هو الأكثر تعقيدًا ، لأن عدد الكروموسومات في الكيس الجنيني هو نفسه في النبتة الأم بسبب عدم اكتمال الانقسام الميوزي في الكيس الجنيني . لذلك ينمو الجنين من خلايا المنشأ أو من الخلايا الجرثومية الأم **Archesporial Cells** أو من أجزاء النوسيلة .

### Hydroponics

## 6. علم الزراعة في الماء



(شكل 69)  
الزراعة في الماء

هو نمط زراعي لإنتاج المحاصيل في الماء من دون استعمال التربة ، حيث يمكن تنمية النباتات بواسطة محليل غني بالمغذيات المعدنية أو في وسط خامل مثل البرليت ، الفيرموكيوليت أو الصوف المعدني .اكتشف العلماء أن النباتات تمتضي المعادن الأساسية في صورة أيونات لاعضوية ذاتية في مياه الري ، لذلك بإضافة المغذيات إلى المياه بطريقة صناعية ، لا ضرورة لوجود التربة . تُعتبر هذه الزراعة تقنية نموذجية في البحوث البيولوجية والتدريس (شكل 69) .

وتحمي هذه التقنية بعدة فوائد أهمها:

\* غياب الحاجة إلى التربة ، وبذلك يمكن الزراعة في أي مكان بغض النظر عن طبيعة التربة الموجودة فيه .

\* إنخفاض تكاليف الري إذ يمكن إعادة استخدام الماء .

\* تخفيف التلوث البيئي الناتج عن الأسمدة الكيميائية الزائدة عن حاجة النباتات .

\* سهولة الحصاد والحصول على أعلى إنتاجية ممكنة من النباتات .

\* التخلّص من الأمراض والأفات الموجودة في التربة مثل الفطريات والديدان ، والحشرات ، والأعشاب . أضف إلى ذلك إمكانية التقليل من استخدام المبيدات .

لكن الزراعة المائية لا تخلو من بعض السيئات :

\* يؤدّي أي فشل في نظام التقنية إلى الموت السريع للنباتات .

\* خطر هجوم الكائنات الممراضة على النباتات بسبب الرطوبة العالية .

\* تحتاج النباتات المائية إلى الكثير من الأسمدة المختلفة وأنظمة احتواء متنوّعة .

## مراجعة الدرس 3-2

1. فسر كيف يُفيد التكاثر اللاجنسي النباتات؟

2. أذكر ثلاثة تراكيب تستخدمها النباتات في التكاثر الخضري .

3. إشرح عملية التعقيل في نبتة الجيرانيوم .

4. أيهما يحتاج إلى وقت أقل لإظهار نباتات جديدة ، الترقيد أم التعقيل؟ فسر إجابتك .

5. ما هي الخاصية النباتية التي مكّنت العلماء من استبدال التربة بالماء كوسط زراعي لإنتاج المحاصيل؟

6. سؤال للتفكير الناقد: ما وجه الشبه بين التكاثر الخضري الاصطناعي والتكاثر الخضري الطبيعي؟ وما وجه الاختلاف بينهما؟

7. أضف إلى معلوماتك: ما الأحداث التي قد تُسبّب ظهور صفة وراثية جديدة في إحدى النباتات المُنَتجة بالاستساخ؟

# مراجعة الوحدة الأولى

## المفاهيم

Meristems	الأنسجة الإنسانية	Fertilization	الإخصاب
Active Transport Protein	بروتينات ناقلة نشطة	Seed	البذرة
Photosynthesis	البناء الضوئي	Chloroplasts	البلاستيدات الخضراء
Stolon	الترقيد	Alternation of Generations	تعاقب الأجيال
Cutting	التعقيل	Budding	التطعيم
Light Dependent Reactions	تفاعلات معتمدة على الضوء	Light Independent Reactions (Calvin cycle)	تفاعلات غير معتمدة على الضوء (دورة كالفن)
Vegetative Reproduction	التكاثر الخضري	Apomixis	التكاثر البكري
Pollination	التلقيح	Artificial Propagation	التكاثر الصناعي
Fruit	الشمرة	Stomata	الثغور
Fibrous Root	الجذر الليفي	Taproot	الجذر الوتدية
Root Burn	حرق الجذور	Grana	جرانا
Flower	الزهرة	Tissue Culture	زراعة الأنسجة
Incomplete Flower	الزهرة الناقصة	Complete Flower	الزهرة الكاملة
Stem	السوق	Stroma	ستروما
Turgor	ضغط الامتلاء	Transpiration Pull	الشد النتحي
Gametophyte	الطور المشيحي	Root Pressure	ضغط جذري
Veins	العروق	Sporophyte	الطور الجرثومي (البوغي)
Internode	عقلة	Node	عقدة
Petiole	عنق الورقة	Hydroponics	علم الزراعة في الماء
Chlorophyll	الكلوروفيل	Pressure-Flow Hypothesis	فرضية تدفق الضغط
Cork Cambium	كمبيوم فليني	Cambium	الكمبيوم

Apoplast	ممر خارج خلوي	Vascular Cambium	كمبيوم وعائي
Symplast	ممر خلوي جماعي	Cuticle	كيوتيلك
Spongy Mesophyll	النسيج الوسطي الإسفنجي	Transmembrane	ممر عبر غشائي
Pallisade Mesophyll	النسيج الوسطي العمادي	Mesophyll	النسيج الوسطي
Cohesion – Tension Theory	نظرية الشد المتماسك	Blade	النصل
Secondary Growth	النمو الثانوي	Primary Growth	النمو الأولي

## الأفكار الرئيسية للوحدة

### الفصل الأول: التغذية والنقل والنمو في النباتات

#### (1-1) تركيب النباتات

- \* التراكيب الأساسية للورقة النباتية هي النصل والعروق والعنق، وهي تُمكّن الورقة من العمل كعضو في عملية البناء الضوئي.
- \* يمكن تصنيف الأوراق المركبة إلى بسيطة أو مركبة. ويمكن تصنيف الأوراق المركبة إلى ريشية أو راحية.
- \* تحمل السوق الأوراق النباتية والأزهار، وتنقل الماء والمواد الغذائية إلى جميع أجزاء النباتات.
- \* إما أن يكون للنباتات جذر وتدى كبير واحد أو جذور ليفية صغيرة عديدة منتشرة، وهي تمتص الماء والعناصر المعدنية وتشتّت النباتات.
- \* تتكاثر النباتات الزهرية بواسطة البذور.

#### (1-2) التغذية في النباتات

- \* تتحوّل طاقة ضوء الشمس أثناء البناء الضوئي إلى طاقة كيميائية مُختَنَة في الغذاء.
- \* تتكون المرحلة الأولى من عملية البناء الضوئي من تفاعلات ضوئية تُستخدم فيها الطاقة الضوئية لشطر الماء إلى غاز الأكسجين، أيونات هيدروجين وإلكترونات عالية الطاقة. ويساعد تدفق الإلكترونات في توليد مركب الـ ATP.
- \* في المرحلة الثانية من البناء الضوئي، أي دورة كالفن (التفاعلات اللاضوئية)، يتحوّل ثاني أكسيد الكربون إلى جزيء ثلاثي ذرات الكربون يُستخدم في إنتاج الجلوکوز.
- \* تتبادل النباتات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون مع الهواء الجوي، وتفقد الماء من خلال ثقوب تُسمى التغور. وتتحكّم الخلايا الحارسة في حجم التغور.
- \* لكي تخزن النباتات الطاقة أو تنمو، لا بد أن تُتّبع كمية جلوکوز أكبر من تلك التي تحتاج إليها في عملية التنفس الخلوي.
- \* تفقد النباتات معظم الماء الذي تمتصه خلال عملية التبخر.

### ٣-١) النقل في النباتات

- \* يحفظ الماء في الفجوات الخلوية ضغط الامتلاء للخلايا النباتية.
- \* تمتص الجذور الماء من التربة بواسطة الأسموزية.
- \* تدخل بعض العناصر المعدنية الجذور بواسطة الانتشار، وبعضها الآخر بواسطة النقل النشط. ويحتاج جميع الجذور إلى الأكسجين لتُوفّر الطاقة لعملية النقل النشط.
- \* في النباتات الوعائية، ينقل نسيج الخشب الماء والأملاح المعدنية الذائبة، وينقل اللحاء العصارة المحتوية على السكريات الذائبة المنتجة خلال عملية البناء الضوئي.
- \* إنّ خلايا نسيج الخشب هي خلايا ميتة وجوفاء. عندما يتبخّر الماء خلال الأوراق أثناء عملية النتح، يتم تعويض هذا الماء من خلال سحب ماء إلى أعلى خلال الأنابيب الجوفاء بواسطة قوى التماسك.
- \* تستخدم خلايا اللحاء الحية الطاقة في النقل النشط للسكريات من خلايا المنبع إلى الأنابيب الغربالية، ومن الأنابيب الغربالية إلى خلايا المصرف.

### ٤-١) نمو النباتات

- \* يحدث النمو الأولي (أو الابتدائي) في الأنسجة الإنسانية (أو المرستيمية) القيمية، أي عند قمم السوق والفروع والجذور، وكذلك عند مواضع اتصال الأوراق بالسوق.
- \* يحدث في جميع النباتات نمو أولي. ويمكن للنباتات الخشبية أيضًا أن تنمو أكثر في العرض من خلال النمو الثانوي.
- \* الخشب عبارة عن طبقات من نسيج الخشب الثانوي. ويتكوّن القلف من طبقات الفلين والكمبيوم الفليني واللحاء.
- \* يُوفّر عرض طبقات نسيج الخشب الريعي والصيفي بيانات عن تغيّرات المناخ.

### الفصل الثاني: التكاثر والاستجابة في النباتات

#### ١-٢) التكاثر الجنسي في النباتات (١)

- \* يستلزم التكاثر الجنسي في النباتات حدوث تعاقب أجيال أحادية المجموعة الكروموسومية وأجيال ثنائية المجموعة الكروموسومية.
- \* الطور المشيحي هو الطور السائد في الحزازيات، والطور الجرثومي (البوغي) هو السائد في السرخسيات والنباتات المخروطية والزهرية.
- \* يُتّبع العديد من النباتات البدور أثناء التكاثر الجنسي.

## (2) التكاثر الجنسي في النباتات (2)

- \* لمعظم الأزهار تراكيب ذكرية وأنوثية وعقيمة.
- \* تتطلب عملية الإخصاب في النباتات غطاء البذور (النباتات الزهرية) حدوث عملية التلقيح ، ونمو أنبوبية القاح واتحاد البيضة مع نواة ذكرية .
- \* خلال عملية الإخصاب في النباتات غطاء البذور تكون البذور والثمرة .
- \* تحتاج عملية الإنابات إلى وجود عوامل ملائمة مثل الماء والأكسجين ودرجة حرارة معتدلة والضوء أحياناً.

## (3) التكاثر اللاجنسي في النباتات

- \* يُتيح التكاثر اللاجنسي نباتات مشابهة تماماً للنبتة الأم ومتكيّفة للعيش في بيئه مستقرّة .
- \* يمكن أن يحدث التكاثر الخضري في بعض النباتات بدءاً من بعض التراكيب مثل السوق الجارية والسوق الأرضية والدرنات والكورمات والبصلات .
- \* يستخدم المزارعون تقنيات التعقيل والتطعيم والرئد (الترقييد) لإنتاج كميات كبيرة من النباتات في وقت أقصر وكفالة أقلّ .
- \* تكمن أهمية زراعة الأنسجة النباتية في قدرة خلاياها على التجدد إلى نباتات كاملة . وُتُستخدم هذه التقنية لإنتاج نباتات ذات صفات وراثية نادرة أو نباتات خالية من الأمراض .

## خريطة مفاهيم الفصل الأول

استخدام المفاهيم الموضحة في الشكل لرسم خريطة تُنظم الأفكار الرئيسية التي جاءت في الفصل .



## خريطة مفاهيم الفصل الثاني

استخدم المفاهيم الموضحة في الشكل لرسم خريطة تُنظم الأفكار الرئيسية التي جاءت في الفصل.



## تحقق من فهمك

اختر العبارة الصحيحة من بين العبارات التي تلي كل سؤال مما يلي وذلك بوضع علامة (✓) أمامها:

1. تقوم العروق بنقل السوائل فيما بين الأوراق النباتية والسوق عبر:

- الجذور الوتدية  الأعناق  الأنصال  الجذور الليفية

2. التركيب التكاثري النباتي الذي يتكون من الجنين والغذاء الخاص به هو:

- البدنة  الحبة  المشيخ  الزهرة

3. الأوعية الأنبوية التي تنقل الماء والعناصر المعدنية والسكر خلال الأوراق النباتية هي:

- الجذور الوتدية  العروق  النباتات الوعائية  الأنصال

4. الأعضاء التكاثرية للنباتات الزهرية هي:

- الأزهار  المخاريط  الشمار  الأعناق

5. يعتبر نمو النبات من الرئد والدرنة مثلاً

- التكاثر الجنسي  التلقيح  التكاثر الخضري  الاستعمار

6. في النباتات الزهرية، التراكيب التي تحتوي الخلايا الذكرية هي

- الجراثيم  حبوب اللقاح  المبايض  الفلقات

7. تركيب النباتات الذي يتطور إلى الثمرة هو

- الفلقة  البدنة  الجرثومة  المبيض

ضُع علامة (✓) في المربع الواقع أمام العبارة الصحيحة، وعلامة (✗) في المربع الواقع أمام العبارة غير الصحيحة

في كل مما يلي:

1. القمح من النباتات أحادية الفلقة.

2. تسمى الأعضاء المذكورة في الحزازيات بالأرشيجونة.

3. تميّز النباتات الابذرية فقط بظاهره تعاقب الأجيال.

4. تقسم النباتات عارية البدور إلى نباتات أحادية الفلقة و نباتات ثنائية الفلقة.

5. النبتة المشيجية هو الطور السائد في النباتات البدذرية.

6. تنشأ التراكيب التكاثرية لنباتات عارية البدور في مخاريط ذكرية وأنثوية.

## أجب عن الأسئلة التالية بایجاري

1. ما أوجه اختلاف تعرّق الأوراق في النباتات أحادية الفلقة والنباتات ثنائية الفلقة؟ أرسم أمثلة تُوضّح تلك الاختلافات.

2. ما نوع نسيج الخشب؟ كيف يختلف عن اللحاء؟

3. ما فوائد كل من الجذور الوتدية والجذور الليفية للنباتات؟

4. ما التركيب التكاثري الموجود في كل من النباتات معّرّاة ومحاطة البدور وغير الموجود بالحزازيات والسرخسيات؟ ما الفائدة التي تعود على النبات من وجود مثل ذلك التركيب؟

5. ما أوجه التشابه والاختلاف بين طورِي دوره الحية في النبات؟
  6. فسر لماذا يُعتبر من الأفضل للنباتات أن يتكون 70 - 20% من حجم النسيج الوسطي في أوراقها من فراغات هوائية.
  7. ما المراحلتان الأساسيتان من عملية البناء الضوئي؟ في أي مرحلة منها يُستخدم الماء ويُنتَج الأكسجين؟ وأي مرحلة تُنتَج الجلو كوز؟
  8. كيف تتحكّم الخلايا الحارسة في تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون والماء خلال التغور؟
  9. ما المواد النباتية المسؤولة عن تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية؟
  10. صِف ما يحدث عندما يذبل نبات. ما أسباب الذبول؟
  11. فسر أهمية الطور المشيحي في السراغنس.
  12. أين تكمن أهمية انتفاقة الجذير أولاً في عملية إنبات البذور؟

## تحقیق من مهارات

1. التنظيم والتصنيف: تخيل أنك مشترك في لجنة للتنمية الاقتصادية في منطقتك. ابحث عن بعض الأعمال والصناعات ذات العلاقة بالنباتات التي قد ترغب اللجنة في أن تُحضرها إلى المنطقة لتعزيز النمو الاقتصادي. ضع في اعتبارك مناخ المنطقة ونوع التربة والموارد المتاحة عند قيامك بعمل توصياتك.

2. مهارة تفسير الأشكال البيانية: ينشر الكثير من منسقي الحدائق طبقة من المهاد (قطع صغيرة من قلف الأشجار، ورائق صغيرة من خشب الأشجار والقش ومواد عضوية أخرى) على التربة حول النباتات، ويُوضح الرسم البياني التالي أحد تأثيرات المهاد على التربة. صِف ذلك التأثير. ما الظروف التي قد أنتجهت التغييرات الموضحة في الشكل البياني؟

3. تطبيق المفاهيم: أحسب الزمن الذي يستغرقه الماء ليصل إلى قمة جذع شجرة من الصنوبر الأحمر طولها 105 أمتار. افترض أن الماء يتحرّك بأقصى معدل.

4. تصميم تجربة: خطط لإجراء تجربة لتحديد ما إذا كان معدل النتح يختلف بواسطة الرياح. ملحوظة: ضمن طريقة لقياس الماء الذي تمتصه كل نبتة.

الوقت (عدد الأيام)	الترة مع مهاد (تراتب)	الترة بدون مهاد (تراتب)
35	30	20
30	30	22
25	30	20
20	30	15
15	30	15
10	30	10
5	30	20

5. تصميم التجارب: ما العلاقة التي تتوقع وجودها بين طول فترة حياة النبات ومقدرتها على القيام بالنمو الثانوي؟ ما البيانات التي يمكنك أن تجمعها لاختبار فرضك؟ صُفْ تجربة تجمع هذه البيانات.

6. التنظيم والتصنيف: فكر في طرق التكاثر الخضري الاصطناعي الموصوفة في هذا الفصل. أي طريقة ستسخدمها لإنتاج شجرة تفاح تحمل نوعين مختلفين من ثمار التفاح؟

7. تحليل البيانات: افترض أن لديك حديقة ظليلة ذات تربة رطبة. وظف الجدول التالي لكي تعرّف النباتات القصيرة التي ستتفتح أزهارها في حديقتك في فصل الصيف. ما النبتة أو النباتات الأخرى التي يمكن أن تتفتح في حديقتك؟

التخطيط لزراعة الحديقة				
النبتة	فتره الإزهار	ارتفاع النبتة	الإضاءة	التربة
الأولى	أواخر الربيع	30 cm	ضوء ظليل	رطبة
الثانية	من منتصف الصيف إلى أواخره	20 – 30 cm	ضوء ظليل	رطبة
الثالثة	قبل منتصف الصيف	0.6 – 1.8 m	ضوء ظليل	جيّدة الصرف
الرابعة	أوائل الصيف إلى أواخر الخريف	60 cm	ضوء ساطع	جيّدة الصرف
الخامسة	أواخر الربيع إلى منتصف الصيف	30 – 45 cm	ضوء ساطع	جيّدة الصرف

8. تحليل البيانات: يُمثل الجدول التالي نتائج تجربة قام بها العلماء لدراسة دور الحشرات في عملية تلقيح النباتات المزهرة.

نباتات الحقول	نباتات المشتل			إنتاجية بذور الجزر (kg/40m <sup>2</sup> )
	بوجود النحل	بوجود حشرات صغيرة	في غياب الحشرات	
322	381	205	58	

ما الذي استنتجه العلماء من معطيات الجدول أعلاه؟

## المشاريع

### 1. علم الأحياء والمجتمع

كيف تتكاثر الأنواع السائدة من النباتات في الحي الذي تعيش فيه؟ إدعم تقريرك بالرسومات أو بالصور الفوتوغرافية.

### 2. علم الأحياء والفن

اصنع نموذجًا ثلاثي الأبعاد لواحدٍ مما يأتي: الطبقات في الورقة النباتية؛ تركيب جذر النبات؛ تركيب ساق نبات خشبية لها نمو ثانوي.

### 3. علم الأحياء وعلم الفيزياء

تعرّف التجارب التي قامت بها NASA لاستكشاف كيف تنمو النباتات في بيئة منعدمة الجاذبية. ما الغرض لهذه التجارب على المدى الطويل؟




# 11

تطرح سلسلة العلوم مضموناً تربوياً متواعاً يتناسب مع جميع مستويات التعلم لدى الطالب.

يوفر كتاب العلوم الكثير من فرص التعليم والتعلم العلمي والتجارب المعملية والأنشطة التي تعزز محتوى الكتاب. يتضمن هذا الكتاب أيضاً نماذج لاختبارات لتقدير استيعاب الطالب والتأكد من تحقيقهم للأهداف واعدادهم للاختبارات الدولية.

تتكون السلسلة من:

- كتاب الطالب
- كتاب المعلم
- كراسة النطبيقات
- كراسة النطبيقات مع الإجابات



قيم مناهجنا



الكتاب كاملاً



# الإحياء

## الصف الحادي عشر

الفصل الدراسي الأول - القسم الثاني



كتاب الطالب

المرحلة الثانوية

# الأحياء

الصف الحادى عشر

كتاب الطالب

الفصل الدراسي الأول – القسم الثاني

المرحلة الثانوية

اللجنة الإشرافية لدراسة ومواءمة سلسلة كتب العلوم

أ. براك مهدي براك (رئيسا)

أ. مصطفى محمد مصطفى على

أ. فتوح عبد الله طاهر الشمالي

أ. تهاني ذعار المطيري

أ. سعاد عبد العزيز الرشود

الطبعة الثانية

١٤٤٧ هـ

٢٠٢٦-٢٠٢٥ م

حقوق التأليف والطبع والنشر محفوظة لوزارة التربية - قطاع البحوث التربوية والمناهج

ادارة تطوير المناهج

وزارة التربية  
Ministry of Education  
State of Kuwait | دولة الكويت



الطبعة الأولى ٢٠١٤ - ٢٠١٣ م  
الطبعة الثانية ٢٠١٦ - ٢٠١٥ م  
م ٢٠١٩ - ٢٠١٨  
م ٢٠٢٠ - ٢٠١٩  
م ٢٠٢١ - ٢٠٢٠  
م ٢٠٢٣ - ٢٠٢٢  
م ٢٠٢٤ - ٢٠٢٣  
م ٢٠٢٥ - ٢٠٢٤  
م ٢٠٢٦ - ٢٠٢٥

## فريق عمل دراسة ومواهمة كتب الأحياء للصف الحادي عشر الثانوي

أ. ليلي علي حسين الوهيب

أ. دلال سعد مسعود المسعود  
أ. محمد علي أكبر عباس  
أ. منى حسين نوري عطية  
أ. خلود فهد عبد الحسن الدليمي

دار التَّرَبَّيُّونَ House of Education ش.م.م. وبيرون إديوكيشن ٢٠١٣



24797888

أودع بمكتبة الوزارة تحت رقم (٢٢) بتاريخ ٢١/٣/٢٠١٥ م



حَضْرَةُ صَاحِبِ الْبَلَدِ مُوَالِ الشَّيْخِ مُشَاعِلَ الْأَحْمَادِ الْجَبَرِ الصَّابِحِ  
أَمِيرُ دُوَلَةِ الْكُوَيْتِ

**H.H. Sheikh Meshal AL-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah**  
**Amir Of The State Of Kuwait**





سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح  
والي دولة الكويت

**H. H. Sheikh Sabah Khaled Al-Sabah**  
**Crown Prince Of The State Of Kuwait**



# المحتويات

## الجزء الأول

الوحدة الأولى: علم النبات

الوحدة الثانية: علم الوراثة

## الجزء الثاني

الوحدة الثالثة: أجهزة جسم الإنسان



# محتويات

## الفصل الدراسي الأول – القسم الثاني

92	الوحدة الثانية: علم الوراثة
93	الفصل الأول: أساسيات علم الوراثة
94	الدرس 1 – 1: الأنماط الوراثية
101	الدرس 1 – 2: مبادئ علم الوراثة
115	الدرس 1 – 3: دراسة توارث الصفات في الإنسان
120	الدرس 1 – 4: ارتباط الجينات (الارتباط والعبور)
126	الدرس 1 – 5: الوراثة والجنس
134	مراجعة الوحدة الثانية

### فصول الوحدة

#### الفصل الأول

- \* أساسيات علم الوراثة

### أهداف الوحدة

- \* يتعرف مفهوم علم الوراثة والصفات الوراثية.
- \* يميز بين الصفات السائدة والصفات المتنحية.
- \* يفهم قوانين مندل الوراثية.
- \* يفهم موضوع السيادة.
- \* يحدد شروط تحقيق النسب المنلية.
- \* يتعرف مفهوم التلقيح الاختباري وتطبيقاته.
- \* يتعرف مفهوم انعدام السيادة.
- \* يتعرف توارث الصفات باستخدام سجل النسب الوراثي.
- \* يفرق بين الاختلالات الوراثية السائدة والمتنحية، وطرق تحديدها.
- \* يتعرف مفهومي الارتباط والعبور وما يتبع عنهما من ارتباطات جينية جديدة.
- \* يفسّر دور الوراثة في تحديد الجنس.
- \* يميز بين الكروموسومات الجنسية والذاتية.
- \* يتعرف الصفات الوراثية المرتبطة والمتاثرة بالجنس.

### معالم الوحدة

- \* علم الأحياء في حياتنا اليومية
- \* العلم والمجتمع والتكنولوجيا



ما الخصائص والمميزات الخاصة التي تجعلك ممّيّزاً عن زملائك في المدرسة؟ قد يكون شعرك المجعد أو خفة ظلّك وروحك المرحة. هل يُشارِكك أحد أفراد عائلتك هذه الصفات؟ انظر من حولك، ما الصفات التي يتقاسّمها أفراد العائلات الأخرى؟ هناك عدد كبير من العائلات الحيوانية، أيضًا، مثل الدببة والبوم والذئاب والخنازير والكثير غيرها. لماذا يتشارّب أفراد كلّ عائلة من هذه العائلات؟

منذ قرون عدّة، يجهل الناس لماذا يتشارّب أفراد العائلات. جاءت الأدلة الأولى لتفسّر ذلك من خلال دراسة دقيقة لتوارث الصفات في النباتات، واكتُشفت معلومات كثيرة غيرها بعد اكتشاف المجهر. ومن الحدائق والمختبرات، بدأت الاكتشافات تجتمع بعضها مع بعض لحلّ لغز الوراثة.

### اكتشف بنفسك

#### استكشف الصفات الموروثة

الأدوات المطلوبة: قلم رصاص، ورقة بيضاء، ورقة رسم بياني الخطوات:

1. كُنْ واثقًا من قدرتك على تحديد كلّ صفة من الصفات التالية: القدرة على لف اللسان على شكل U ، شحمة الأذن ملتحمة أم سائبة ، وجود شعر على السلامية الوسطى لأصابع اليد أو غيابه ، وجود غمازات على الخد أو غيابها ، وغيرها من الصفات.

2. ضعْ جدوًّا لاستخدامه في حصر أفراد عائلتك أو معظم أصدقائك.

3. أحصِر الأشخاص الذين تبدو عليهم صفة أو أكثر من هذه الصفات، وسجّل مجموع الأشخاص لكلّ صفة.

4. أرسم شكلاً بيانيًّا لما توصلتَ إليه من نتائج. أيّ الصفات أكثر وضوحاً؟ أيّ صفة من هذه الصفات هي الأكثر انتشاراً؟

### دروس الفصل

#### الدرس الأول

\* الأنماط الوراثية

#### الدرس الثاني

\* مبادئ علم الوراثة

#### الدرس الثالث

\* دراسة توارث الصفات في الإنسان

#### الدرس الرابع

\* ارتباط الجينات (الارتباط والعيور)

#### الدرس الخامس

\* الوراثة والجنس

يتساءل كلّ والدين يتنتظر ان مولوداً جديداً كيف سيبدو طفلهما. هل سيكون صبياً أم فتاة؟ هل سيُشبهُ أنفهُ أبيهُ أم أمّه؟ هل سيكون لون عينيه أزرق أم بنيّاً؟ هل سيولد بصحة جيّدة؟ في الماضي ، ما كان للوالدين سوى أن يتوقّعا الإجابات عن هذه الأسئلة. أمّا اليوم ، فأصبحا يملكان كمّا من المعلومات تُساعدُهم على التوّقّع ببعض الصفات التي قد يحملها طفلهما. هذه المعلومات هي نتيجة الأبحاث في علم الوراثة. يشمل هذا العلم دراسة كيفية انتقال الخصائص البيولوجية من الآباء إلى الأبناء. قبل القرن العشرين ، اعتقاد الناس أنَّ الخصائص البيولوجية تنتقل من جيل إلى آخر بواسطة الدم ، ولا يزال الكثيرون يتحمّلون عن "نسب الدم". لكن أصبحنا نعلم الآن أنَّ هذه الخصائص تنتقل كرسائل كيميائية في الكروموسومات ، وهذه الرسائل مرّضة على جزيئات DNA داخل النواة .



## الأهداف العامة

- \* يُتَعَرَّفُ مفهوم علم الوراثة والصفات الوراثية.
- \* يُميِّزُ بين الصفات السائدة والصفات المتنحية.
- \* يُحلِّلُ نتائج تجارب مندل لثلاثة أجيال من نبات البازلاء.



(شكل 70)

هل تخجل من التحدث مع شخص تلتقيه للمرة الأولى ، أو تخجل من إلقاء خطاب؟ يخجل معظم الناس من ذلك. استعان العلماء بعلم الوراثة لتوقع وراثة صفة الخجل عند الأطفال ، فأنت تعرف أنَّ معظمهم خجول (الشكل 70). ويُحدَّد مقدار خجل الأطفال إلى حدٍ ما بعلم الوراثة. ويقلَّ هذا الخجل عموماً كلَّما اقترب الإنسان من سنِّ الرشد.



(شكل 71)

للبشر كلَّهم صفات وملامح عامة ، إلا أنَّ لكلَّ فرد صفات وملامح تُميِّزه عن الآخرين. ما هذه الصفات وكيف اكتسبها؟

لعلَّك لاحظْتَ أنَّ لكلَّ نوع من الكائنات الحية صفات تُميِّزه عن الكائنات الأخرى ، وأنَّ الكائنات تتکاثر جيلاً بعد جيل لتنقل صفاتها إلى نسلها لكي ينمو إلى النوع نفسه. فلا يُنجِب البشر إلا بشراً ، ولا تلد الفئران إلا فئراناً ، ولا تنتج بذور البلح إلا نخلاً.


وعلى الرغم من تشابه أفراد النوع الواحد في صفات نوعية تُميِّزهم عن أفراد الأنواع الأخرى ، إلا أنَّ كلَّ فرد من أفراد النوع نفسه له صفاته وملامحه الخاصة . فلعلَّك لاحظْتَ أنَّ لديك من الملامح ما يُميِّزك عن زملائك في المدرسة . وبالرغم من أنَّنا جمِيعاً بشر ، إلا أنَّ لكلَّ منا من الملامح ما يُميِّزه عن الآخرين (شكل 71).

## فقرة اثرانية

### علم الأحياء في حياتنا اليومية

#### خطوط الدم!

بحسب أسطورة شعبية عن الوراثة، تنتقل الصفات من الآباء إلى الآباء عن طريق الدم. ومصطلح "خط الدم" الذي يستخدمه مربو الحيوانات يعكس هذه الأسطورة. ففي هذا المصطلح، تُستخدم كلمة الدم للدلالة على النسب والذرية، أو وراثة الصفات.



(شكل 72)

العالم جريجور مندل (1822-1884م)  
مؤسس علم الوراثة الحديث.

منذ القدم، يعرف الإنسان أنّ صفات الآباء تنتقل إلى الأبناء من جيل إلى جيل، لكنه لم يكن يعرف شيئاً عن القوانين والآليات التي تحكم انتقال تلك الصفات. وقد افترض العلماء القدماء لعدة قرون أنّ صفات الآباء تمتزج في الأبناء، لكنّ هذا الفرض لم يقدّم تفسيراً عن ظهور صفات لدى بعض الأبناء لم تكن ظاهرة في الآباء. ولم يستطع العلماء تفسير ذلك إلاّ بعد اكتشاف تركيب الخلية.

سبق أن تعلّمتَ خلال دراستك للانقسام الميوزي (الاختزالي) أنّ الأبناء يستقبلون، من خلال عملية التكاثر الجنسي للآباء، نصف عدد الكروموسومات من أحد الوالدين والنصف الآخر من الوالد الآخر. وبعد الدراسات التجارب العديدة، تبيّن أنّ الصفات الوراثية تنتقل من الآباء إلى الأبناء بواسطة هذه الكروموسومات.

الصفات الوراثية **Genetic Traits** هي الصفات التي يمكن أن تنتقل من الآباء إلى الأبناء من جيل إلى جيل. ويتطلّق على الدراسة العلمية لهذه الصفات الموراثة اسم **علم الوراثة**.

يعتبر العالم النمساوي جريجور مندل (1822-1884م) (شكل 72) مؤسّس علم الوراثة الحديث. درس العلوم والرياضيات في جامعة فيينا، ثمّ أصبح راهباً في دير قرية برن التي ولد فيها. بدأ في العام 1860 مسلسلة من التجارب على نباتات البازلاء، تمكن من خلالها التوصل إلى مجموعة من المبادئ والقوانين الرئيسية لعلم الوراثة الحديث.

## Mendel's Experiments

### 1. تجارب مندل

اختار مندل نباتات البازلاء التي كان يزرعها في حديقة الدير الذي كان راهباً فيه لإجراء تجاربها على مجموعة من الصفات الموراثة. وتميزت تجارب مندل عن تجارب العلماء الذين سبقوه أو عاصروه بدراسة كلّ صفة على حدة في بداية تجاربها، وباستخدام أعداد كبيرة من النباتات (20 000 نبتة)، وباستخدام الاحتمالات والإحصاء الرياضي في تفسير النتائج.

وكان اختيار مندل لنبات البازلاء لإجراء تجاربها موفقاً لثلاثة أسباب:

- \* تركيب أزهار البازلاء، فهي أزهار خناث، تحيط بتلات التوبيع بأعضائها التناسلية تماماً في شكل زورق، ما يسمح بحدوث عملية التلقيح ذاتياً حيث تُحاط الأزهار بكيس من الورق لضمان عدم وصول حبوب لقاح من زهرة أخرى إليها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إحداث التلقيح الخلطي فيها بسهولة من خلال نزع المتك منها قبل نضجها، ثم إحاطتها بكيس من الورق على أن تُنقل إليها حبوب اللقاح بطريقة صناعية في الوقت المناسب (شكل 37).



(شكل 73)

كيف ساعد ترکيب زهور البازلاء وشكلها مندل على القيام بعملية التلقيح الخلطي وضبط التجربة؟

قطع الأسدية من الأزهار البنفسجية ثم تلقيح خلطياً بحربو اللقاح من الزهرة البيضاء.

\* يحمل نبات البازلاء أزواجاً من الصفات المتناظرة (المتقابلة أو المتعارضة) سهلة التمييز والرؤية، ما سهل على مندل ملاحظة نتائج تجاربه.

\* قصر دورة حياة نبات البازلاء (3 أشهر) يسمح بتكرار التجارب من ثلاثة إلى أربع مرات على الأقل على مدار العام الواحد.

درس مندل في تجاربه وراثة سبع صفات متناظرة، لكل صفة منها مظهران يسهل تمييزهما بعضهما عن بعض. فعلى سبيل المثال، إما أن يكون الساق في النباتات طويلاً (أكثر من 150 cm) أو قصيراً، ولا يوجد طول متوسط. إما بالنسبة إلى لون البذور، فإما أن تكون صفراء أو خضراء، ولا يوجد لون وسط بين هذين اللونين. وينطبق هذا الأمر على الصفات الأخرى.

بدأ مندل تجاربه بالتأكد من نقاء هذه الصفات عن طريق زراعة النباتات وتركها تتلاعج ذاتياً لتنتج الصفة نفسها التي كان يدرسها من جيل إلى جيل آخر من دون أي تغيير. فالنباتات الطويلة لا تنتج إلا نباتات طويلة جيلاً بعد جيل، والنباتات ذات الأزهار البنفسجية لا تنتج إلا نباتات ذات أزهار بنفسجية جيلاً بعد جيل، وهذا ينطبق على باقي الصفات السبع. وبذلك، حصل مندل على نباتات تميّز بنقاء صفاتها الوراثية، وأطلق على صفات هذه النباتات مصطلح «صفات نقية».

يستخدم مندل في تجاربه مجموعتين مختلفتين من النباتات النقية (تحمل كل مجموعة منها أحد شكلين للصفة التي كان يدرس توارثها)، وأطلق عليها اسم جيل الآباء. أجرى مندل التلقيح الخلطي بين المجموعتين، ثم زرع البذور الناتجة، فأنتجت بذورها نباتات أطلق عليها اسم الجيل الأول ( $F_1$ ).


وترك هذه النباتات تتلاقي ذاتياً ثم زرع البذور التي حصل عليها، فأنتجت نباتات أسمها الجيل الثاني ( $F_2$ ). يوضح الشكل (74) خطوات ونتائج الدراسة التي أجرتها مندل على توارث صفة طول الساق في نبات البازلاء، حيث كانت آباء إحدى المجموعتين طولية الساق نقية، والأخرى قصيرة الساق نقية.

## Mendel's Remarks

## 2. ملاحظات مندل

توقع مندل أن يحصل على نباتات طويلة الساق وأخرى قصيرة الساق في الجيل الأول، لكنه فوجئ بأن نباتات الجيل الأول كانت كلّها طويلة الساق.

دھش مندل عندهما ظهرت بعض نباتات الجيل الثاني طویل الساق بنسبة 75% وبعضها الآخر قصیر الساق بنسبة 25%. فالصفة الوراثية لقصر الساق قد اختفت في نباتات الجيل الأول ثم عاودت الظهور في نباتات الجيل الثاني. ولاحظ مندل أنّ النسبة العددية بين نباتات الجيل الثاني كانت تقریباً 3 : 1 (طویل : قصیر).



ما الصفة التي اختلفت في نباتات الجيل الأول؟ وما نسبة كل صفة من الصفتين في نباتات الجيل الثاني؟

كرر مندل تجاربها على الصفات الست المتبقية كما هو مبين في الشكل (75). وفي كل مرة كان يحصل على النمط الوراثي نفسه في الأبناء، حيث تظهر إحدى الصفتين فقط في الجيل الأول ثم تظهر الصفتان معًا في الجيل الثاني، بنسبة عددي ثابتة 1:3 تقريبًا. لاحظ النتائج الموضحة في الجدول (1).

أطلق مندل على الصفة الوراثية التي يحملها أحد الآبدين، وتظهر في أفراد الجيل الأول اسم «الصفة السائدة Dominant Trait»، أمًا الصفة التي يحملها أحد الآبدين ولا تظهر في الجيل الأول فقد أطلق عليها اسم «الصفة المتنحية Recessive Trait». أي أن الساق الطويلة سائدة على الساق القصيرة. ووجد مندل أن 75% من نباتات الجيل الثاني تحمل الصفة السائدة، أمًا الـ 25% المتبقية من أفراد الجيل الثاني فتحمل الصفة المتنحية.

الصفة	المظاهر المتنحية	المظاهر السائدة
شكل البذور	مجدد	أملس
لون البذور	أخضر	أصفر
شكل القرن	محرز	متflex
لون القرن	أصفر	أخضر
لون الزهرة	أبيض	بنفسجي
موقع الزهرة	طيفي	إبطي
طول الساق	قصير (أقل من 0.5 متر)	طويل (أكثـر من 1.5 متر)

(75) شكل الصفات السبع التي درسها مندل في نباتات البازلاء (لكل صفة مظهـران أو شـكلان مختلفـان).

النسبة الحقيقة	أعداد الباتات الحاملة للصفة في الجيل الثاني	الصفة الوراثية في الجيل الأول	الصفة الوراثية في جيل الآباء	الصفة الوراثية
1 : 2,84	طويل ، قصير 224 ، 705	طويل	طويل × قصير	طول الساق
1 : 2,95	منتَفِخ ، محَرَّز 299 ، 882	منتَفِخ	منتَفِخ × محَرَّز	شكل القرن
1 : 2,82	أَخْضَر ، أَصْفَر 152 ، 428	أَخْضَر	أَخْضَر × أَصْفَر	لُونَ الْقَرْنِ
1 : 2,96	أَمْلَس ، مَجْعَد 1850 ، 4574	أَمْلَس	أَمْلَس × مَجْعَد	شَكْلَ الْبَذُورِ
1 : 3,01	أَصْفَر ، أَخْضَر 2001 ، 6022	أَصْفَر	أَصْفَر × أَخْضَر	لُونَ الْبَذُورِ
1 : 3,14	إِبْطِي ، طَرْفِي 207 ، 651	إِبْطِي	إِبْطِي × طَرْفِي	مَوْضِعُ الزَّهْرَةِ
1 : 3,15	بَنْفَسْجِي ، أَيْضُ 224 ، 705	بَنْفَسْجِي	بَنْفَسْجِي × أَيْضُ	لُونُ الزَّهْرَةِ

#### (جدول 1)

يُوضّح الجدول الصفات السبع التي درسها مندل والنتائج التي حصل عليها. قارن كلّ صفة من الصفات الوراثية بين الجيلين الأول والثاني.

### 3. استنتاجات مندل وتفسيراته

#### Mendel's Conclusions and Explanations

حاول مندل تفسير ملاحظاته حول التجارب المقننة التي أجرتها باستخدامة التحليل الإحصائي ، فافتراض أنه يتم التحكّم بالصفة الوراثية بواسطة ما أسماه «العوامل» التي توجّد في أزواج في خلايا الكائن. تُعرّف حالياً العوامل التي افترضها مندل باسم الجينات Genes ، وهي أجزاء من الكروموسومات مسؤولة عن إظهار الصفات الوراثية. لاحظ أنه في الفترة الزمنية التي كان مندل يجري فيها تجاربه لم تتوفر أيّة معرفة بالكروموسومات أو الجينات.

افتراض مندل أيضاً أنه لا بدّ من وجود شكلين على الأقلّ لكلّ صفة وراثية ، ويسّمى كلّ واحد منهما بالأليل . والأليل الذي يظهر تأثيره عندما يجتمع الأليلان هو الأليل السائد Dominant Allele ، أمّا الأليل المتنحّي Recessive Allele فهو الذي لا يظهر تأثيره عندما يجتمع مع الأليل السائد . وإذا كان الأليلان متماثلين (سواء أكانا سائدين أم متنحّيين) ، تكون الصفة الوراثية صفة نقية Pure Trait .

أمّا إذا اجتمع الأليل السائد مع المتنحّي ، ف تكون الصفة صفة هجينية Hybrid Trait . وعادة ما يُمثل الأليل السائد بالحرف الأول الكبير من الكلمة الأجنبية الدالة على الصفة الوراثية كرمز للتعبير عن «العامل» أو «الجين» السائد المسؤول عن إظهار الصفة السائدة أو توريثها . ويُستخدم الحرف الصغير للحرف نفسه للتعبير عن العامل أو الجين المسؤول عن الصفة المتنحّية المقابلة . فعلى سبيل المثال ، يُمثل الجين المسؤول عن صفة طول الساق بالحرف "T" ، أمّا الجين المسؤول عن صفة قصر الساق فيُمثل بالحرف "t" (الحرف "T" أو "t" هو الحرف الأول من الكلمة Tall ) ، وبالتالي يُعبر عن كلّ صفة بحرفين . (يمكن في حالة تُشابه شكل الحرف اللاتيني الكبير مع الحرف الصغير استبداله بحرف آخر لسهولة الدراسة) .


نشر مندل ملخصاً لتجاربه و ملاحظاته واستنتاجاته في العام 1866 ، لكنّها لم تلق أيّ صدّى . ولم يفهّم مغزى أعمال مندل إلّا بعد 50 عام على وفاته ، بعد أن اكتُشفت الكروموسومات وعملية الانقسام الميوزي .

## مراجعة الدرس 1-1

1. إشرح الفرق بين الصفة الوراثية السائدة والصفة الوراثية المتنحّية .
2. ما النتيجة التي تتوّقّعها من تجارب مندل لتلقيح نبات بازلاء نقي أزهاره إبطية الموضع (axial) مع نبات بازلاء نقي أزهاره طرفية الموضع (terminal)؟
3. سؤال للتفكير الناقد: فوجئ مندل باختفاء صفة أحد الأبوين في الجيل الأول من تجاربه . ما تفسيرك لذلك؟
4. أضف إلى معلوماتك: قارن بين التلقيح الخلطي والتكاثر الاجنسي .
5. التلقيح ما بين نباتي بازلاء ، الأولى بذورها صفراء اللون والثانية بذورها خضراء اللون ، أعطى في الجيل الأول نباتات بازلاء بذورها صفراء اللون .  
 (أ) ماذا تستنتج؟  
 (ب) أعط رموزاً للأليلات .
- (ج) ما هو التركيب الجيني للأباء والتركيب الجيني للأبناء في الجيل الأول؟

## الأهداف العامة

- \* يُلخّص قوانين مندل الوراثية ويفسر بعض تطبيقاتها.
- \* يُحدّد شروط تحقيق النسب المندرية.
- \* يُوضّح مفهوم السيادة في الكائنات الحية.
- \* يتعرّف مفهوم انعدام السيادة ويفسّر بعض حالاته.
- \* يتعرّف مفهوم التلقيح الاختباري وبعض تطبيقاته.



(شكل 76)

قبل عصر مندل، لم يكن يُعرف شيء عن الكروموسومات. لكن بعد اكتشاف تقنيات صبغ الأنسجة، شوهدت الكروموسومات في أنوية الخلايا للمرة الأولى في أواخر القرن التاسع عشر (شكل 76). سمحت هذه التقنيات للعلماء والباحثين بمشاهدة التغييرات المختلفة التي تشهدها الكروموسومات أثناء المراحل المختلفة للانقسامين الخلويين الميتوzioni والميوزي.

## 1. الأساس الخلوي للوراثة

## The Cellular Basis of Inheritance



بعد إعادة اكتشاف ما نشره مندل، وتمكنّ العلماء من مشاهدة الكروموسومات (في الخلايا المصبوغة) بواسطة المجهر ودراستهم للانقسام الميتوzioni والانقسام الميوزي في الخلايا، بدأ العلماء بمشاهدة التشابه بين سلوك الكروموسومات وسلوك العوامل الوراثية التي افترضها مندل (والتي عُرِفت لاحقاً بالجينات).

وقد سمح ذلك للعالم ساتون في العام 1903 بوضع «النظرية الكروموسومية في الوراثة Chromosome Theory of Heredity»، والتي تُقرّ بأن «مادة الوراثة محمولة بواسطة الجينات الموجودة على الكروموسومات». بناءً على ذلك، إنّ سلوك الصفات عند انتقالها من جيل إلى الجيل الذي يليه يرجع إلى سلوك الكروموسومات وما تحمله من جينات.

## 2. تمثيل الأليلات بالرموز Representing Alleles

يستخدم العلماء مجموعة من المصطلحات والرموز لتبسيط شرح النظرية الكروموسومية في الوراثة. وبما أنّ الجينات هي أجزاء من الكروموسومات، فإنّ الكروموسومات هي المسؤولة عن توريث الصفات. والأليلات Alleles عبارة عن أشكال مختلفة للجينات، ولكلّ جين صفة وراثية. فيت Hickem في إظهار لون قرن البازلاء جين واحد له أليلان، أحدهما للقرون الخضراء (الصفة السائدة) ويرمز له بالحرف (G)، والآخر للقرون الصفراء (الصفة المتنحية) ويرمز له بالحرف (g). طبقاً لاستنتاجات مندل والنظرية الكروموسومية في الوراثة، توجّد عوامل (جينات) الصفة الوراثية في أزواج. وبالتالي فإنّ جيني الصفة الوراثية قد يكونان متماثلين (سواء للصفة السائدة أو للصفة المتنحية المضادة)، ويُسمى الفرد «نقياً أو متشابه اللاقحة Homozygous»، أو يتحمل أن يكون الجينان مختلفين (أحدهما للصفة السائدة والآخر للصفة المتنحية) فيُسمى الفرد «هجيناً أو خليطاً أو متباين اللاقحة Heterozygous». وبالتالي فإنّ التركيب الجيني Genotype أي التركيب الوراثي لنبات البازلاء النقي للقرون الخضراء هو GG، والتركيب الجيني لنبات البازلاء الهجين للقرون الخضراء هو Gg. بمعنى آخر، الفرد الذي يحمل الصفة السائدة له احتمالان لتركيبه الجيني. فما هو التركيب الجيني أو التركيب الوراثي لنباتات البازلاء ذي القرون الصفراء؟

يُطلق على الصفة الظاهرة على الفرد مصطلح التركيب الظاهري Phenotype. فقد يكون نبات البازلاء بنفسجي أو أبيض الأزهار، وقد يكون طويل أو قصير الساق، وهذا ينطبق على باقي الصفات. فعلى سبيل المثال، التركيب الظاهري لجيل الآباء لتجارب مندل كان نباتات طويلة الساق لها تركيب جيني نقي (TT)، ونباتات قصيرة الساق لها تركيب جيني نقي (tt)، أنتجت نباتات الجيل الأول التي لها تركيب ظاهري طويل الساق (صفة سائدة) وتركيب جيني هجين (Tt) (شكل 77).



(شكل 77)

تواتر صفة طول الساق في نباتات البازلاء.  
قارن بين التركيب الجيني للنباتات مع تركيبها الظاهري.

### Mendel's Law

بعد اكتشاف أعمال مندل ، قام العلماء بصياغة نتائجه وإصدارها في شكل قوانين سميت قوانين مندل ، تقديراً لإنجازاته . ولوحظ أن العديد من الصفات تتبع قوانين مندل وتسمى الصفات المندلية ، في حين أن صفات أخرى لا تتبعها وتسمى الصفات غير المندلية . (تذكر دائمًا خطوات الانقسام الميوزي ونتائجها عند دراسة الصفات المندلية).

### 3. قوانين مندل


#### 1.3 القانون الأول: قانون الانعزال

#### The Law of Segregation

افتراض مندل أن أزواج العوامل (الجينات) تفصل عند تكوين الأمشاج ، ويُعرف هذا حالياً بقانون الانعزال . وينص هذا القانون على ما يلي: «ينفصل كل زوج من الجينات بعضهما عن بعض أثناء الانقسام الميوزي ، بحيث يحتوي نصف عدد الأمشاج الناتجة على جين واحد من كل زوج من الجينات ، ويحتوي النصف الآخر على الجين الآخر» .

أُنظر الشكل (78) الذي يمثل الانقسام الميوزي للخلية الأم لبنة بازلاء من الجيل الأول ، والذي ينتج عنه تكوين أمشاج يحتوي كلّ منها على جين واحد.

(شكل 78)  
خلال الانقسام الميوزي تفصل أزواج الجينات بعضها عن بعض .  
ما عدد الأمشاج التي تحتوي على الجين  $T$  ، وما عدد الأمشاج التي تحتوي على الجين  $t$  ؟



## التوقع بوراثة صفة واحدة

### Prediction of the Inheritance of One Trait

يستخدم علماء الوراثة بعض الوسائل والأدوات للتوقع بتوارث التراكيب (الأنمط) الظاهرة والجينية في تجاربهم قبل القيام بها ، أي قبل أن تحدث عمليتا التهجين والإخصاب بين نباتات أو حيوانات هذه التجارب .

ومن هذه الأدوات أداة صممها العالم بانت وترف بمرّبعات بانت **Punnett Squares** ، وهي عبارة عن مربعات لتنظيم المعلومات الوراثية لتوضيح النتائج المتوقعة في تجارب الوراثة وليس النتائج نفسها .  
ويمكنك أيضًا استخدام مربع بانت للتوقع بنتائج التهجين أو التزاوج بين كائينين ، مثل التهجين بين نباتي بازلاء كلّيهما هجين أو متباين اللاقحة بالنسبة لصفة البذور الصفراء ( $Yy$ ) .

<p>3. حدد التراكيب الظاهرية للأبناء</p> <p>زاوج بين أليلات أمشاج الأبوين داخل خانات الجدول. ثمّ العروض الناتجة التراكيب الظاهرية للأبناء والنسب بينها.</p>	<p>2. إملأ الخانات في الجدول</p> <p>استخدم قانون السيادة العامة لشحدّد خانات الجدول. ثمّ العروض الناتجة التراكيب الجينية للأبناء.</p>	<p>1. أرسم جدولًا من خطوط متقطعة</p> <p>ضع أليلات الأمشاج التي تحصل أحد الأبوين في قمة الجدول، وتلك الخاصة بالآخر على الجانب الأيمن من الجدول.</p>	<p>في هذا المثال كلّ من الأبوين متباين اللاقعة لأليل بذور المازلاء الصفراء (Yy).</p>

نسبة التراكيب الظاهري لأفراد الجيل الأول 3 : 1، وهذا معناه (1) YY، (2) Yy، (3) yy، وهذا معناه 3 بذور بازلاء صفراء اللون مقابل بذرة واحدة خضراء.

(شكل 79)

كيف تُصمّم مربع بانت؟

تُسهّل مربعات بانت للعاملين في مجال الوراثة التوقع بالتراكيب الجينية والتراكيب الظاهرية المحمّلة للأبناء.

يُكتَب هذا التهجين على الصورة التالية:  $Yy \times Yy$ . وبالتالي، ينْتَج عن كلّ نبات من الآباء نوعان من الأمشاج، نصفها يحمل الأليل Y والنصف الآخر يحمل الأليل y.

سُتُّلاحِظُ أنَّ الحروف التي تشغّل هذه الخانات جاءت نتيجة ارتباط أليلات الأمشاج الناتجة عن الآباء، وبالتالي فإنَّ هذه الحروف تمثّل التراكيب الجينية لجيل الأبناء. يُوضّح الشكل (79) وجود ثلاثة تراكيب جينية مختلفة لجيل الأول:  $YY$ ,  $Yy$ ,  $yy$ . ما التراكيب الظاهرية لهذه التراكيب الجينية الثلاثة؟ يُوضّح الشكل أيضًا أنَّ النسب المحمّلة للتراكيب الجينية للأبناء هي 1 : 2 : 1، ونسبة المئوية 25%  $YY$ , 50%  $Yy$ , 25%  $yy$ .


لقد تعرّفتَ كيفية استخدام مربع بانت للتوقّع بنتائج توارث صفة واحدة من دون النظر إلى باقي الصفات، وهذا ما يُعرف بالتهجين الأحادي Monohybrid Cross. هل يُمكِّنك تحديد نتائج التهجين الأحادي لنباتات بازلاء طويلة الساق نقية (TT) مع نباتات بازلاء أخرى طويلة الساق هجين (Tt)؟

### 2.3 القانون الثاني: قانون التوزيع المستقلّ

#### The Law of Independent Assortment

درس مندل أيضًا توارث صفتين وراثيتين في الوقت نفسه، فأجرى تلقيحًا خلطيًّا بين نباتي بازلاء يحمل أحدهما صفتين سائدتين نقيتين هما بذور ملساء الشكل وصفراء اللون (YYRR)، في حين يحمل الآخر صفتين متنحيتين هما بذور مجعدة الشكل وخضراء اللون (yyrr)، فجاءت جميع نباتات الجيل الأول تحمل بذورًا ملساء وصفراء اللون (YyRr)،

أي أنها تحمل الصفتين السائدتين فقط. ثم ترك مندل نباتات الجيل الأول تتلاقي ذاتياً، فظهرت نباتات الجيل الثاني تحمل جميع الارتباطات الممكنة لشكل البذور ولونها الظاهرية في الشكل (80).




دراسة مندل لتوارث صفتى لون البذور (خضراء وصفراء) وشكلها (ملساء ومجعدة) في الوقت نفسه.  
ما التراكيب الظاهرية لبذور البازلاء التي حصل عليها مندل ، وما النسب الظاهرية لها؟

وقد لاحظ مندل أنّ النسبة نفسها بالنسبة لكلّ صفة من هاتين الصفتين هي التي حصل عليها في تجربته على زوج واحد من الصفات (3) . هذا يعني أنّ توارث لون البنور لا يرتبط بتوارث شكلها ، أي أنه يتم توارث كلّ صفتين متضادتين (صفراء ، خضراء) بشكل مستقلّ عن الصفتين الآخريين (ملساء ، مجعدة) . وهذا ما يوضحه القانون الثاني لمندل والذي ينصّ على أن: «تفصل أزواج الجينات بعضها عن بعض ، وتتوزّع في الأمشاج عشوائياً ومستقلّة كلّ منها عن الأخرى».

(شكل 81)  
أمشاج الجيل الأول  $F_1$   
كيف تفصل أزواج الجينات وتتوزّع في الأمشاج؟

وطبقاً لهذا القانون ، سوف توزّع الأليلات مستقلّة ، ما يؤدّي إلى إمكانية تواجد أربعة احتمالات ممكنة للأليلات في أمشاج الجيل الأول:  $rY$  ،  $ry$  ،  $Ry$  ،  $RY$  ، كما هو مبين في الشكل (81) .



قارن بين قانون التوزيع المستقل وسلوك الكروموسومات أثناء الانقسام الميوزي (شكل 81). لاحظ أن انفصال أزواج الكروموسومات يحدث عشوائياً وتنتج جميع الاحتمالات الممكنة للكروموسومات في الأمشاج. وبالتالي إذا لم تفصل أزواج الكروموسومات عشوائياً، سيكون للأبناء ارتباط الصفات نفسه مثل أحد الأبوين. بمعنى آخر، من دون قانون التوزيع المستقل، لا يمكن أن يكون لديك لون عيني أبيك ولا ابتسامة أمك!

## التوقع بوراثة صفتين

### Prediction of the Inheritance of Two Traits

تعرف دراسة توارث صفتين في وقت واحد بعملية التلقيح الثنائي Dihybrid Cross. ويوضح الشكل (82) الخطوات المتبعة لتفسير نتائج التلقيح الذاتي لباتات البازلاء من الجيل الأول وهم متبانين اللاقحة الأليلي البذور الملساء صفراء اللون. ويكتب هذا التهجين على الشكل التالي:  $RrYy \times RrYy$

في هذا المثال، كل من الأبوين متبانين اللاقحة الأليلي بذور البازلاء الملساء صفراء اللون ( $RrYy$ ).

ry	rY	Ry	RY	RY

التركيب الظاهرية للأبناء والنسب بينها.

تمثل الحروف الناتجة التراكيب الجينية المحتملة للأبناء.

ry	rY	Ry	RY	RY

نسبة التركيب الظاهري  $9:3:3:1$  وهذا معناه أن 9 بذور ملساء صفراء، 3 بذور مجعدة صفراء، 3 بذور ملساء خضراء، بذرة واحدة مجعدة خضراء.

الأب الأول  $RrYy$  ←   
  $RrYy \times RrYy$  ←   
 الأب الثاني  $RrYy$

توجد 9 تراكيب جينية مختلفة:  $RRyy, RrYY, RRYy, RRYY, rrYy, rrYY, Rryy, RrYy, rrry$

(شكل 82)

كيف تتحقق توقع التهجين الثنائي؟  
تسهل عمليات التهجين الثنائي التوقع بالتركيب الجينية والظاهرية المحتملة لوراثة صفتين.

### 3.3 القانون الثالث: قانون السيادة

#### The Law of Dominance

ينص هذا القانون على ما يلي: «الأليل السائد يظهر تأثيره، أما الأليل المتنحّي فيخفى تأثيره في الفرد التهجين، إلا إذا اجتمع هذان الأليلان المتنحيان معًا». على سبيل المثال، يمثل اللون البنفسجي لزهرة البازلاء متبانة اللاقحة بآللين، أحدهما سائد (P) والآخر متنحّ (p) وتركيبها الجيني ( $Pp$ )، أما تركيبها الظاهري فيبني على اللون. بذلك يتضح أن الأليل السائد هو الذي ظهر تأثيره، في حين أن الأليل المتنحّ لا تأثير ظاهر له طالما أنه متزاوج مع الأليل السائد.

## التلقيح الاختباري


### Test-cross

تعرّفت أنّ الفرد الذي يحمل صفة سائدة يُمكّن أن يكون تركيبه الجيني نقىًّا (متشابه اللاقحة) أو هجينًا (خلطًا أو متباين اللاقحة). أمّا الفرد الذي يحمل الصفة المتنحية فدائماً ما يكون تركيبه الجيني نقىًّا أو متباين اللاقحة. فكيف يُمكّن تحديد ما إذا كان التركيب الجيني لفرد الذي يحمل الصفة السائدة نقىًّا أم هجينًا لهذه الصفة؟

يُمكّن للعلماء التمييز بين الفرد النقى السائد والفرد الهجين السائد من خلال إجراء التلقيح الاختباري Text Cross. ويتم ذلك بإجراء تلقيح خلطي بين الفرد الذي يحمل الصفة السائدة غير محددة التركيب الجيني مع فرد آخر يحمل الصفة المتنحية المقابلة لها. وبما أنّ الصفة المتنحية لا تظهر في التركيب الظاهري إلا إذا اجتمع الأليلان المتنحيان، فإنّ الفرد الذي يحمل الصفة المتنحية يكون نقىًّا ومعروف التركيب الجيني.

إذا كان التركيب الجيني لفرد المختبر سائداً نقىًّا، سيكون التركيب الظاهري لجميع الأفراد الصفة السائدة. أمّا إذا كان التركيب الجيني لفرد المختبر سائداً هجينًا، فسيكون التركيب الظاهري لنصف الأفراد الناتجة الصفة السائدة والتركيب الظاهري لنصفها الآخر الصفة المتنحية.

ولتتعرّف كيف يتم التلقيح الاختباري، أدرس المثال في الشكل (83). فكلا التركيبين الجينيين  $Yy$  و  $YY$  يُتّجحان بذور بازلاء صفراء اللون لأنّها الصفة السائدة. وفي التلقيح الاختباري، يتم تلقيح النبات المراد اختباره ( $Y?$ ) خلطًا مع النبات الذي يحمل التركيب الجيني النقى المتنحى ( $yy$ ). ما التركيب الجيني لهذا النبات المختبر إذا أنتجت جميع نباتات الجيل الأول بذوراً صفراء اللون؟



(شكل 83)

استخدام التلقيح الاختباري لتحديد التركيب الجيني قد يكون نبات البازلاء الذي يحمل البذور الصفراء (الصفة السائدة) نقىًّا ( $YY$ ) أو هجينًا ( $Yy$ ). إذا كانت نسبة البذور الصفراء إلى البذور الحضراء في النباتات الناتجة من التلقيح الاختباري (1:1)، فما هو التركيب الجيني للنبات السائد؟

يوضح الشكل (84) مثلاً آخر على التلقيح الاختباري بين نبتتين من البازلاء: لإحداهما صفتان سائديتان هما البذور الملساء صفراء اللون، وللآخر صفتان متنحيتان هما البذور المجندة خضراء اللون (yy rr). وقد أُجري هذا التلقيح لمعرفة نقاوة الصفتين السائديتين (Y?R?).

التلقيح الاختباري

yr	yR	Yr	YR	yr
				yr
yyrr	yyRr	Yyrr	YyRr	

yyrr

أو

YR	YR	yr
		yr
YyRr	YyRr	

YyRr

yyrr

yyRr

Yyrr

YyRr

yr

Y?R?

Yyrr

التركيب الجيني لبادنات  
البازلاء ذات البذور  
الخضراء والمجندة  
(yy rr) يكون دائمًا  
معروفاً لأنّه متاح لهاتين  
الصفتين.

إذا كانت نبتة البازلاء المراد اختبارها سائدة  
هجينية للصفتين (Yy Rr)، فستكون نسبة  
البذور الناتجة 1:1:1:1، أي 25% بذرة  
واحدة صفراء ملساء، 25% بذرة واحدة  
صفراء مجندة، 25% بذرة واحدة خضراء  
ملساء، 25% بذرة واحدة خضراء مجندة.

(84) شكل

قد يكون البازلاء الذي يحمل البذور الملساء (YY RR) والصفراء (الصفتان السائديتان) نقياً (YY RR) أو هجينياً (Yy Rr). إذا كانت نسبة البذور الناتجة من التلقيح الإختباري (1:1:1:1)، مما هو التركيب الجيني لبادنات البازلاء ذات الصفتان السائديتان؟

### مقدمة إثرائية

شروط تحقيق النسب المندلية  
لكي تتحقق النسب الجينية  
والظاهرية للصفات التي تنطبق عليها  
قوانين مندل، يجب التقييد ببعض  
الشروط:

- \* أن يكون الأبوان المراد تزاوجهما من سلالة نقية.
- \* أن يوجد تباين بين الصفات الوراثية التي تتم دراستها.
- \* أن تكون الكائنات المختارة سريعة النمو وسهلة التربية وذات إنتاج كبير، وذلك للتمكن من تفسير نتائج تزاوجاتها التجريبية إحصائياً.

## 4. توقعات وراثية لا تخضع لقوانين مندل

### Predictions that Do Not Obey Mendel's Laws

تعلّمتَ خلال دراستك للسيادة التامة أنَّ أحد أليلي الصفة الوراثية يسود على الأليل الآخر ويحجب تأثيره تماماً، أو بمعنى آخر أنَّ الصفة السائدة في الفرد الهجين (الناتج من تزاوج آباء نقية) تسود على الصفة المتنحية وتحجب ظهورها تماماً. إلَّا أنَّ تجارب العلماء بعد مندل أوضحت أنَّ هناك صفات لا تورث وفقاً لما توصل إليه مندل، أي أنَّها تتعارض مع قوانينه. وقد سُمِّيت «الصفات غير المندلية» لأنَّها تخضع في توارثها لآليات أخرى غير السيادة التامة. من هذه الآليات آلية السيادة الوسطية.

### Intermediate Dominance

### السيادة الوسطية


يُلاحظ أنَّ الفرد الهجين لديه صفة لا تُشَبِّه تماماً الصفة الموجودة لدى أيٍ من الأبوين ويُسمى هذا النوع من السيادة بالسيادة الوسطية. Intermediate Dominance. يُظهر التركيب الظاهري لهذا الفرد الهجين التأثيرات لأكثر من أليل واحد. يوجد نوعان من السيادة الوسطية: السيادة غير التامة والسيادة المشتركة.

## (أ) السيادة غير التامة

### Incomplete Dominance

يكون التركيب الظاهري للهجين وسطياً بين التركيبين الظاهريين للأبوين النقيين في حالة السيادة غير التامة Incomplete Dominance . يوضح الشكل (85) هذا النوع من الوراثة من خلال توارث لون الأزهار في نبات حنك السبع . يعتبر اللون القرنفلي لأزهار نبات الجيل الأول صفة وسطية بين اللونين الأحمر والأبيض لأزهار الآباء . يظهر تأثير الأليل (R) على الصفة الظاهيرية للزهرة ، وفي الوقت نفسه يظهر تأثير الأليل (W) ، ولا يسود أيٌ منهما سيادة تامة على الآخر ، وبمعنى آخر لا توجد أليلات مسؤولة عن إظهار اللون القرنفلي للأزهار .

عندما يتم التلقيح الذاتي للأزهار القرنفلي للنباتات الهجينة للجيل الأول ، تعود صفات الآباء للظهور إلى جانب ظهور صفة اللون القرنفلي في أفراد الجيل الثاني . ما النسبة المظهرية بين نباتات الجيل الثاني ؟




(شكل 85)

السيادة غير التامة في نبات حنك السبع .

تظهر حالة السيادة غير التامة عندما يظهر كلّ من أليلي الآباء تأثيره كاملاً ، ويكون التركيب الظاهري للجيل الأول وسطياً بين التركيبين الظاهريين للأبوين . في هذا المثال ، ينتج عن الأزهار البيضاء والأزهار الحمراء أزهار قرنفلي اللون .


توجّد أمثلة أخرى توضّح انعدام السيادة مثل توارث لون الجلد في بعض سلالات الأبقار حيث توجّد أبقار حمراء وأخرى بيضاء. تزاوج فردان من هذين اللونين يُنّتّج أبقاراً هجينة ذات لون بنّي مبيض أو أغبر، يُعتبر مزيجاً من لوني الأبوين الأحمر والأبيض. مثال آخر هو توارث لون الريش في الدجاج الأندلسي، فتزاوج فردان نقين أحدهما أسود الريش والآخر أبيض الريش يُنّتّج دجاجاً هجينًا له ريش رمادي اللون (شكل 86).



## السيادة غير التامة في دجاج الأندلس.

## Codominance

يظهر تأثير الأليلين الموجدين في الفرد الهجين كاملين منفصلين في حالة السيادة المشتركة Codominance. مثال على السيادة المشتركة وراثة لون الشعر في أبقار الشورتھورن ، حيث إنّ أليلي لون الشعر الأحمر (R) والأبيض (W) ذات سيادة مشتركة. فإنّ تزاوج ذكر شورتھورن أحمر اللون (RR) مع أنثى شورتھورن أبيض اللون يُتّجح أفراداً هجيننة تمتلك شعرًا أبيض وأحمر (RW) كما هو موضّح في الشكل (87). وبالتالي ، لا يوجد سيادة لأحد الأليلين على الآخر .



### (شكل 87) السيادة المشتركة

## مراجعة الدرس 1-2

1. صُفْ قوانين مندل واذكر أمثلة.
2. قارِن بين التهجين الأحادي والتهجين الشائي.
3. باستخدام قوانين مندل ، إشرح سبب ظهور نباتات بازلاء تحمل الصفات الوراثية السائدة أكثر من تلك التي تحمل الصفات الوراثية المتنحية خلال الجيل الثاني.
4. ما نتائج التهجينات التالية؟

(أ)  $dd \times Dd$       (ب)  $qq \times QQ$       (ج)  $Mm \times MM$       (د)  $Bb \times Bb$

5. ما مرحلة الانقسام الميوزي التي تتفق مع قانون مندل للانعزال؟
6. أضف إلى معلوماتك: هل يجري التلقيح الاختباري على أفراد الجيل الثاني في حالة السيادة الوسطية؟
7. حدث تراوُج بين ببغاء لون جسمه أخضر ورأسه أصفر نقي للصفتين ، وبيباء لون جسمه أزرق ورأسه أبيض نقي للصفتين. فجاء لون أجسام جميع طيور البيباء في الجيل الأول أخضر ولون رؤوسها أصفر.
  - (أ) ما هي الصفات السائدة؟ علّل إجابتكم.
  - (ب) أكتب رموزاً للجينات المناسبة.
  - (ج) حدّد التراكيب الجينية لكلّ فرد من أفراد جيل الآباء وأفراد الجيل الأول.

بعد أن زاوجنا أفراد الجيل الأول ، حصلنا في الجيل الثاني على التراكيب الظاهرية التالية:

- |                            |
|----------------------------|
| 27 طير بيباء أخضر - أصفر   |
| 9 طيور بيباء خضراء - بيضاء |
| 9 طيور بيباء زرقاء - صفراء |
| 3 طيور بيباء زرقاء - بيضاء |
- (د) أحسب النسب لأفراد الجيل الثاني.
- (ه) أجر التحليل الجيني المناسب للتحقق من النتائج التي حصلت عليها.
- (و) ما أنواع التراكيب الجينية التي نحصل عليها من هذا التراوُج.

## مراجعة الدرس 1-2 (تابع)

8. يوجد ثلاثة أشكال من الفجل وهي الطويل ، الدائري والبيضاوي . وقد أعطت التلقيحات المختلفة بين نباتات الفجل النتائج التالية:  
**التلقيح الأول:** ما بين نبتة فجل طويلة ونبتة فجل بيضاوية أعطى 120 فجلة طويلة و 118 فجلة بيضاوية .  
**التلقيح الثاني:** ما بين نبتة فجل دائري ونبتة فجل بيضاوية أعطى 139 فجلة دائريه و 141 فجلة بيضاوية .  
**التلقيح الثالث:** وهو تلقيح ذاتي ما بين الفجل البيضاوي أعطى 60 فجلة طويلة ، 58 فجلة دائريه و 119 فجلة بيضاوية .  
فسر وتحقق من نتائج التلقيحات الثلاثة .
9. التلقيح ما بين سلالتين نقيتين من الذرة لديهما الخصائص التالية:  
بذور دائيرية صفراء اللون وبذور مجعدة سوداء اللون أعطى في **الجيل الأول** ذرة جميع بذورها دائيرية وسوداء اللون .
- (أ) ماذا تستنتج ؟  
(ب) أعط رموزاً للجينات .
- (ج) ما هو التركيب الجيني لنباتات الآباء ولنباتات الجيل الأول ( $F_1$ )؟  
قمنا الآن بإجراء التلقيح الذاتي لنباتات الجيل الأول .
- (د) اجري تحليلًا جينيًا مناسباً مستعيناً بمرربع بانت لتحديد نسب التراكيب الظاهرية والتراكيب الجينية عند جيل الأبناء الثاني ( $F_2$ ) .  
التلقيح بين نوعي نبات ذرة لديهما التراكيب الظاهرية التالية: بذور دائيرية سوداء وبذور دائيرية صفراء .  
يعطي النتائج التالية:  
241 نبتة بذورها دائيرية وسوداء  
234 نبتة بذورها دائيرية وصفراء  
78 نبتة بذورها مجعدة وسوداء  
81 نبتة بذورها مجعدة وصفراء
- (هـ) ما هي التراكيب الجينية النظرية للآباء؟  
(و) بعد مناقشة منطقية ، استنتاج التركيب الجيني لكلاً منهما .  
(ز) احتسب نسب التراكيب الظاهرية لنتائج التلقيح .  
(حـ) اجري تحليلًا جينيًا مناسباً مستعيناً بمرربع بانت للتحقق من النسب المحسوبة .

# دراسة توارث الصفات في الإنسان

## Studying Inherited Traits in Humans

### الأهداف العامة

- \* يُفسّر توارث بعض الصفات باستخدام سجل النسب الوراثي.
- \* يُدرك الفرق بين بعض الاختلالات الوراثية السائدة والمنتقية.
- \* يُحدد بعض طرق تحديد بعض الاختلالات الوراثية المحتمل توارثها (الاستشارات الوراثية).




(شكل 88)

هل تظہر غمّازات في خديك عندما تبتسم؟ هل تعرف عائلة تنتشر الغمّازات لدى أفرادها؟ يتحكّم في توارث الغمّازات أليل سائد ، فإذا ورث هذا الأليل ظهرت الغمّازات (شكل 88). لكن أن يكون الأليل سائدًا لا يعني بالضرورة أن تكون الصفة الظاهرة نتيجة تأثيره هي الصفة الأكثر عمومية وانتشارًا. كم عدد الأشخاص الذين تعرفهم والذين لديهم غمّازات؟

### 1. دراسة سجل النسب الوراثي Pedigree Studies

ليست دراسة انتقال الصفات الوراثية في الإنسان أمرًا سهلاً، وذلك بسبب طول الفترة الممتدّة بين جيل وآخر. إلا أنّ دراسة انتقال الصفات الوراثية في نبات البازلاء أسهل إذ تبلغ الفترة الممتدّة بين جيل وآخر 90 يومًا فقط ، بالإضافة إلى قلة عدد الأفراد الناتجة عند كلّ تزاوج. تمكّن العلماء حديثًا من التوصل إلى بعض التقنيات التي تُمكّنهم من دراسة جينات الإنسان بطريقة مباشرة.

لكنّ معظم ما نعرفه عن الوراثة في الإنسان ما زال مصدره دراسة بعض الأنماط الوراثية في الإنسان عن طريق دراسة سجل النسب أو شجرة النسب لبعض العائلات. وسجل النسب Pedigree عبارة عن مخطط يوضح كيفية انتقال الصفات وجيناتها من جيل إلى جيل في عائلة محدّدة.



شكل (89)

مخطط سجل النسب لتواجد صفة إصبع الإبهام المنحني في إحدى العائلات

لهذه السجلات الوراثية فائدة صحّية في تتبع توارث الصفات المختلفة، بخاصة ما يتعلّق بالاختلالات والأمراض الوراثية.

ويُحضر المستشارون الوراثيون هذه السجلات الوراثية للأشخاص المقبلين على الزواج للتوقّع باحتمال ظهور مثل هذه الصفات الوراثية في نسلهم. ويفعلون ذلك من خلال جمع المعلومات عن التاريخ الوراثي لعائلات هؤلاء الأشخاص فيما يخصّ صفات وراثية معينة.

يُوضّح الشكل (89) تتبع وراثة صفة إصبع الإبهام المنحني خلال ثلاثة أجيال لإحدى العائلات، وهي صفة وراثية متّحّبة. قارن بين إصبعي الإبهام في الشكل، هل لديك مثل هذه الصفة؟

سبق أن تعلّمتَ أنَّ الأليل المتنحّي لا يظهر تأثيره في حالة وجوده مع الأليل السائد. ففي الفرد الهجين (متباين اللاحقة) لا يظهر تأثير الأليل المتنحّي بسبب اجتماعه مع الأليل السائد. ويُطلق على الفرد الذي يحمل أليل/جين الصفة المتنحّية والتي لا يظهر تأثيرها مصطلح حامل الصفة Carrier.


## 1.1 دراسة سجل النسب الوراثي لصفة وراثية متمنّية

### Pedigree Study for a Recessive Trait



(شكل 90)  
المهاق (عدم الشمس) صفة متمنّية تظهر في جميع السلالات البشرية.

يُعدّ المَهَاق (الألبينو) Albinism الموضّح في الشكل (90) صفة وراثية متمنّية (خلل وراثي) في الإنسان ، يتسبّب في ظهورها أليل متمنّ يُسبّب نقصاً في صبغ الميلانين أو غيابه في الجلد والشعر والعينين والرموش . ويرمز لها الأليل المتمنّ بالحرف (a) والأليل السائد بالحرف (A) ، ولا تظهر هذه الصفة إلّا في حالة اجتماع الأليلين المتمنّين (aa) . أمّا الأفراد ذوو التراكيب الجينية (AA) أو (Aa) ، فأفراد سليمون ولا تظهر هذه الصفة عليهم ، حتّى لو كان الفرد ذو التراكيب الجيني (Aa) يُعتبر حاملاً لهذه الصفة . ويُوضّح الشكل (91) سجل النسب الخاص بتوارث هذه الصفة في إحدى العائلات .




(شكل 91)  
سجل النسب لصفة وراثية متمنّية (المهاق) في الإنسان

## 2.1 دراسة سجل النسب الوراثي لصفة وراثية سائدة

### Pedigree Study for a Dominant Trait

يُوضّح الشكل (92) سجل توارث الخلل الوراثي المعروف باسم استجماتيزم العين . ينتج هذا الخلل عن أليل سائد يتسبّب في عدم تساوي تقوس قرنية العين ، ما يُؤدي إلى ظهور الأشياء أكثر وضوحاً عند مستوى معين منه عند مستوى آخر .



(شكل 92)  
سجل النسب لصفة وراثية سائدة (استجماتيزم العين) في الإنسان

## 2. زواج الأقارب وزواج الأبعد

### Endogamy and Marriage

غالباً ما يؤودي الزواج بين الأقارب إلى ولادة أبناء يعانون الكثير من الاختلالات والأمراض الوراثية. ويفسر ذلك بأنّ الزواج بين الأقارب يتيح الفرصة لظهور تأثير الكثير من الجينات الضارة من النوع المتختلي الموجودة لديهم. أمّا الزواج بين الأبعد فيؤدي إلى ولادة أفراد هجينة يتم فيها احتجاب الصفات غير المرغوب فيها بواسطة الصفات السائدة العادلة، لذلك يكون ظهور الأمراض والاختلالات الوراثية نادراً.


### فقرة اثرانية

#### العلم والمجتمع والتكنولوجيا

##### الاستشارات الوراثية

دعت الحاجة إلى وجود مراكز للاستشارات الوراثية حيث يقدّم الاستشاريون الإرشاد لراغبي الزواج، وللأزواج الذين يعلمون بوجود بعض الاختلالات الوراثية لدى بعض أفراد عائلاتهم ويخشون ظهورها في نسلهم. فيتسبّع هؤلاء الاستشاريون التاريخ الوراثي لعائلتي الزوجين من خلال إعداد سجلّ النسب للزوجين لتحديد ما إذا كان أحدهما (أو كلاهما) حاملاً لأليلات المرض أو الخلل الوراثي.


يستخدم الاستشاريون أيضاً التقنيات الجزيئية الحديثة لتحديد الجينات غير الطبيعية التي ينتج عنها الخلل الوراثي، مثل إجراء اختبار لقياس كمية بروتين معين في جسم الأم أثناء المراحل المبكرة من الحمل، للكشف عن وجود كروموزوم زائد في الجنين (متلازمة داون) يؤدي للتخلّف العقلي والموت المبكر. وهناك اختبار يُجري لحدّيّة الولادة لتحديد خلل وراثي يُسمّى مرض الفينيل كيتونيوريا، ينتج عن وجود جين متّنّح يُسبّب عدم تكوين إنزيم يُكسّر حمض الفينيل لأنين الموجود في الحليب. ومن دون هذا الإنزيم، يتراكم هذا الحمض الأميني في الجسم ويدمر الخلايا العصبية مؤدياً للوفاة. ويمكن علاج هذا المرض إذا اكتشف مبكراً.



سجل النسب لمرضى الفينيل كيتونيوريا. يُضمّن المستشار الوراثي سجل النسب لتوسيع الآباء لخطر توريث أليل المرض للأبناء. أيّ فرد/أفراد السجل الوراثي مصاب/مصابين بهذا المرض؟

## مراجعة الدرس 3-1

- ما الذي يوضّحه سجل النسب الوراثي؟
- صف تأثير الأليلات المتنحية والسايدة في الإنسان؟
- سؤال لتفكير الناقد: ما الخطوات التي يمكن أن يتبعها الآباء لتحديد ما إذا كانت جينات معينة ستورث لأبنائهم؟ ذكر مثالاً واحداً.
- أضف إلى معلوماتك: افترض أن أبوين يحملان خللاً وراثياً مت喧ّ. أرسم مخططاً يوضح جميع التزاوجات الممكنة لأمساجهم بعد الانقسام الميوزي.
- إن صفة أيمن أو أيسر تقع على الكروموسوم الجسمي. الجينية المسؤولة عن هذه الصفة لها أليلان: أليل الصفة أيمن (R) سائدة على أليل الصفة أيسر (l). يوضح سجل النسب أدناه عائلة بعض أفرادها أيسريون.



- حدّد التركيب الجيني للزوجين 1 و 2. علل إجابتكم.
  - حدّد التراكيب الجينية للزوجين 7 و 8 ولأولادهم 11، 12، 13. علل إجابتكم لكلاً ترکيب جيني.
  - هل يمكن للمرأة 11 أن تُنجب طفلاً أيسر؟ علل إجابتكم.
- تزوج رجل (A) مصاب بعمى الألوان بأمرأة (B) ترى الألوان بشكل طبيعي أنجباً أربعة أولاد: صبيّ وبنّة مصابين بعمى الألوان، وصبيّ وبنّة (C) رؤيتهمما طبيعية. تزوجت الإبنة (C) برجل (D) طبيعي وأنجباً أربعة أولاد: بنّة وصبيّين طبيعيين وصبيّاً مصاباً بعمى الألوان. الجين المسؤول عن عمي الألوان هو جين مت喧ّ ويقع على الكروموسوم الجنسي X.
    - أرسم سجل النسب لهذه العائلة محدداً باللون الأسود الأفراد المصابين بعمى الألوان.
    - حدّد التركيب الجيني للزوج A.
    - حدّد التركيب الجيني للزوجة B وULL الإجابة.
    - حدّد التركيب الجيني للإبنة C وزوجها D.
    - لَمْ ينجب الزوجان C و D إبنة مصابة بعمى الألوان. ملاحظة استعمل الرموز التالية (N) لرؤية الألوان و (n) لعمى الألوان.

## ارتباط الجينات (الارتباط والعبور)

### Linked Genes (Linkage and Crossing Over)

#### الأهداف العامة

- \* يُحدّد العلاقة بين الجينات والصفات الوراثية والكروموسومات وحمض النووي DNA.
- \* ينَعَّرف مفهوم الارتباط كنمط وراثي.
- \* يُفَسِّر ما ينَتَج عن العبور من ارتباطات جينية جديدة.



(شكل 93)


تعتبر طريقة التربية والتهجين أحد الأساليب العلمية التي يتبعها العلماء لكشف الظواهر الوراثية وتفسيرها من أجل تحسين الإنتاج. فقام العلماء ب التربية وتهجين سلالة نوع من الأسماك القصيرة والنحيلة وصغيرة الفم مع سلالة أخرى من النوع نفسه، إنما طويلة وممتلئة ومتيسعة الفم. وعلى عكس ما هو متوقع، جاءت الأسماك إنما قصيرة ونحيلة وصغيرة الفم، أو طويلة وممتلئة ومتيسعة الفم. فقرر العلماء أن هذه الصفات تورث مرتبطة بعضها بعض (شكل 93).

#### Linkage

#### 1. الارتباط

كيف يكون للكائنات المئات من الصفات الوراثية، على الرغم من عدم وجود مئات الكروموسومات في خلاياها؟ لإنجاحه عن هذا السؤال، افترض العلماء أنه لا بد من أن يحمل الكروموسوم الواحد العديد من الجينات المختلفة التي تُظهر مختلف الصفات. وتوحد علاقة بين كل من الحمض النووي DNA والجينات والكروموسومات. فالDNA يتراكب من لولب مزدوج من شريطتين، يتكون كل واحد منها من وحدات تعرف بالنيوكليوتيدات.

والجين عبارة عن تتابع معين لمجموعة من هذه النيوكليوتيات في أحد شريطي الـ DNA. ويلتف الـ DNA حول نفسه ويتكثّس في شكل مكثّف للغاية مكثّفًا الكروموسوم (شكل 94).



(٩٤) شكل تركيب الكروموسوم ما العلاقة بين الكروموسومات والـ DNA؟

تعلمت أيضًا أن الكروموسومات توجد في أزواج متشابهة في الخلايا، وبالتالي توزع الجينات الموجودة على الكروموسومات المزدوجة توزيعًا مستقلًا على الأمشاج، لذلك تظهر صفات الناتج بالنسبة التي فسرها مندل. لكن ماذا يحدث للجينات إذا كانت موجودة على كروموسوم واحد؟ هل تسلك السلوك نفسه إذا كانت الجينات نفسها موجودة على أكثر من كروموسوم واحد؟

أنت تعرف أنّ العالم ساتون وضع النظرية الكروموسومية في الوراثة، والتي تنصّ على أنه «يتمّ انتقال الصفات من جيل إلى آخر بواسطة الجينات الموجودة على الكروموسومات». وقد ساعدت هذه النظرية عالمي الوراثة باتسون وبانت في الخروج من مأزق كانوا قد وقعا فيه أثناء إجراء إحدى التجارب على نباتات البازلاء السكرية (شكل 95). يسود في هذه النباتات أليل اللون البنفسجي للأذهار (P) على أليل اللون الأحمر (M)، ويسود أيضًا أليل شكل حبوب اللقاح الطويل (L) على أليل شكلها المستدير (l).


قام العالمان بالتلقيح الخلطي لباتات جيل الآباء النقية  $PP\text{--}LL$  و جاءت نتائج الجيل الأول، كما كان متوقعاً، هجينية لصفتي اللون البنفسجي للأذهار والشكل الطويل لحوب اللقاح  $(Pp\text{--}Ll)$ .

1. في جيل الآباء، تم إجراء التلقيح الخلطي لنباتات نقية ذات أزهار بنفسجية وحبوب لقاح طويلة (PP LL) مع نباتات نقية ذات أزهار حمراء وحبوب لقاح مستديرة (ll mm).



الجيل الأول

2. جاءت جميع نباتات الجيل الأول ذات أزهار بنفسجية وحبوب لقاح طويلة كما تم التوقع به طبقاً لقوانين مندل. أي من هذه الصفات سائدة؟



الجيل الثاني

3. عندما تلاقيحت نباتات الجيل الأول ذاتياً، لم تُنتج النسبة 9 : 3 : 1. بين نباتات الجيل الثاني، ونتج عدد أكبر من المتوقع كان له التركيب الظاهري نفسه لجيل الآباء (وبنسبة 75% بنفسجي طويل، 25% أحمر مستدير)

الأعداد المتوقعة بحسب قانون التوزيع المستقل	الأعداد التي حصل عليها	التركيب الظاهري
216	284	بنفسجي، طويل
71	21	بنفسجي، مستدير
71	21	أحمر، طويل
24	55	أحمر، مستدير


4. افترض باتسون وبانت أن صفتني لون الأزهار وشكل حبوب اللقاح مرتبطة على الكروموسوم نفسه.لاحظ أن التركيبين الظاهريين «بنفسجي مستدير» و«أحمر طويل» لا يظهران في مربع بانت.

مربع بانت للمجينا المرتبطة	μ l %50	PL %50	PL %50
بنفسجي، طويل Pℓ Lℓ %25	بنفسجي، طويل PP LL %25	بنفسجي، طوي Pℓ Lℓ %25	μ l %50
أحمر، مستدير mm ll %25			


(شكل 95)

تجربة باتسون وبانت درس العالمان وراثة صفتين في نبات البازلاء: لون الأزهار وشكل حبوب اللقاح. ما الفرض الذي افترضاه؟

ترك العالمان نباتات الجيل الأول تتلاقيح ذاتياً مع توقع أن يحدث توزيع لصفتي لون الأزهار وشكل حبوب اللقاح بشكل مستقل كل عن الآخر، بحسب قانون مندل للتوزيع المستقل الذي ينص على وجود أربعة تركيب ظاهري ممكنة كنتيجة للتهجين الثنائي بنسبة 9 : 3 : 1. لكن النتائج التي حصلوا عليها جاءت مختلفة عن النسبة المتوقعة. فالتركيبان الظاهريان لجيل الآباء (الأزهار بنفسجية مع حبوب اللقاح الطويلة، والأزهار الحمراء مع حبوب اللقاح المستديرة) ظهرا أكثر من المتوقع. بتعبير آخر، كانت معظم نباتات الجيل الثاني بعضها يُشبه تماماً أحد الأبوين وبعضها يُشبه الأب الآخر، وقد ظهرت في القليل منها ارتباطات جديدة للصفات. هل تعني هذه النتائج أن قانون مندل غير صحيح؟



(شكل 96)  
ذكر وأنثى ذبابة الدروسو فيلا  
كيف تميّز بينهما؟



(شكل 97)  
الكروموسومات الشمانية في خلايا ذبابة  
الدروسو فيلا

واشتبه العالمان في أن هناك اتصال أو ارتباط بين جينات الصفتين، وأنهما قد بقيا معًا أثناء الانقسام الميوزي. ولكنهما لم يكن لديهما فكرة عن سبب هذا الارتباط بين الصفات.

وفي العام 1910، أجرى عالم الوراثة الأمريكي مورجان تجربة مشابهة لتجربة باتسون وبانت استخدم فيها حشرة ذبابة الفاكهة (الدروسو فيلا) بدلًا من نباتات البازلاء السكرية. وقد اتّخذ مورجان من الدروسو فيلا مثالًا على دراسة توارث الصفات، وذلك لسهولة شرط توريتها وسرعة تكاثرها، فهي تستطيع وضع 100 ذبابة خلال 15 يومًا. كما أنه يسهل التمييز بين الذكر والأثني من خلال شكل الجسم (شكل 96). وليس لتلك الذبابة سوى 4 أزواج من الكروموسومات الكبيرة التي يمكن رؤيتها بسهولة في المجهر العادي كما هو موضح في الشكل (97). وتوصّل مورجان إلى أن صفتين لون الجسم وشكل الأجنحة لا تتوزّع مستقلة بعضها عن بعض، وافتراض لتفسير هذه النتائج أن «جينات هاتين الصفتين تقع على الكروموسوم نفسه». وأصبح افتراضه أحد فروض النظرية الكروموسومية في الوراثة، إن وراثة الصفات مرتبطة بعضها ببعض وتقع على الكروموسوم نفسه تسمى الارتباط **Linkage**. وتُعرف حاليًا الجينات الموجودة على الكروموسوم نفسه بالجينات المرتبطة **Linked Genes**.

كان مندل محظوظًا لأنّ الصفات التي درسها في نبات البازلاء كانت تتوزّع توزيعًا مستقلًا، حيث كان جين كلّ صفة محمولاً على كروموسوم مستقل. ولو صادفه ارتباط بين تلك الجينات لاختلّت النسب التي حصل عليها ولتعدّر عليه تفسيرها. وأوضحت تجارب باتسون وبانت ومورجان أنّ الصفات يمكن أن تورث مع بعضها كمجموعة واحدة نتيجة وجود الجينات المرتبطة.

وبالتالي أصبحت النظرية الكروموسومية في الوراثة تفترض ما يلي: «تحمل الكروموسومات العديد من الجينات. وكلّما كانت الجينات الخاصة بصفتين مختلفتين قريبة بعضها من بعض، فإنّها تنتقل مع بعضها إلى المشيّج نفسه. ونتيجة ذلك، تميل الجينات المرتبطة إلى أن تورث مع بعضها كصفة واحدة» وهذا ما يُسمى بالارتباط التام **Absolute Linkage**.

لكن هل يمكن تفسير نتائج تجربة باتسون وبانت باستخدام مفهوم الارتباط التام؟ إذا كانت جينات لون الأزهار وشكل حبوب اللقاح مرتبطة، فإنّ الجيل الأول يجب أن يُنتج نوعين فقط من الأمشاج (PL و L<sup>m</sup>) بدلًا من أربعة يحسب قانون التوزيع المستقل لمندل (PL<sup>m</sup>, PL<sup>m</sup>, L<sup>m</sup>, L<sup>m</sup>)، وبالتالي تكون لنباتات الجيل الثاني التركيب الظاهري نفسه لجيل الآباء فقط.

## فقرة إثرائية

### علم الأحياء في حياتنا اليومية

الإنسان أصله إنسان!

إنكشفت الخصائص البشرية

بالإنتهاء من مشروع الجينوم


البشري (خريطة جينات الإنسان

وخصائصها). وثبت أنّ ما جعلنا

بشرًا ومن أصل بشري هو اختلاف

قدره 1% بين جينوم البشر وجينوم

الشمبانزي (أرقى سلالات القرود).



(شكل 98)

تبادل القطع المجاورة من الكروماتيدات الداخلية للرّباعي بعضها مع بعض، أي تحدث عملية عبور.

لكن لاحظ العالمن أنّ بعضًا من نباتات الجيل الثاني له تراكيب ظاهرية لم تكن موجودة لدى الآباء: أزهار بنفسجية ذات حبوب لقادح مستديرة وأزهار حمراء ذات حبوب لقادح طويلة (شكل 95). وبسبب وجود الارتباط بين الجينات، لا يمكن تفسير مثل هذه الارتباطات بين الصفات وفقًا لقانون التوزيع المستقل. وقد افترض العالم مورجان ضرورة وجود سبب آخر للتراتيب الظاهرية الجديدة وهو ما يُسمى بالإرتباط الجزئي سبب آخر للتراتيب الظاهرية الجديدة وهو ما يُسمى بالإرتباط الجزئي ويتبعه عملية العبور. Partial Linkage

## Crossing over

يستخرج مورجان من تجربته على ذباب الفاكهة أنّ جينات صفتى لون الجسم وشكل الجناح تُورّث مترتبة ولا تتوّزع مستقلة، وذلك لحصوله على بعض الحشرات ذات ارتباط في هاتين الصفتين ومتختلفة عن التراكيب الظاهرية للآباء. ولم يستطع تفسير هذه الارتباطات بواسطة قانون التوزيع المستقل لمندل.

وقد افترض مورجان لتفسير ذلك أنّ هذا الارتباط الجديد للصفات كان نتيجة التغيير في موضع الأليلات، وأنّ هذا التغيير يحدث أثناء الانقسام الميوزي، كما في الشكل (98).

وقد سبق أن تعلّمت انتظام الكروموسومات المتماثلة في أزواج أثناء الطور التمهيدي الأول من الانقسام الميوزي. يظهر كل زوج منها مكوّنًا من أربع كروماتيدات في ما يُعرف «بالرباعي»، ويعقب ذلك عملية تُعرف بالعبور Crossing Over حيث يحدث ارتباط الأليلات الموجودة على الكروماتيدات الداخلية المجاورة للرّباعي، يعقبه كسر هذه الكروماتيدات وانفصالها بعد تبادل المادة الوراثية (الأليلات) بينها في موقع محددة تسمى بموقع الكيازما (موقع العبور).

ففي تجربة باتسون وبانت، حدث العبور أثناء الانقسام الميوزي في نباتات الجيل الأول، وبالتالي حدث ارتباط جديد للأليلات لون الأزهار وشكل حبوب اللقادح، فتتجه أمشاج  $P_1$  و  $L_1$  بالإضافة إلى أمشاج  $PL$  و  $LP$ . لذلك، ظهرت نباتات تحمل صفات لم تكن موجودة لدى الآباء، وهي أزهار بنفسجية ذات حبوب لقادح مستديرة وأزهار حمراء ذات حبوب لقادح طويلة.

## مراجعة الدرس 4-1


1. ما العلاقة بين الحمض النووي DNA والجينات والكروموسومات؟
2. سؤال للتفكير الناقد: كيف دعمت تجربة باتسون وبانت ، على نباتات البازلاء السكرية ، النظرية الكروموسومية في الوراثة؟
3. أضف إلى معلوماتك: أعد صياغة قانون التوزيع المستقل مضمّناً إياه معلوماتك عن الجينات المرتبطة .
4. لنفترض وجود هجينين من الجيل الأول ( $F_1$ ) ، تركيبيه الجيني  $AaBb$  ، ولنأخذ بالاعتبار أنّ الجينات تقع على كروموسومات جسمية . قُمْ بتمثيل التركيب الجيني والأمّشاج على الكروموسومات المتماثلة ، وحدّد النسب المئوية للأمّشاج من كلّ من الحالات التالية:
  - (أ) الجينات غير مرتبطة .
  - (ب) الجينات مرتبطة ارتباطاً تاماً .

## الوراثة والجنس

### Heredity and Sex

#### الأهداف العامة

- \* يُفسّر دور الوراثة في تحديد الجنس.
- \* يُميّز بين الكروموسومات الذاتية والكروموسومات الجنسية.
- \* يتعرّف بعض الصفات الوراثية المرتّبة والمحدّدة والمتّأثرة بالجنس ويُقارن بينها.




(شكل 99)

إذا استطعتَ التمييز بين النقاط الملوّنة في الشكل (99)، قد تتمكن من قراءة رقم الأشخاص الذين لا يرون هذا الرقم قد يكونون مصابين بعمى اللونين الأحمر والأخضر. هذه الصفة الوراثية الشائعة وصفات أخرى غيرها ، ستتعرّفها خلال هذا الدرس ، ذات نمط وراثي فريد وخاص.

#### 1. كروموسومات الإنسان

تحتوي الخلايا الجسمية للإنسان على 23 زوجاً من الكروموسومات (46 كروموسوماً)، منها 22 زوجاً (44) تُسمى الكروموسومات الذاتية أو الجسمية، و الزوج واحد يُسمى الكروموسومان الجنسيان. الكروموسومات الذاتية (الجسمية) *Autosomes* تظهر في أزواج ذات الشكل نفسه ولكنّها تختلف عن الأزواج الأخرى في الخلية الجسمية. والكروموسومان الجنسيان *Sex Chromosomes* هما اللذان يحدّدان ما إذا كان الأفراد ذكوراً أو إناثاً، وهما مختلفان ويُرمز إليهما بالحرفين X و Y. ويعتبر الكروموسوم Y في الثدييات ، ومنها الإنسان ، المحدّد الأساسي للجنس. فإذا كان الكروموسوم Y موجوداً كان الفرد ذكراً (XY) ، وإذا كان غائباً كان الفرد أنثى (XX). ولأنّ خلايا الإناث تحتوي على كروموسومين جنسيين (XX) ، فجميع البيض الناتج عن الانقسام الميوزي يحتوي على كروموسوم واحد من النوع X (X + 22).

أما في الذكور (XY)، فنصف الحيوانات المنوية الناتجة عن الانقسام الميوزي يحتوي على الكروموسوم الجنسي Y (Y + 22)، ونصفها الآخر يحتوي على الكروموسوم الجنسي X (X + 22) (X + 22). أي مشيحي ذكر الإنسان يُحدّد نوع الجنس في الأبناء؟ (الشكل 100).



(شكل 100)

يُحدّد الكروموسومان X وY الجنس في الإنسان.  
ما النسبة المئوية في أن تكون المواليد إناثاً؟

جيل الأباء



الجيل الأول



جميع الذكور والإثاث حمر العينين

الجيل الثاني



(شكل 101)

دش مورجان لدى اكتشافه أنَّ جميع أفراد الذباب البيض العينين ذكور. لماذا توقع مورجان نسبة 1 : 3 للعينين الحمراوين إلى العينين البيضاوين في الجيل الثاني؟

## Sex-linked Traits

الكروموسومان X وY غير متماثلين. تُعرف الجينات المحمولة على الكروموسومين X وY بالجينات المرتبطة بالجنس **Sex-linked Genes**، ويطلق على الصفات التي تتحكم فيها الجينات المرتبطة بالجنس اسم الصفات المرتبطة بالجنس **Sex-linked Traits**.

## Morgan's Experiments

## 1.2. خارب مورجان

يعتبر العالم مورجان أول من درس الجينات المرتبطة بالجنس في العام 1910، حين كان يجري أبحاثه على توارث صفة لون العينين في حشرة ذبابة الفاكهة (الدروسو菲لا). فقد لاحظ وجود ذبابة ذكر ذات عينين بيضاوين بدلًا من العينين الحمراوين العاديتين لدى هذا الذباب.

فقام بتهجين ذبابة أنثى حمراء العينين مع ذكر أبيض العينين، فجاء جميع أفراد الجيل الأول حمر العينين، ما يعني سيادة صفة لون العينين الحمراوين على صفة لون العينين البيضاوين. ثم هجّن مورجان ذكور الجيل الأول مع إناثه متوقّعاً بحصوله على نسبة 3 : 1 للعينين الحمراوين إلى العينين البيضاوين في أفراد الجيل الثاني. وكما توقع مورجان، تحقّقت هذه النسبة، ولكن كانت مفاجأة له أنَّ جاء جميع أفراد الذباب بيض العينين ذكوراً (شكل 101).

وافرض مورجان لتفسير ظهور الذكور ببعض العينين في الجيل الثاني أنَّ أليل لون العين الأبيض متَّسق (r) وأليل لون العين الأحمر هو سائد (R)، وأنَّ جين لون العيون محمول على الكروموسوم الجنسي X، في حين لا يحمل الكروموسوم Y أي جين للون العين، ويُعَدُّ هذا كافياً لتُصبح الذكور ببعض العينين. أمَّا في الإناث (XX)، فإنَّ أليل اللون الأحمر السائد الموجود على أحد كروموسومي X يحجب تأثير الأليل المُمتَسِّق المحمول على الكروموسوم الجنسي X الآخر. وبذلك تكون عيون الإناث حمراء، ولا تُظهر عيون الإناث ببيضاء إلَّا إذا كان كلاً الكروموسومين X حاملين لجين اللون الأبيض (المُمتَسِّق).

وأختبر مورجان صحة فرضه بتهجين ذكور ببعض العينين مع إناث هجينية حمراء العينين (من الجيل الأول)، فجاء نصف الإناث ببيضاء العينين. وبإثبات صحة هذا الفرض، يُصبح مورجان أول من أثبت وجود الجينات على الكروموسومات، وبالتالي تمَّ التأكُّد من صحة النظرية الكروموسومية في الوراثة.

## 2.2 الصفات المرتَبطة بالجنس في الإنسان

### Sex Linked Traits In Humans

اكتُشِفَ الكثير من الجينات المرتَبطة بالجنس خلال السنوات التالية لتجارب مورجان، نذكر منها ما يلي:

#### (أ) مرض عمي الألوان

مرض عمي الألوان هو صفة مرتَبطة بالجنس في الإنسان، حيث لا يُمْكِن التمييز بين الألوان، بخاصة اللونين الأحمر والأخضر. ويُسَبِّبُ في هذا المرض الأليل المُمتَسِّق المرتَب بالكروموسوم الجنسي X ويرمز له بالحرف  $X^c$ ، أمَّا أليل الرؤية الطبيعية للألوان فيُرْمزُ له بالحرف  $X^C$  وهو السائد. وبذلك يكون التركيب الجيني للذكر المصاب بعمى الألوان  $X^cY$ ، والتركيب الجيني للأنثى المصابة بهذا المرض  $X^cX^c$  (متشابهة اللاقحة). أمَّا المرأة التي تحمل التركيب الجيني  $X^cX^c$  (متباينة اللاقحة) فهي طبيعية وإن كانت حاملة لجين مرض عمي الألوان. ما التركيب الجيني لأمَّ الولد المصاب بعمى الألوان؟

#### (ب) الهيموفilia (نرف الدم)

الهيموفilia هو خلل وراثي مرتَب بالكروموسوم الجنسي X، حيث لا يتجلَّطُ الدم كالمعتاد ويستمرُ نرفُ الدم حتى في الجروح البسيطة. ويُسَبِّبُ هذا الجين المُمتَسِّق بعدم تكوُّن المادَّة الكيميائية المسؤولة عن التجلَّط الطبيعي للدم.

ولأنَّ الذكور (XY) يستقبلون كروموسوم X من أمَّهاتهم، فإنَّهم يرثُون عمي الألوان والهيموفilia وغيرهما من الصفات المرتَبطة بالكروموسوم الجنسي X من أمَّهاتهم.



(شكل 102)

لاحظ أنَّ الصورة اليسرى للذكر ، أمَّا الصورة اليمينى فللأنثى. ما الصفات المحددة بالجنس التي يمكنك اكتشافها في هذين الطائرين؟



(شكل 103)

الصفات المتأثرة بالجنس ، مثل صفة الصلع ، تظهر بدرجات متفاوتة في الجنسين . هل أليل صفة الصلع سائد أم متَّح في الشخص في الصورة؟

أمَّا الإناث (XX) اللواتي تظهر عليهن الصفات المرتبطة بالكروموسوم الجنسي X ، فيرثنها من كلى الوالدين حيث يستقبلن كروموسوم X من كلى والد .

وتبيَّن أنَّ مرضي عمي الألوان والهيماوفيليا لا يظهران بالدرجة أو الشدة نفسها عند جميع الأفراد المصابين ، ما يدلُّ على تداخل عدد من الجينات المختلفة ، يقع معظمها على موقع مختلف من الكروموسوم الجنسي X .

### 3. الصفات المحددة بالجنس والصفات المتأثرة بالجنس

#### Sex-Limited Traits and Sex Influenced Traits

##### 1.3 الصفات المحددة بالجنس

الصفات المحددة بالجنس هي الصفات التي لا تظهر إلَّا بوجود الهرمونات الجنسية وفي أحد الجنسين أو الآخر فحسب . ومثل معظم الصفات الجسمية ، تتحكم بهذه الصفات جينات تقع على الكروموسومات الذاتية (الجسمية) وليس على الكروموسومات الجنسية . وعلى الرغم من أنَّ جينات هذه الصفات موجودة في كلى من الذكور والإإناث ، إلَّا أنها لا تظهر إلَّا في جنس واحد منها فقط .

ولكي تظهر الصفة المحددة بالجنس ، لا بدَّ من وجود الهرمون الجنسي المناسب في الجسم . ولأنَّ الهرمونات الجنسية لا تُنتَج بكميات كبيرة إلَّا عندما يبلغ الفرد ، فإنَّ معظم هذه الصفات لا تظهر في الأطفال .

وتفتقرُ الصفات المحددة بالجنس الكثير من الاختلافات بين الجنسين . فعلى سبيل المثال ، غالباً ما تكون ألوان ذكور الطيور كثيرة وأكثر زهوةً من ألوان الإناث (شكل 102) . لكن ما فائدة ذلك؟ ومن أمثلة هذه

الصفات في الإنسان ظهور اللحية ونموها في الذكور وإنتاج الحليب في الإناث .

##### 2.3 الصفات المتأثرة بالجنس

الصفات المتأثرة بالجنس هي الصفات التي توجَّد جيناتها على الكروموسومات الذاتية وتتأثَّر بالهرمونات الجنسية ، وهي تظهر في الجنسين ولكن بدرجات متفاوتة . فمثلاً أليلات صفة الصلع (B) في الإنسان متَّأثرة بالجنس ، فأليل الصلع يكون سائداً في حالة وجود الهرمونات الجنسية الذكرية (شكل 103) ، ويكون متَّح في حالة وجود الهرمونات الجنسية الأنثوية . لذلك لا يسقط شعر الأنثى تماماً ولكن تقل كثافته إذا كان لديها جينان لصفة الصلع (BB) . يوضح الجدول (2) التراكيب الجينية والظاهرية لصفة الصلع بحسب الجنس .

الجنس	التركيب الجنسي	التركيب الظاهري
ذكر	BB	أصلع
	Bb	أصلع
	bb	عادي الشعر
أنثى	BB	خفيفة الشعر
	Bb	عادية الشعر
	bb	عادية الشعر

(جدول 2)

التركيب الجينية والظاهرية لصفة الصلع  
بحسب الجنس

تزوج رجل مصاب بعمى الألوان بامرأة سلية ولكن حاملة لهذا الخلل الوراثي وهو مرض يسببه أليل متنح مرتبط بالكروموسوم الجنسي X.

(أ) حدد التراكيب الجينية للأم والأب.

(ب) حدد النسب المئوية لتراتيب أولادهما الظاهرية والجينية المحتملة.

طريقة التفكير في الحل

1. حلّ: اذكر المعلوم وغير المعلوم.

المعلوم:

(أ) تركيب الأب الظاهري (مصاب بعمى الألوان)

(ب) تركيب الأم الظاهري (سلية حاملة للخلل الوراثي)

(ج) أليل المرض متنح ومرتبط بالكروموسوم الجنسي X

غير المعلوم:

(أ) التركيب الجيني للأب وللأم

(ب) النسب المئوية لتراتيب أولادهم الظاهرية والجينية المحتملة.

2. حلّ غير المعلوم:

(أ) التركيب الجيني للأب: الأب مصاب بعمى الألوان أي يحمل أليل المرض وبالتالي يكون تركيبه الجيني:  $X^cY$

التركيب الجيني للأم: الأم ذات تركيب ظاهري سليم ولكنها حاملة للخلل الوراثي أي تحمل في آن معاً الأليل السليم  $X^c$  وأليل المرض  $X^c$  وبالتالي تركيبها الجيني  $X^cX^c$

(ب) لحساب النسب المئوية لتراتيب الظاهرية والجينية المحتملة للأولاد يستخدم مربع بانت الذي يوضح النتائج المتوقعة.

الأم	$\times$	الأب	التركيب الجيني للوالدين	الأمشاج
$X^cX^c$		$X^cY$		
$X^c$		$X^c$		
%50		%50		

النسب المئوية لتراتيب الظاهرية والجينية:  
 25% أنسى سلية ولكن حاملة للخلل الوراثي  $X^cX^c$   
 25% أنسى مصابة بعمى الألوان  $X^cX^c$   
 25% رجل سليم  $X^cY$   
 25% رجل مصاب بعمى الألوان  $Y$

Y %50	$X^c$ %50	♂
$X^cY$	$X^cX^c$	$X^c$ %50
$X^cY$	$X^cX^c$	$X^c$ %50

3. قيم: هل النتيجة لها معنى؟

تمكننا من إستنتاج النسب المئوية لتراتيب الأولاد الظاهرية والجينية المحتملة اعتماداً على ارتباط مرض عمي الألوان بالكروموسوم الجنسي X وعلى كونه ناتج من أليل متنح.

## مثال (2)

تزوّج رجل أصلع بامرأة خفيفة الشعر.

(أ) حدد التراكيب الجينية للأم والأب.

(ب) حدد النسب المئوية لtrakib أولادهما (الأبناء) الظاهريّة المحتملة.

طريقة التفكير في الحل

1. حلّ: اذكر المعلوم وغير المعلوم.

المعلوم:

(أ) تركيب الأم الظاهري (خفيفة الشعر)

(ب) تركيب الأب الظاهري (أصلع)

غير المعلوم:

(أ) التركيب الجيني للأب ولأم

(ب) النسب المئوية لtrakib أولادهم الظاهريّة المحتملة.

2. حلّ غير المعلوم:

(أ) هناك أليلان للجين المسؤول عن الصلع (B) و(b). وأليل الصلع (B) سائد عند الرجال ومتّنّح عند النساء والأليل (b) السليم سائد عند النساء ومتّنّح عند الرجال أي أن التركيب الجيني للأم لا يمكن أن يكون سوى (BB) لظهور تلك الصفة في حين أن التركيب الجيني للأب قد يكون متّنّح اللاقحة أي (BB) أو متبادر التركيب (Bb)

(ب) إذا كان التركيب الجيني للأب متّنّح متّنّح اللاقحة.

B	B	♂
BB	BB	B
BB	BB	B

تحليل الجدول:

100% ذكور صلع 100% إناث خفيفات الشعر

أما إذا كان التركيب الجيني للأب متبادر اللاقحة:

b	B	♂
Bb	BB	B
Bb	BB	B

تحليل الجدول:

لدى الإناث: 50% مصابات بالصلع (خفيفات الشعر) (BB) 50% سليمات (عاديات الشعر) (Bb)

لدى الذكور: 100% مصابون بالصلع (Bb) أو (BB)


3. قيم: هل النتيجة لها معنى؟

تمكّنا من تعرّف التراكيب الظاهريّة للأولاد (الأبناء) اعتماداً على مبدأ سيادة أليل الصلع (B) عند الرجال وتنحّيه عند النساء.

## مراجعة الدرس 5-1

- ما الفرق بين الكروموسومات الجسمية (الذاتية) والكروموسومات الجنسية؟
- ما الفرق بين الصفات المرتبطة بالجنس والصفات المحددة بالجنس والصفات المتأثرة بالجنس؟
- سؤال للفكير الناقد: ما النتائج التي تتوّقعها من تهجين ذباب فاكهة إناث عيونها بيضاء اللون مع ذكور عيونها بيضاء؟ استخدم مربع بانت.
- أضف إلى معلوماتك: كيف يمكنك تقييم قانون السيادة لمندل ليتوافق مع الصفات المرتبطة بالجنس؟
- اكتب التراكيب الجينية لكل من الأفراد التالية:  
 ذكر طبيعي غير مصاب بالهيوموفيليا.  
 ذكر مصاب بالهيوموفيليا.  
 أنثى طبيعية غير مصابة بالهيوموفيليا.  
 أنثى طبيعية حاملة للمرض.  
 أنثى مصابة بمرض الهيوموفيليا.
- عمي الألوان هو خلل في رؤية الألوان يعود إلى جين متّوّضع على الكروموسوم الجنسي X. يمثّل سجل النسب أدناه، عائلة بعض أفرادها مصابون بعمي الألوان.  
 (أ) هل الجين المسؤول عن عمي الألوان سائد أم متّوّض؟ علّل إجابتك.  
 (ب) حدّد التراكيب الجينية للأفراد 2، III-1، II-2، III-1، II-1. علّل كل إجابة.  
 (ج) تنتظر المرأة 2-III مولوداً ولكنها قلقة حيال إصابته بعمي الألوان. هل هناك احتمال لإصابة هذا الطفل بعمي الألوان؟ أوضح ذلك مستعيناً بمربع بانت.

مفتاح	
أنثى	ذكر
طبيعية	طبيعي
مصاب بعمي الألوان	مصاب بعمي الألوان



## مراجعة الدرس 1-5 (تابع)

7. تزوج رجل وامرأة سليمان وأنجبا ولدًا مصابًا بمرض وراثي يُسمى الهيموفيليا (نزعة وراثية للنزف الدموي). الجين المسؤول عن هذا المرض متعدد (n) بالنسبة إلى الجين الطبيعي (N) ويحمله الكروموسوم الجنسي X.

(أ) ما هو التركيب الجيني لكل من الأبوين؟

(ب) أعط تحليلًا جينيًا مستعينًا بمرربع بانت.

(ج) حدد جنس الولد المريض.

(د) لماذا لا يمكن أن تصاب الإناث بهذا المرض؟

8. يمثل سجل النسب أدناه عائلة بعض أفرادها مصابون بمرض الهيموفيليا. يلاحظ ظهور هذا المرض عند الذكور فقط. ويؤدي وجود الجين المسؤول عنه بنسختين في التركيب الجيني إلى موت الجنين.

(أ) هل الأليل المسؤول عن هذا المرض سائد أم متعدد؟ علل إجابتكم.

(ب) هل هذا الجين مرتبط بالجنس؟ علل إجابتكم.


(ج) حدد التراكيب الجينية للأفراد: 8 ، 13 و 14 و علل كل إجابة.

(د) اجر التحليل الضروري لتحديد نسب احتمال إصابة نسل الأنثى 5 في الحالتين التاليتين:

\* إذا لم يكن زوجها مصابًا بالمرض.

\* إذا كان زوجها مصابًا بالمرض.

مفتاح	
أنثى	ذكر
طبيعية	طبيعي
مصابة بالهيموفيليا	مصاب بالهيموفيليا



9. هناك أليلان للجين المسؤول عن الصلع (B) و (b). يعتبر أليل الصلع (B) سائداً عند الرجال ومتعددًا عند النساء. ويعتبر أليل (b) السليم سائداً عند النساء ومتعددًا عند الرجال.

يسبب أليل واحد من أليل الصلع (B) بظهور الصلع عند وجود المستوى الطبيعي لهرمون التستوستيرون (هرمون ذكري) عند الرجال البالغين أي امتلاكهم التراكيب الجينية التالية: (Bb) أو (BB)، بينما، يجب عند النساء، أن ترثن أليلين من أليل الصلع (B) أي أن تمتلكن التركيب الجيني (BB). إنطلاقاً من المعطى أعلاه:

(أ) ماذا يعني بالقول إن خاصية الصلع متأثرة بالجنس؟

(ب) صنع فرضية تفسّر سبب سيادة أليل الصلع عند الذكور.

(ج) لدى والدان ليسا أصلعين، ابن أصيب بالصلع عند عمر الثلاثين. إذا كان لهذين الوالدين ابنة، حدد نسبة احتمال إصابتها بالصلع.

## مراجعة الوحدة الثانية

### المفاهيم

Allele	الأليل	Linkage	الارتباط
Recessive Allele	الأليل المتنحّى	Dominant Allele	الأليل السائد
Monohybrid Cross	التهجين الأحادي	Test Cross	التلقيح الاختباري
Gene	الجين	Dihybrid Cross	التهجين الثنائي
Sex Linked Genes	الجينات المرتبطة بالجنس	Linked Genes	الجينات المرتبطة
Pedigree	سجل النسب	Carrier	حامل الصفة
Codominance	السيادة المشتركة	Incomplete Dominance	السيادة غير التامة
Sex Influenced Traits	الصفات المتأثرة بالجنس	Intermediate Dominance	السيادة الوسطية
Pure Trait	الصفة النقية	Sex Limited Traits	الصفات المحددة بالجنس
Genetic Trait	الصفة الوراثية	Hybrid Trait	الصفة الهجينية
Phenotype	التركيب الظاهري	Genotype	التركيب الجيني
Genetics	علم الوراثة	Crossing Over	العبور
Sex Chromosomes	الكروموسومات الجنسية	Autosomes	الكروموسومات الجسمية
Punnett Square	مرربع بانت	Chromosome Theory of Heredity	النظريّة الكروموسومية في الوراثة
Heterozygous	هجين أو متباين اللاقحة	Homozygous	نقي أو متّشابه اللاقحة

### الأفكار الرئيسية للوحدة

#### الفصل الأول: أساسيات علم الوراثة

##### (1-1) الأنماط الوراثية

- \* علم الوراثة هو دراسة انتقال الصفات أو توارثها.
- \* جريجور موندل أول من استخدم الإحصاء والرياضيات لدراسة توارث الصفات في الكائنات.
- \* الأليلات عبارة عن أشكال مختلفة للجين الواحد. في الكائن الهرجين، الأليل السائد هو الذي يظهر تأثيره.

##### (1-2) مبادئ علم الوراثة

- \* تنص النظريّة الكروموسومية في الوراثة على أنّ وراثة الصفات تُحكَم بواسطة الجينات المحمولة على الكروموسومات.
- \* التركيب الجيني هو جمجمة الأليلات الخاصة بالصفة الموروثة، والتركيب الظاهري هو الصفة الظاهرة ذاتها.
- \* يصف قانون الانزال كيف تنفصل أزواج الكروموسومات أثناء الانقسام الميوزي.
- \* ينصّ قانون التوزيع المستقل على أنّ أزواج الجينات تنفصل وتتوزّع مستقلة كلّ عن الأخرى.
- \* ينصّ قانون السيادة على أنّ الأليل السائد، إذاً، هو الذي سيظهر تأثيره.

### ٣-١) دراسة توارث الصفات في الإنسان

- \* تنظم المعلومات الوراثية بطرق معينة تسمح بالتوقع بوراثة الصفات.
  - \* بعض الصفات لا تخضع في توارثها لقوانين مندل.
  - \* يستخدم سجل النسب لتتبع تاريخ بعض الصفات الوراثية بين الأقارب.
  - \* يحدد المستشارون الوراثيون الصفات التي يمكن أن يتوارثها الأبناء.

#### ٤-١) ارتباط الجينات (الارتباط والعبور)

- \* تقع الجينات المرتبطة على الكروموسوم نفسه ولا تتوزع مستقلة عن بعضها.
  - \* تتكون تراكيب جينية جديدة نتيجة حدوث العبور أثناء الانقسام الميوزي.

## ٥-١) الوراثة والجنس

- \* تُحدّد الكروموسومات الجنسية (X وY) جنس الأفراد ، وبقي الكروموسومات هي كروموسومات ذاتية (أو جسمية).

- \* الجينات الواقعة على الكروموسومات الجنسية جينات مرتبطة بالجنس .

- \* تقع الصفات المحددة بالجنس والمتأثرة بالجنس على الكروموسومات الذاتية، ولكنها تتأثر بالهرمونات الجنسية.

## خريطة مفاهيم الوحدة

استخدم المفاهيم الموضحة في الشكل لرسم خريطة تنظم الأفكار الرئيسية التي جاءت في الوحدة.



## تحقق من فهمك

1. أكمل الجمل التالية بما يناسبها:

1. تعرّف الصفة التي تظهر على الكائن بـ ..... .
2. يظهر التأثير الكامل لكلّ من الأليلين في حالة ..... .
3. تُسمّى دراسة الصفات الوراثية بـ ..... .
4. أدّت التشابهات بين عوامل مندل وسلوك الكروموسومات إلى قيام ساتون باقتراح ..... .
5. ..... يصف ظهور تأثير الصفة السائدة في حالة وجود الأليل الخاص بها.
6. تحدث ظاهرة العبور خالل ..... من الانقسام الميوزي.
7. الكروموسومات ..... تُعتبر مسؤولة عن الصفات المرتبطة بالجنس.

2. ضع علامة (✓) في المربع الواقع أمام العبارة الصحيحة، وعلامة (✗) في المربع الواقع أمام العبارة غير الصحيحة في كلّ مما يلي:


1. حامل الصفة الوراثية لا يظهر عليه تأثير الأليل الخاص بهذه الصفة.
2. في تجارب مندل، غالباً ما تكون أفراد الجيل الأول متتشابهة اللاقحة بالنسبة للصفة المدرستة.
3. الصفة المتنحية التي لا تظهر في الجيل الأول دائمًا ما تظهر في الجيل الثاني.
4. جميع أليلات أزواج الجينات تكون التركيب الجيني للكائن.
5. يمكن استخدام التلقيح الاختباري لتوضيح جميع التماثيل الممكنة للتهجينات الوراثية.
6. تُعتبر الكروموسومات الجنسية مسؤولة عن الصفات المتأثرة بالجنس.
7. يتم التحكّم في الصفات المحدّدة بالجنس بواسطة الجينات الواقعة على الكروموسومات الذاتية (الجسمية).

## أجب عن الأسئلة التالية بایجاري

1. أذكر أحد الأنماط الوراثية التي لا تتبع قوانين مندل.
2. ما الفرق بين الفرد النقي والفرد الهاجين؟
3. كيف يُستخدم التلقيح الاختباري لتمييز التركيب الظاهري السائد إذ كان متتشابه اللاقحة أو متباين اللاقحة؟
4. لخُص الدليل الذي أدّى إلى النظرية الكروموسومية في الوراثة.
5. لماذا كان مندل موقعاً في اختيار نباتات البازلاء لإجراء تجاربه؟
6. وضح كيف اختلفت نتائج تجارب باتسون وبانت عن الفرضيات التي افترضها. كيف تمكّنا من تفسير هذا الاختلاف؟
7. كيف تتكون التراكيب الجينية الجديدة للجينات المرتبطة؟
8. لماذا تظهر الصفات المتنحية الواقعة على الكروموسوم الجنسي في ذكور الإنسان؟
9. ما المفاهيم الرئيسية التي اكتشفها مورجان نتيجة أبحاثه على ذبابة الفاكهة (الدروسو فيلا)؟

## تحقق من مهارتك

١. كون خريطة للمفاهيم: أكمل خريطة المفاهيم التالية بإضافة المصطلحات: الأليلات ، الجينات ، الكروموسومات ، سائدة ، متتحية .



2. **تطبيق المفاهيم:** إذا كانت صفة البذور الملساء سائدة على صفة البذور المجعدة ، وصفة اللون الرمادي لقشرة البذرة سائدة على صفة اللون الأبيض لقشرة البذرة في نباتات البازلاء . وضُحَّ باستخدام مربع بانت نتائج تهجين نبات بازلاء نقي أملس البذور وقشرة بذرته رمادية اللون مع نبات آخر نقي بذوره مجعدة وقشرة بذرته بيضاء اللون . ما الصفات التي تظهر في الجيل الأول ؟

3. **تطبيق المفاهيم:** أرسم أشكالاً تخطيطية تُوضّح ما يلي : « كلما كانت الجينات المرتبطة بعيدة بعضها عن بعض ازدادت الفرصة لانفصالها أثناء حدوث العبور . »

4. **تقويم المفاهيم:** لِنفترض أنّ مندل درس وراثة صفة لون الأزهار في نبات حنك السبع بدلاً من نبات البازلاء ، هل للنتائج التي كان من الممكن أن يتوصّل إليها تأثير على القوانين التي صاغها؟

5. **تحديد السبب والتأثير:** لِنفترض أنّ رجلاً مصاباً بالهيمنوفيلايا تزوج بامرأة حاملة لهذا الخلل الوراثي ، مما احتمال أن يكون الابن أو الابنة مصاباً بهذا الخلل الوراثي ؟


6. **تطبيق المفاهيم:** لِنفترض أنّ دراسة انتقال ثلاثة أزواج من الأليلات قد حصلت نتيجة تزاوج كائن ما متنحّى الصفتين مع كائن هجين الصفتين . يعرض الجدول التالي نتائج التزاوجات :

النراوج	النتائج			
متنحّي الصفتين [AB] × هجين [ab]	350 [AB]	353 [ab]	49 [Ab]	48 [aB]
متنحّي الصفتين [ad] × هجين [ad]	361 [AD]	358 [ad]	40 [Ad]	41 [aD]
متنحّي الصفتين [bd] × هجين [bd]	891 [BD]	890 [bd]	8 [Bd]	8 [bD]

فسّر النتائج وحدّد موقع الجينات الثلاثة على الكروموسوم.

ملاحظة: إدراج الأليلات داخل هذا الشكل [ ] يعني التركيب الظاهري.

7. المَهَاق خلل وراثي في الإنسان ينبع عن نقص في صبغ الميلانين في الجلد والشعر والعينين. يُمثل سجل النسب التالي عائلة يظهر على بعض أفرادها هذا الخلل الوراثي.



(أ) باستخدام التحليل المنطقي، حدّد ما يلي:


\* هل الأليل المسؤول عن المَهَاق أليلاً سائداً أم متنحّياً؟

\* هل الأليل المسؤول موجود على كروموسوم جسمي أو كروموسوم جنسي؟


(ب) أكتب التركيب الجيني الممحملة لكلّ من الأفراد التالية: 4-II و 5-II وأولادهما الثلاثة.

8. تصميم تجربة: إشتبه أحد الباحثين بوجود خلل وراثي معين يُسببه أليل متنحّ محمول على الكروموسوم الجنسي X في ذبابة الفاكهة. صمم تجربة لاختبار صحة هذا الفرض.

٩. تفسير شكل بياني: يُوضّح الشكل البياني التالي بعض الصفات الوراثية في 1355 فراشاة. أيّ من هذه الصفات سائد، وأيها متنحّ؟ فسّر إجابتك.



١٠. تفسير شكل بياني: يوجد في نوع من الخنافس أليلان لصفة لون الجسم: بنّي (أحمر داكن) أو أصفر ، وكان لهذه الخنافس أيضًا أليلان لصفة تنقيط الجسم: منقط أو غير منقط. هُجّن خنسان متباهياً اللاقحة لكلي الصفتين. يُوضّح الشكل البياني التالي التراكيب الظاهرية لأفراد الجيل الثاني . هل يوجد ارتباط بين هذه الصفات؟ أيّ من هذه الصفات سائد؟



1. علم الأحياء والفن: يرسم العديد من الفنانين لوحات زيتية للمناظر الطبيعية والحدائق. ما الصفات التي درسها مندل في اللوحة الزيتية التالية؟ وما الصفات التي يدرسها العلماء للأشخاص في الصور الفوتوغرافية؟ أرسم منظراً أو لوحة زيتية لإحدى الحدائق، ثم حدد الصفات التي يمكن تحديد توارثها.



2. علم الأحياء وعلم الاجتماع: إذهب إلى إحدى الحدائق العامة التي تنتشر فيها النباتات المزهرة أو إلى محل لبيع الزهور، واستكشف توارث الصفات في مختلف النباتات. إبحث عن التهجينات الجديدة بين النباتات. ما الصفات التي تهجّنت في النباتات الأبوية؟ وما مظهر الصفات في النباتات البنوية؟
3. علم الأحياء والتاريخ: لم تلقَ أعمال مندل اهتماماً، بل تم تجاهلها لمدة تقارب الخمسين عاماً حتى اكتشفها بعض العلماء. لماذا تم تجاهل أعمال مندل؟

# مصطلحات

**الإخضاب** **Fertilization**: هي اتحاد الخلايا المذكورة مع البيض وهي تحدث بعد حدوث عملية التلقيح.

**الأنسجة الإنسانية (المرستيمية)** **Meristems**: هي الأنسجة النامية للنباتات ووظيفتها إنتاج خلايا جديدة.

**البذرة** **Seed**: تركيب تكاثري يتكون من جنين النبات وغذائه المدخر.

**بروتينات ناقلة نشطة** **Active Transport Proteins**: تضخ شوارد المعادن بواسطة النقل النشط من التربة إلى داخل الجذور.

**البلاستيدات الخضراء** **Chloroplasts**: عضيات خلوية تتوارد بكميات كبيرة في خلايا الأوراق النباتية وتحدث فيها عملية البناء الضوئي.

**البناء الضوئي** **Photosynthesis**: عملية تستخدم فيها الكائنات ذاتية التغذية طاقة ضوء الشمس لبناء الكربوهيدرات (السكريات) من المواد غير العضوية البسيطة مثل ثاني أكسيد الكربون والماء.

**تعاقب الأجيال** **Alternation of Generation**: مرحلة في دورة حياة النباتات حيث تتحول فيها النباتات من أجيال ثنائية المجموعة الكروموسومية إلى  $(2n)$  إلى أجيال أحادية المجموعة الكروموسومية  $(n)$ .

**الترقيد أو الرئد** **Stolon**: هي طمر أجزاء من سوق النباتات الممتدة فوق الأرض بينما لا تزال متصلة بالنبة الأساسية لتنمو نبتة جديدة.

**التطعيم** **Budding**: هي طريقة نقل قطعة من نبتة تحتوي على برعم واحد تسمى الطعم، ووضعها على ساق نبتة أخرى تسمى الأصل.

**التعقيل** **Cutting**: تقتضي هذه الطريقة بأخذ قطعة من الساق أو الورقة، أو برعم الورقة أو قطعة من الجذور، ثم غرسها في تربة تناسب نموها.

**تفاعلات غير معتمدة على الضوء (دورة كالفن)** **(Calvin Cycle)**: المرحلة الثانية من عملية البناء الضوئي، تحدث في سدى البلاستيدات الخضراء وتستخدم ATP و NADPH لتصنيع الكربوهيدرات.

**تفاعلات معتمدة على الضوء** **Light Dependent Reactions**: هي المرحلة الأولى من عملية البناء الضوئي، وكما يدل اسمها هي تعتمد في حدوثها على ضوء الشمس.

**التكاثر البكري Apomixis:** في هذا النوع من التكاثر ، ينمو الجنين من بويضة غير مخصبة .

**التكاثر الخضري Vegetative Reproduction:** تكاثر لا جنسي يحدث طبيعياً في النباتات .

**التكاثر الصناعي Artificial Propagation:** استخدام الناس للتكاثر الالاجنسي ، مثل التعقيل ، التطعيم و زراعة الأنسجة ، لإنتاج نبات جديدة .

**التلقيح Pollination:** عملية إنتقال حبوب اللقاح من الأجزاء المذكورة إلى الأجزاء المؤنثة بالزهرة .

**ثغور Stomata:** فتحات أو ثقوب دقيقة تواجد بين خلايا البشرة للأوراق النباتية .

**الثمرة Fruit:** تركيب من النباتات الزهرية تتكون بداخلها البذور التي تقوم الثمرة بإحاطتها وحمايتها كما أنها تساعده في انتشارها .

**الجذر الوتدي Taproot:** جذر مركزي كبير الحجم يحمل الكثير من الجذور الجانبية التي تنفرع منه ، كما أنه ينمو عميقاً تحت الأرض ليمتص المياه الجوفية .

**الجذر الليفي Fibrous Root:** يبدو في شكل كتلة من التراكيب الخيطية الرفيعة القصيرة ، كما أنه ينمو بالستيمترات القليلة العلوية من التربة فقط ليمتص الماء والعناصر المعدنية من الطبقة السطحية للتربة وعلى مساحة كبيرة .

**الجرانا Grana:** هي عبارة عن تراكيب قرصية الشكل متراصة بعضها فوق بعض .

**حرق الجذور Root Burn:** في حال وجود كميات كبيرة من المعادن في التربة ، سيخرج الماء من الجذور إلى التربة .

**زراعة الأنسجة Tissue Culture:** تسمح هذه الطريقة بإنماء نبتة كاملة من خلايا مفردة أو قطع صغيرة من الأوراق أو الساق أو الجذور .

**الزهرة Flower:** عضو التكاثر الجنسي في النباتات الزهرية ، تنتج الأمشاج الذكرية والأنثوية كما تشكل التركيب الذي تتم فيه عملية الإخصاب .

**الزهرة الكاملة Complete Flower:** هي الزهرة التي تحتوي على إحدى التراكيب الأنثوية والذكرية معاً .

**الزهرة الناقصة Incomplete Flower:** هي الزهرة التي تحتوي على إحدى التراكيب الأنثوية أو الذكرية فقط .

**الستروما Stroma:** ترکب البلاستيدات الخضراء من غشاء مزدوج يحيط بمادة جيلاتينية عديمة اللون تعرف السدى.

**السوق Stem:** لا تعمل الأوراق بمفردها في النباتات لكنها مثبتة بتراتيب تسمى السوق.

**الشد التسحي Transpiration Pull:** هو تحرك الماء خارج الأوراق من خلال التغور خلال عملية التبخر والتنفس يشد الماء صعوداً خلال الخشب من الجذور وحتى من التربة.

**ضغط الإمتلاء Turgor:** دعامة الخلية الناتجة عن الضغط الأسموزي لغشاء الخلية على جدار الخلية.

**الضغط الجذري Root Pressure:** نقطة الانطلاق لتحرك الماء داخل الجهاز الوعائي.

**الطور المشيحي Gametophyte:** الطور أحادي المجموعة الكروموسومية الذي ينتج الأمشاج في دورة حياة النباتات.

**الطور الجرثومي (البولي) Sporophyte:** الطور ثانوي المجموعة الكروموسومية الذي ينتج الجراثيم (الأبواخ) في دورة حياة النباتات.

**العروق Veins:** تراتيب أنبوبية الشكل ينتقل خلالها الماء والعناصر المعدنية والسكريات إلى جميع أنحاء النصل.

**العقدة Node:** هي المواقع حيث تتصل الأوراق بالسوق.

**عقلة Internode:** هي قطع الساق الواقعة بين كل عقدتين متتاليتين.

**علم الزراعة في الماء Hydroponics:** هو نمط زراعي لإنتاج المحاصيل في الماء من دون استعمال التربة، حيث يمكن تربية النباتات بواسطة محليل غنية بالمغذيات المعدنية أو في وسط خامل.

**عنق الورقة Petiole:** ترکيب صغير يصل ما بين نصل الورقة وساق النبات.

**فرضية تدفق الضغط Pressure flow Hypothesis:** فرضية تفسر انتقال السكريات في النبات مع الماء إلى المصرف.

**الكلوروفيل Chlorophyll:** صبغة خضراء داخل البلاستيدات الخضراء، تكسب النبات لونها الأخضر وتمتص طاقة ضوء الشمس.

**الكمبيوم Cambium:** النسيج الإلنسائي الذي ينتج خلايا جديدة للنمو الجانبي في النباتات الخشبية.

**الكمبيوم الفلاني Cork Cambium:** هو النسيج الإلنسائي الموجود بين اللحاء والبشرة ويستبدل الانقسام الخلوي طبقة القشرة وطبقة البشرة أو جلد النباتات بالغلين الذي يحمي الشجرة.

**الكمبيوم الوعائي Vascular Cambium:** يقع بين الخشب واللحاء وينتج الانقسام الخلوي خشباً جديداً إلى الجهة الداخلية من الكمبيوم ، ولحاءً جديداً إلى الجهة الخارجية .

**الكمون Dormancy:** فترة النشاط المنخفض التي تنتاب عن التغيرات التركيبية والكيميائية في النبات .

**كيوتيل Cuticle:** طبقة من مادة شمعية غير منفذة للماء ، تغطي السطحين العلوي والسفلي للورقة وتقلل من فقدان الماء من الورقة النباتية خلال عملية التبخر .

**الممر خارج خلوي Apoplast:** الممر الأول حيث ينتقل الماء عبر الأجزاء والخلايا والأنسجة غير الحية ، وبخاصة الجدر الخلوي من القشرة وصولاً إلى البشرة الداخلية .

**الممر الخلوي الجماعي Symplast:** الممر الثاني حيث ينتقل الماء والأملاح من خلية إلى الخلايا المجاورة عبر الروابط البلازمية .

**الممر عبر الغشائي Transmenbrane:** الممر الثالث حيث ينتقل الماء والأملاح الذائبة من خلية إلى أخرى عبر الجدر الخلوي والأغشية .

**النباتات الوعائية Vascular Plant:** نباتات تحتوي نسيج وعائي .

**النسيج الأساسي Ground Tissue:** هو عبارة عن الخلايا التي تقع بين النسيج الجلدي والنسيج الوعائي .

**النسيج الوسطي الإسفنجي Spongy Mesophyll:** موجود تحت النسيج الوسطي العمادي على شكل طبقة من الخلوي غير منتظمة الشكل والمتباعدة بعضها عن بعض .

**البشرة (النسيج الجلدي) Dermal Tissue:** يكون الطبقة الخارجية للأوراق والسوق والجذور ، ويسمى أحياناً بالنسيج الوقائي أو السطحي .

**النسيج الوسطي Mesophyll:** نسيج نباتي يتواجد فيما بين البشرتين العليا والسفلى ويكون من خلايا برنسيمية .

**النسيج الوسطي العمادي Palisade Mesophyll:** موجود أسفل النسيج العلوي الجلدي على شكل طبقة من الخلوي مستطيلة الشكل المتراصة بعضها على بعض .

**السيج الوعائي** **Vascular Tissue**: يُشكل نظاماً من المواصلات لنقل الماء والمغذيات داخل النباتات.

**الصل Blade**: الجزء الأكبر من الورقة النباتية وهو مفلطح وعربيض ويحتوي الخلايا التي تقوم بعملية البناء الضوئي.

**نظرية الشد والتسلك** **Cohesion – Tension Theory**: هي المسؤولة عن تشكيل عمود الماء المتواصل.

**النمو الأولي** **Primary Growth**: استطالة الساقان لتصبح أكثر طولاً واستطالة الجذور لتصبح أكثر عمماً، وهو يحدث في جميع النباتات.

**النمو الثانوي** **Secondary Growth**: نمو جذور وسيقان وفروع النباتات في السملك وهو يحدث في نباتات بذرية معينة.

**الارتباط** **Linkage**: اتصال بين الجينات التي تورث مع بعضها.

**الأليل** **Allele**: شكل من أشكال الجين.

**الأليل السائد** **Dominant Allele**: أليل يظهر تأثيره عندما يجتمع أليلان مع بعضهما.

**الأليل المترافق** **Recessive Allele**: أليل لا يظهر تأثيره عند اجتماعه مع الأليل السائد.

**التلقيح الاختباري** **Test Cross**: تلقيح بين فرد نقي اللاقحة لصفة متنحية والفرد الذي يحمل الصفة السائدة المقابلة غير محددة التركيب الجيني.

**التهجين الأحادي** **Monohybrid Cross**: دراسة توارث صفة واحدة دون النظر لباقي الصفات.

**التهجين الثنائي** **Dihybrid Cross**: دراسة توارث صفتين في وقت واحد.

**الجين** **Gene**: جزء من كروموسوم مسؤول عن إظهار صفة وراثية.

**الجينات المرتبطة** **Linked Genes**: جينات واقعة على الكروموسوم نفسه.

**الجينات المرتبطة بالجنس** **Sex Linked Genes**: الجينات المحمولة على الكروموسومين الجنسيين x وy.

**حامل الصفة** **Carrier**: عبارة تطلق على الفرد الذي يحمل الأليل/جين الصفة المتنحية والتي لا يظهر تأثيرها.

**سجل النسب Pedigree:** مخطط يوضح كيفية انتقال الصفات وجيناتها من جيل إلى جيل في إحدى العائلات.

**السيادة غير التامة Incomplete Dominance:** عندما يكون التركيب الظاهري للهجين وسطيًا بين التركيبين الظاهرين للأبدين النقيين.

**السيادة المشتركة Codominance:** عندما يظهر تأثيراً الأليلين الموجودين في الفرد الهاجين كاملين ومنفصلين.

**السيادة الوسطية Incomplete Dominance:** نوع من السيادة حيث يكون التركيب الظاهري للفرد الهاجين وسطيًا بين التركيب الظاهري السائد والتركيب الظاهري المتنحي.

**الصفات المتأثرة بالجنس Sex Influenced Trait:** صفات توجد جيناتها على الكروموسومات الذاتية وتتأثر بالهرمونات الجنسية وتظهر بكل الجنسين ولكن بدرجات متفاوتة.

**الصفات المحددة بالجنس Sex Limited Traits:** صفات تظهر فقط في وجود الهرمونات الجنسية ولا تظهر إلا بأحد الجنسين أو الآخر.

**الصفة الندية Pure Trait:** عند اجتماع أليلان متماثلين سواء كانوا سائدين أم متنحين مع بعضهما فستكون الصفة الوراثية صفة ندية.

**الصفة الهاجينة Hybrid:** عند اجتماع الأليل السائد مع المتنحي مع بعضهما فستكون الصفة الوراثية صفة هاجينة.

**الصفة الوراثية Genetic Traits:** الصفات التي يمكن أن تنتقل من الآباء إلى الأبناء من جيل إلى جيل.

**التركيب الجيني Genotype:** التركيب الوراثي لفرد.

**التركيب الظاهري Phenotype:** الصفة الظاهرة على الفرد.

**العبور Crossing Over:** تبادل للقطع المجاورة من الكروماتيدات الداخلية للرياعي مع بعضها أثناء الطور التمهيدي الأول من الانقسام الميوزي.

**علم الوراثة Genetics:** الدراسة العلمية لصفات الوراثية الموروثة.

**الكروموسومات الجسمية** **Autosomes**: جميع الكروموسومات باستثناء الكروموسومات الجنسية.

**الكروموسومات الجنسية** **Sex Chromosomes**: الكروموسومان اللذان يحددان جنس الفرد ، ذكر أم أنثى وهم مختلفان ويرمز لهما بالحروف x و y .

**مربع بانت Punnett Square**: مربع لتنظيم المعلومات الوراثية لتوضيح النتائج المتوقعة في تجارب الوراثة وليس النتائج نفسها .

**النظرية الكروموسومية في الوراثة** **Chromosome Theory in Heredity**: النظرية التي تقر أن مادة الوراثة محمولة بواسطة الجينات الموجودة على الكروموسومات .

**نقي أو متشابه اللاقحة** **Homozygous**: جيني الصفة الوراثية لديهما الأليل نفسه سواء أليل سائد أم متتحي .

**هجين أو متباين اللاقحة** **Heterozygous**: جيني الصفة الوراثية لديهما أليلان مختلفان .

## ملاحظات






# 11

تطرح سلسلة العلوم مضموناً تربوياً متوازناً يناسب جميع مستويات التعليم لدى الطلاب.

يوفر كتاب العلوم الكثير من فرص التعليم والتعلم العلمي والتجارب المعملية والأنشطة التي تعزز محتوى الكتاب. يتضمن هذا الكتاب أيضاً نماذج لاختبارات لتقدير استيعاب الطلاب والتأكد من تحقيقهم للأهداف واعدادهم للاختبارات الدولية.

تتكون السلسلة من:

- كتاب الطالب
- كتاب المعلم
- كراسة التطبيقات
- كراسة التطبيقات مع الإجابات



قيّم مناهجنا



الكتاب كاملاً